

ক্লোম নিঃসরণ ; সন্তান প্রসবের পর ক্লোম (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হইরা অস্বাভাবিক হয় (একন্, বেগ্) ; স্তনে দুগ্ধের সঞ্চয় বন্ধ হওয়া ।

খাসিয়ন্ত্ৰ । বর মূত্র, শুনা যায় না এবং ভৌতলায় জ্বর ; রক্তোৎকাশ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কাশি থাকে, কখন বা কাশি থাকে না ; নিশ্বাস কষ্টকর এবং উষ্ণগুস্ত ; অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস (ক্যাক্-কস্, ইন্-নেস্) ; হিকা (সিকুটা, নাক্স-বম্, হায়োস্, ট্রাইমন্) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্পন্দন ; নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুতগামী এবং সঙ্কুচিত এবং অনেক সময় 'অগম (Intermittent) (কোনারাম্, ডিম্বিট্, ক্যালী-কার্ক্, নেট্রাস্-মিউর) ; নাড়ী কম্পমান, মৃদুগতি বিশিষ্ট এবং লুপ্ত ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাৎদেশে বেদনা (বেগ্, সিমিসিক্, নাক্স-বম্, পাল্‌স্) ; পৃষ্ঠদেশে অবশবোধ এবং টুন্টনানি বাহ্য হাত এবং পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (একন্) ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকস্মিক সঞ্চালন (সিকুটা, বেগ্, হায়োস্, ট্রাইমন্) ; হাত পায়ের পাতা এবং আঙ্গুলের সঞ্চালন ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভারিবোধ এবং উহার কম্পন ; উষ্ণ জলে অনেকক্ষণ ভিজাইরা রাখিলে যেরূপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেরূপ ঠাণ্ডা, শিটা এবং কৌকড়া হয় ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবশবোধ এবং উহাতে স্পর্শজ্ঞান রহিততা ও ঠাণ্ডাবোধ, হাত পায়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই বাহ্য অধিক অগ্রভূত হয় ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কষ্টদায়ক অসাড়বোধ ; পা বাহ্য, হাত এবং পায়ের আঙ্গুলে ঝিল ধরা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হান্সা দেওয়ার জ্বর হুড়্‌হুড়্‌ এবং কুট্‌ কুট্‌ করা (একন্) ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরার জ্বর বেদনা ; হাত পায়ের পাতার আলোহতব (আস্, সাল্‌ফ্) ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঝিঁঝিঁ ধরা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পচা লাগা (Gangrene) (আস্, আন্‌থ্রাক্স) ।

চর্ম্ম । চর্ম্ম শীতল এবং শুষ্ক ; সমুদয় শরীরেই অসাড়বোধ ; কোন প্রাণী হান্সা দিবা গেলে যেরূপ হয়, চর্ম্মের নীচে সেরূপ অগ্রভূত হয় ; গায় হামের জ্বর কুস্কুড়ী (আস্, আর্থিকা, কস্) ; শরীরের স্থানে স্থানে লোমহীন বাগ্‌মোস (Echymoses) (আর্থিকা, কস্) ; শরীরের নানা স্থানে পচাযুক্ত ফোঁকা পড়া (আস্) ।

জ্বর । সমুদয় শরীর ঠাণ্ডা, বিশেষতঃ হাত পা, এবং মুখমণ্ডল ;

সমুদয় শরীরে প্রচুর পরিমাণে শীতল চট্‌চট্টিয়া ঘর্ষ (আস্, ক্যান্ডার, মার্ক, কদ) ।

ব্যবহার । রক্তশ্রাব, বিশেষতঃ জরায়ু হইতে স্ত্রীলোকের শেষ রক্তঃরোধের সময় রক্তশ্রাব ; গর্ভশ্রাব ; অনিয়মিত, আক্ষেপিক, মূত্র প্রসব বেদনা অথবা প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়া একবারেই থাকে না ; সন্তান প্রসবের পর ক্রেন (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়া বা উহা বিকৃত হওয়া ; সন্তান প্রসবের পর পেটে বেদনা (ভাদালিয়ার কামড়, -After pains) ; সন্তান প্রসবের পর জরায়ুর মধ্যে কুল (Placenta) লাগিয়া থাকা ; আক্ষেপ বা কন্‌বাল্‌সন্স (Convulsions) ; পক্ষাঘাত ; পচা ঘা বা গ্যাংগ্রিন্ (Gangrene) ; ক্ষত ; দুইত্রণ বা পূর্জাঘাত (Carbuncle) ; সামান্য এবং সামান্যতিক আকারের ওলাউঠা ; কসেরকা মর্জ্জায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার উদ্ভেজনা ইত্যাদি অনুরূপে সিকেল্‌ কর্ণুটাম ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত দুর্বলতা, বলক্ষয় এবং অস্থিরতা (আস্) ; অতি শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় (আস্, ক্যান্ডার, কার্কো-বেজ্) ; আক্ষেপ বা কন্‌বাল্‌সন্স ; মূত্ররোগের জ্ঞান আক্ষেপ বা থেঁচনী ; লিঙ্কে-টিক্‌ গ্রহীর কোড়াব জ্ঞান ক্ষীতি ; ওলাউঠার জ্ঞান রোগের পতনাবস্থা ; রক্তশ্রাবের সময় ; উত্তাপে অনুরূপের বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা বাতাসে, অথবা সন্ধি লাগিলে বা ঘণ্ট হইলে অনুরূপের উপশম ; শীর্ণ, লম্বা, তল্‌তলে এবং শিথিল লেঙ্গী বিশিষ্ট চর্ম্মল এবং রক্ত ও বৃদ্ধ অচলের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ইত্যাদি সিকেল্‌ কর্ণুটামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । জরায়ুর উপর সিকেলের কার্য্য অনেকটা কলোকিলামের জ্ঞান । এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আদিনিক, বেলাডোনা, ক্যামোমিলা, কল্‌চিকাম্, লাইকোপডিয়ার, পাল্‌ সেটীলা, রাস্-টল্‌ এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের জ্ঞান ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্ডার, গলিগাম্ ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার গাংগেলি, ডাক্তার লেডাম্ এবং ডাক্তার ফোনে-

দ্বিয়ার মতে এই ঔষধের ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনে প্রসব বেদনা বৃদ্ধি করিয়া সম্ভান প্রসবের বিশেষ সহায়তা করে । কোন কোন চিকিৎসক সম্ভান প্রসব উপলক্ষে এই ঔষধের ২০০ ডাইলুশনও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । আবার কোন কোন চিকিৎসক প্রসব বেদনা প্রবল করার অভিপ্রায়ে মূল আরোক এবং ১ম বা ২য় দশমিক ডাইলুশন, ১ ফোঁটা মাত্রায় সেবনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ।

স্পাইজেলিয়া আন্তেলমিয়া,—স্পাইজেল্

(*SPIGELIA ANTHALMIA*,—*SPIGEL.*)

দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল এবং ইউনাইটেড স্টেটসের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিমাংশে এই গাছ জন্মে । এই গাছের শুকনা পাতা, ডাঁটা যথা নিয়মে রেকটিকাইড্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । শুকনা পাতা, ডাঁটা গুঁড়া করিয়া যথা নিয়মে উহাতে জগার অব্ মিক্ মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে ।

সাধারণ ক্রিয়া । শরীরের সমুদয় অংশ এবং বিশেষ বিশেষ ইন্ড্রিরের স্নায়ু এবং চক্ষু ও জংপিণ্ডের অংশাল অংশ ও পেশীর উপর ইহার কার্য্য থাকা হেতু গতি উৎপাদন শক্তির সহায়কারী স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক সঙ্কালন, পেশীর অগ্রভাগের স্পন্দন (*Subsultus Tendinum*) এবং আক্ষেপ (*Convulsions*) হইয়া থাকে । জ্ঞান উৎপাদন শক্তির সহায়কারী স্নায়ু উত্তেজিত হওয়ার দরুন মুখমণ্ডল এবং মস্তকের ট্রিজিমিনাই বা ট্রাইকেসিয়াল্ (*Trigemini or Trifacial*) নামক বৃহৎ স্নায়ুশূল, জংদ্বারশূল, উৎপন্ন হয় । উক্ত প্রকারের স্নায়ুশূল এবং চক্ষু ও জংপিণ্ডের বাতাক্রান্ত হওয়ার অবস্থা উৎপাদন করা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । স্মরণ শক্তির দুর্বলতা বা হ্রাস ; কোন প্রকারের মানসিক পদ্বিস্রমে অনিচ্ছা ।

অস্ত্রক । উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন দিকে তাকাইলে মাথা ঝোঁরা, বাহ্যর দরুণ রোগী মনে করে যেন সে পড়িয়া যাইবে ; মাথার চিমা বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে চাপিয়া ধরার জায় বেদনা বাহ্য অস্থ্য হইতে আরম্ভ হইয়া বহির্দিকে বিস্তৃত হয় বলিয়া অস্থ্যভূত হয় ; একগাছি কিতা কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, মাথার সেরূপ আঁটাবোধ (আন্টি-টার্ট, কেল্‌স, ক্যালী-আয়োড), মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে বাহ্য অধিক অস্থ্যভূত হয় ; কপাল এবং কপালেত্র হই পার্শ্বে ছিঁড়িয়া ফেলার জায় বেদনা বাহ্য চক্ষুর পানে বিস্তৃত হয় এবং নড়া চড়া, বিশেষতঃ চলিবার সময়, পা থাণা স্থানে না পড়িয়া পা হঠাৎ সরিয়া পড়িলে রাহার বৃদ্ধি হয় ; মাথার চাপিয়া ধরার জায় বেদনা বাহ্য কপালের ডাইন পার্শ্বেই অধিক অস্থ্যভূত হয় এবং তদ্রূপ ডাইন চক্ষুও আক্রান্ত হয়, নড়া চড়া, গোলমাল, কাকি লাগা অথবা মলত্যাগের সময় কৌথ পাড়িলে বৃদ্ধি হয় ; মাথা যেন ফাটিয়া য় য় হইয়া পড়িয়া যাইবে এরূপ অস্থ্যভূত হয় (ব্রাই, ক্যাপ্‌স) ; নির্দিষ্ট সময়ে (Periodical) শিরঃপীড়া ; মস্তিষ্কের কীপনি, মাথা নাড়িলে বা তাড়া তাড়ি চলিয়া বেড়াইলে বাহ্য অধিক অস্থ্যভূত হয় (বেল্‌, নাক্স-মক্‌, রান্‌ টক্স) ; স্পর্শ করিলেও মাথার হাড় টাটানি (একন্‌, চায়না, মার্ক, নেট্রাম্‌-মিউর, সাইলিসি, সাল্‌ক) ।

চক্ষু । চক্ষু উহার কোটির অপেক্ষা বড় হইলে যেরূপ হয়, চক্ষু সকালনে সেরূপ অস্থ্য বোধ (গ্রাহাম্‌, কন্‌-আন্‌) ; চক্ষে বোঁচা বিধা বা কর্তনব্যং শ্রবল বেদনা বাহ্য চক্ষে আরম্ভ হইয়া চক্ষুর্দিকে বিস্তৃত হয় ; চক্ষুর গোলকে চাপিয়া ধরার জায় বেদনা, চক্ষুর গোলক ঘুরাইলেই বাহ্য অধিক অস্থ্যভূত হয় (ব্রাই, ফাইলট্‌) ; বাতাক্রান্ত চক্ষু প্রসাহ (Rheumatic Ophthalmia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়া, চক্ষে কখন বেদনাদি থাকে, কখন বা বেদনাদি থাকে না ; চক্ষুর উপরের পাতা পড়িয়া যায় বা চক্ষু মেলিবার শক্তি থাকে না (Ptosis) ; চক্ষে বেদনা বাহ্য চক্ষুর কোটির পতীরতম অংশে অস্থ্যভূত হয় (আলোজ্‌, মিউসিক্‌) ; চক্ষু প্রসাহ এবং তদ্রূপ চক্ষুর যেখানে লাগ বর্ণ ।

কর্ণ । কোন নির্দিষ্ট সময়ে (Periodical) বধিরতা ; অনেক দূর

হইতে যেন কানে টন টন শব্দ প্রবেশ করে, বাহার দরুণ মনে হয় যেন কান চল্ চল্ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে; কর্ণশূল এবং কানের মধ্যে ডেলার ভায় কোন পদার্থ লাগিয়া রাখিয়াছে এরূপ অনুভূত হওয়ার দরুণ কানে চাপিয়া ধরার ভায় যাতনা ।

নাসিকা । নাসিকার গোড়ার পশ্চাৎ ভাগ হইতে প্রচুর পরিমাণে স্লেমা নির্গমন, বাহার দরুণ রাতিতে নাক বন্ধ হইয়া থাকে; লোম নড়িলে বা বাতাস মধ্যে প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, নাসিকার পশ্চাৎ দেশে সেরূপ স্ফুৎ স্ফুৎ করা ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলে বেদনা বা স্নায়ুশূল, যাহা বাম পার্শ্বেই অধিক অনুভূত হয় (একন্) এবং তদরুণ আক্রান্ত স্থানে ছিঁড়িয়া ফেলা, খোঁচা বিধার ভায় বা আলাঘ্নক বেদনা, যাহা গালের হাড়, নিম্ননাড়ি, চক্ষুর ক্রুর উপরিভাগ এবং চক্ষু গোলকেই অধিক অনুভূত হয়; কোন নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত প্রকারের স্নায়ুশূল; বেদনা প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ হইয়া সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে; বেলা হই প্রহরেব সময়ে বেদনাদির বৃদ্ধি; নড়া চড়া বা গোলমালা বেদনাদির বৃদ্ধি (চায়না, কোইনাইন্) ।

মুখগহ্বর । দন্ত শূল, বাহার দরুণ মনে হয় যেন দাঁত বহির্দিকে ঠেপিয়া বাহির হইতেছে; দাঁতের গোড়ায় ছিঁড়িয়া ফেলার ভায় বা দগ্ধশিয়া বেদনা, বিশেষতঃ যে দাঁতে ছিদ্র হয় (মার্ক); ঠাণ্ডা জল লাগিলে দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (আন্টি-ক্লুড, গ্রাফ, ষ্টাকিস, সাল্‌ক); ঠাণ্ডা বাতাসে দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (একন্); আহারের পর দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (আন্টি-ক্লুড, ল্যাক); জিহ্বা ফাটায়ুক (ব্যাণ্ট, বেল, রান্-টম্); জিহ্বার ডাইন পার্শ্বে স্ত্রী বিধানের ভায় বেদনা ।

পাকস্থলী এবং উদর । কোন কঠিন পদার্থ চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ চাপিয়া থাকার ভায় বেদনা বা যাতনা (ব্রাই, কালী-কার্ক, মার্ক, নাজ্-বন্, সিপিয়া) । কসিয়া ধরিলে যেরূপ হয়, উদরে সেরূপ বেদনা বা পেটকামড়াণী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ও দ্বাস কষ্ট; উদরে স্ত্রী বিধানের ভায় প্রথমে বেদনা ।

মল এবং মলদ্বার । বায়বীয় বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল

নির্গত হয় না (আনাকাড, কষ্ট, লাইকোপ, নাক্স-বম); মলের সঙ্গে ক্রমি পড়ে; গুহ এবং গুহ দ্বারে চুলকানি, কুট, কুট, করা এবং হুড্, হুড্, করা; গুহ দ্বারে লম্বা গোল-ক্রমি; অণ্ডকোষ এবং গুহ দ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে (Perineum) হুচী বিধাইয়া ছিদ্র করার ভ্রাম অশুভূত হওয়া।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রমালী দিয়া দাতু নিঃসরণ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষাদ খাড়া হয় এবং স্ত্রীসহবাস সম্বন্ধে মনে নানা প্রকারের কার্মনিক ভাবের উদয় হয়, কিন্তু স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা হয় না; পুরুষাদ এবং ডাইন অণ্ডকোষে চুলকানি এবং হুচী বিধানের ভ্রাম অশুভূত হয়, যাহা পশ্চাৎ দিক হইতে সম্মুখদিকে বিস্তৃত হয়।

পৃষ্ঠদেশ । বিশ্রাম কালীনও মেরুদণ্ডে খেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ভ্রাম বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র । বুকে আঁটা বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং শ্বাস কষ্ট; বুকে হুচী বিধানের ভ্রাম বেদনা, সামান্য, নড়া চড়া অথবা শ্বাস প্রস্থানে বাহার বৃদ্ধি হয় (ব্রাই, ক্যালী-কার্ক); বিছানায় শয়নাবস্থায়, নড়াচড়াতে এবং বাহু উপরদিকে উঠাইলে শ্বাস কষ্ট এবং নিশ্বাস বদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, বাহার দরুণ রোগী ডাইন পার্শ্বে বা মাথা উঁচু করিয়া শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্পন্দন (ক্যাক্ট, ক্যাল্-ক-কার্ক); প্রবল হৃৎস্পন্দন যাহা অন্তরালোকেও দেখিতে পায় এবং বাহার শব্দ রোগীর নিকটবর্তী লোকে শুনিতে পায় (মোনয়েন্, ক্যালী-নাইট্রিক্, থুজা, বিরেট্-আল্‌ব); প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পর বিছানায় বসিয়া সম্মুখ পানে হেলিয়া পড়িলে হৃৎস্পন্দন; দীর্ঘ নিশ্বাসে বা নিশ্বাস বদ্ধ করিলে হৃৎস্পন্দন; হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে অত্যন্ত কষ্টাত্মক (একন্, গাল্‌ফ, বিরেট্-আল্‌ব); হৃৎপিণ্ডে হুচী বিধানের ভ্রাম যাতনা (আর্বিকা, আক্টি-পিয়াস, ক্যাক্ট, ব্রাই, ক্যালী-কার্ক) এবং কখন কখন নাড়ীতেও এক সময়ে এইরূপ অশুভূত হয়; স্নায়বিক হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী স্পন্দন; নাড়ী দুর্বল, কম্পান এবং অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । হাত ইত্যাদি উর্দ্ধাধার কম্পন; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

এবং নক্ষিতে কসিরা ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা (ব্রাই, লেডাম) ; চলিবার সময়ই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অধিক আক্রান্ত হয় ।

নিদ্রা । অস্থির নিদ্রা এবং বারবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া ; এলো বেলো স্বপ্ন দেখা এবং যাহার দরুন রোগী জাগিয়া পড়িয়া অত্যন্ত শ্রুতি অমুভব করে এবং জাগিলে স্বপ্ন বিষয়ে কিছুই স্মরণ থাকে না ।

জ্বর । সামান্য নড়া চড়াতেই শীতবোধ ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই শীতবোধ ; হাতে চটুচটিয়া ঘর্ম্ম ।

ব্যবহার । মুখমণ্ডলের এবং মস্তকের ট্রিক্সিমিনাট বা ট্রাইফেসিয়াল্ (Trigemini or Trifacial) নামক বৃহৎ ত্রায়ুশূল এবং জ্বংপিণ্ডের বাত জনিত বেদনা এবং জ্বং ত্রায়ুশূল ; জ্বংপিণ্ডের বাত্মিক অস্থি ; বাতাক্রান্ত চক্ষু প্রদাহ ; ক্রমি জনিত রোগ ইত্যাদি রোগে স্পাইজেলিয়া ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । স্পর্শ করিলে বা ঝাকি লাগিলে আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয় ; অত্যন্ত দুর্বলতা, দীর্ঘ প্রাতঃকালেই অধিক অন্তর্ভূত হয় ; রক্তাক্ততা ধাতুবিশিষ্ট দুর্বল রোগী এবং গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট বালক বালিকাগণ যাহাদের ক্রমির ধাতু থাকে, তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; নড়া চড়া, গোলমাল, নিশ্বাসে, স্পর্শনে, চক্ষু ঘুরাইলে অস্থির বৃদ্ধি ইত্যাদি স্পাইজেলিয়ার বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । স্পাইজেলিয়ার কার্যের সঙ্গে একোনাটের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । ক্রমি রোগে ইহার কার্যের সঙ্গে সিনার কার্যের বিশেষ সন্ধর আছে । ডাক্তার গার্নেসি (Dr. Guernsey) বলেন যে, নাভি প্রদেশে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জ্বংস্পন্দন স্পাইজেলিয়ার এক বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত । এতদ্ভিন্ন ইহার কার্যের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যালেকেরিয়া কার্ক, সিমিসিফিউগা, ডিজিটালিস, কালী-কার্ক, লরোসিরেনাস, লাইকোপডিয়া, মার্কিউরিয়াস, ফফরাস, পালসেটিল্লা, রাস-টেক্স, দিগিয়া, সালফার এবং জিঙ্কামের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । অরাস, ককিউনাস, ক্যান্ফার, পালসেটিল্লা ।

ডাইলুশন বিচার । মায়ুলে ১২ বা ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার্য ।
 হৃৎপিণ্ডের অন্তর্থে ১ম হইতে ৬ষ্ঠ ডাইলুশন উপকারী । হানিমানের মতে
 ৩০ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী ।

স্পঞ্জিয়া টোকা,—স্পঞ্জ

(SPONGIA TOSTA,—SPONG)

কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে স্পঞ্জের আদত গুঁড়া
 ক্রয় করিয়া উচাতে যথা নিয়মে স্নেহার অব্যক্তি মিশাইয়া ৩য় শততমিক
 ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে
 যথা নিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । আবার
 আরোক স্পঞ্জ যথা নিয়মে ২০° ডিগ্রী ওবারপ্রফ্ স্পিরিটে মিশাইয়া মূল
 আরোকও প্রস্তুত হইতে পারে ।

সাধারণ ক্রিয়া । কণ্ঠনালী, বায়ুনল, থাইরয়েড্ গ্রন্থি (Thyroid
 Gland), হৃৎপিণ্ড এবং অণ্ডকোষের উপর ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে
 পাওয়া যায়, যাহার দক্ষণ উক্ত যন্ত্র উত্তেজিত, প্রদাহযুক্ত ও ক্ষীত হয়
 এবং কখন কখন উহাতে ফাইব্রিন (Fibrin) নামক পদার্থের সঞ্চয় হয় ।
 গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও কঠিনতা এবং কণ্ঠনালী ও বায়ুনলের প্রদাহ উৎপাদন
 করা বিষয়ে ইহার কার্য্য অনেকটা অ্যাগোডিনের জায় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । গান করিবার অনিবার্য্য ইচ্ছা এবং উচ্চর সঙ্গে সঙ্গে মনের
 ক্ষুধা বা আনন্দ ।

মস্তক । বহির্বাযু হইতে উষ্ণ ঘরে গেলে মস্তিষ্কের ডাইন পার্শ্ব
 মূল্যে বেদনা ; কপালের বাম পার্শ্বে স্ফটী বিধানের জায় প্রথম বেদনা ;
 মাথার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (একন্, বেল্) ।

নাসিকা । তরল সর্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবন্তরল

স্নেহা নির্গমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত হাঁচি সেওয়া (একন্, সিপা) ; শুষ্ক সর্দি এবং তদ্রূপ নাক বন্ধ হইয়া থাকা (আলাস, নাক্স-বন্, সিন্টিয়া, সাইগিসি) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল টল্টলে, ক্ষীত, লাগবর্ণ অথবা নীলের আভাযুক্ত এবং অত্যন্ত ঘাতনার চিক্ণযুক্ত ।

মুখগহ্বর । হরাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির (Sub-maxillary glands) ক্ষীতি ।

গলার মধ্য । থাইরয়েড্ গ্রন্থি (Thyroid gland) ক্ষীতি এবং কঠিনত (আয়োড) এবং তদ্রূপ রাত্রিতে নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়া ; গলার মধ্যে স্থী বিধানের ভাষ বেদনা ।

পাকস্থলী । ক্ষুধার অত্যন্ত বৃদ্ধি ; মুখে তিক্ত স্বাদ (আস্, ডাই, নাক্স-বন্, পাল্-স) বাহা গলার মধ্যেই অধিক অনুভূত হয় ।

মূত্রযন্ত্র । বারবার প্রস্রাব করার ইচ্ছা বা চেষ্টা ।

পুরুষ জনেন্দ্রিয় । অণুকোষের ক্ষীতি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে চাপিয়া ধরার ভাষ বেদনা (ক্রিমेटিস্, রডোড্) ; থেণ্ডুলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে অথবা নিঙ্ড়াইলে যেরূপ হয়, অণুকোষে সেরূপ কষ্টদায়ক চিন্চনে বেদনা (একন্, আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, রডোড্) ; অণুকোষ হইতে শুক্র নিঃসারক সূত্র (Spermatic Cord) পর্যন্ত স্থী বিধানের ভাষ বেদনা বা যাতনা (ক্রিমेटিস্) ; শুক্র নিঃসারক সূত্র ক্ষীত এবং অত্যন্ত বেদনাব্যুক্ত হয় ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বসভঙ্গ ; শ্বস কাটিয়া যার অর্থাৎ কথা বলিতে বলিতে শ্বস বন্ধ হয় ; বায়ুনলের উপরিভাগে অত্যন্ত শুষ্কবোধ ; স্পর্শ করিলে বায়ুনলের উপরিভাগে বেদনার উদ্রেক হয় (একন্, ল্যাক্) ; মাথা ঘুরাইল বা ফিরাইলে কঠনালীতে বেদনা ; কঠনালী, বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র বায়ুনলের প্রদাহ ; কঠনালীর আক্ষেপ (Laryngismus Stridulus) ; ডেলার ভাষ কোন একটা পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, কঠনালীতে সেরূপ বাধ বাধ বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস প্রবাসের ব্যাঘাত ; বুকের নিম্ন প্রদেশে বেদনা বা টাটানি এবং অনবরত কাশি, বুকের উক্ত প্রদেশ হইতে

বাহার উদ্রেক হয়; খেউ খেউ শব্দ বিশিষ্ট শুষ্ক কাশি (বেল্); যুঁড়ীর জ্বর গভীর বা সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট এবং হাঁপানির জ্বর কাশি; দিবা রাত্রি শুষ্ক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে জ্বালাহুতব; মাথা নিচু করিয়া শয়ন করিলে, অত্যন্ত উষ্ণ ঘরে, শুষ্ক, ঠাণ্ডা বাতাসে কাশির বৃদ্ধি (একন্, হিপ্-সাল্ফ্) এবং আহার বা পানের পর কাশির উপশম; শ্বাস প্রশ্বাসে, সাঁই সাঁই, হিম্ হিম্ এবং করাতে কাঠ চিরার জ্বর শব্দ হয় ও শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্টাহুতব, নিশ্বাস টানিলে বা শয়ন করিয়া থাকিলে বাহার বৃদ্ধি হয়; গলা দিয়া হরিত্রাবর্ণের চট্ চটিয়া আঠা বা কঠিন স্লেমা নির্গমন; গলা দিয়া লোন্ডা স্বাদ বিশিষ্ট স্লেমা নির্গমন; শ্বাস কষ্ট এবং বুকের অত্যন্ত দুর্বলতা, বাহার দ্রুণ সামান্য শারীরিক পরিশ্রম করিলেই রোগী কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্ট অহুতব করে (হিপ্-সাল্ফ্, ঠানাম্); শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়া রোগীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া; কাশিবার সময় বুক এবং বায়ুনগে জ্বালা এবং টাটানি এবং গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বর অহুত হয়; এক-খানি শুকনা স্পঞ্জের মধ্য দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসে যেকণ অহুত হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে সেকণ অহুত হয়; পুরাতন আকাবেব কাশি এবং কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া কঠিন ক্ষুদ্র ফোটক নির্গত হয়; গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে স্লেমা নির্গমন; রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না; ফুফুস-প্রদাহের সারিরা যাওয়ার অবস্থা; বাম ফুফুসের ফোটক রোগ (Tuberculosis) বাহা ফুফুসের উপরিভাগে আরম্ভ হয়।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। প্রবল হৃৎস্পন্দন (একন্, আর্স্, বেল্, লাইকোপাস্, স্পাইজেল্, সাল্ফ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ বেদনা এবং শ্বাস প্রশ্বাসে বাঁধ বাঁধ বোধ হওয়া; রাত্রি ছই প্রহরের সময় শ্বাস বদ্ধ হইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইয়া রোগীর অত্যন্ত যাতনার তাবের উদ্রেক হয়। নাড়ী পূর্ণ, কঠিন এবং দ্রুতগামী (একন্, বেল্, বিরেট্-বিরাইড্); জংগ্রাস্ লু (Angina Pectoris); বৃক্ সঙ্কটক বেদনা; বৃক্-গরম বোধ, শ্বাস রোধ, হৃৎপিণ্ডের তাব এবং প্রচুর ঘর্ম; এরটা (Aorta) নামক বৃহৎ ধমনির প্রদাহ, ক্ষীতি এবং বিলুপ্তি; থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ক কাশি, শয়ন করিয়া থাকিলে বাহার বৃদ্ধি হয়; রক্তস্রাবের বিষণ্ণ বাত জনিত প্রদাহ (Rhe-

matic Endocarditis); হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেকবার স্পন্দনের সঙ্গে সেরা সেরা শব্দ হয়।

গ্রীবা। গ্রীবা এবং গলগণ্ড মধ্যের পেশী শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। বাম হৃৎকের সন্ধির নিকটবর্তী স্থানের পেশীর স্পন্দন; ডাইন হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথায় বিল ধরার স্থান বেদনা বা বাতনা, নড়াচড়াতে বাহা সমুদয় অঙ্গুলীতে বিস্তৃত হয়।

জ্বর। শরীর উষ্ণ এবং চর্ম উষ্ণ ও শুক (একন, আম); শরীর উষ্ণ হওয়ায় দক্ষণ অত্যন্ত বাতনা, মুখমণ্ডল লালবর্ণ; সর্বদা কঁাদ কঁাদ ভাব এবং রোগীকে কোন মতেই সান্তনা করা যায় না; আত্মিক অর বা অরবিকার।

নিদ্রা। সর্বদা নিদ্রার ভাব, তাই তোলা, শরীরের জড়তা বা অবশবোধ, অপরাহ্নেই বাহা অধিক অস্থিত হয়; স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

ব্যবহার। গলগণ্ড (Goitre); ঝুড়ী কাশি (Croup); কণ্ঠনালী প্রদাহ (Laryngitis); কণ্ঠনালীর আক্রমণ; বারুনল প্রদাহ; যক্ষাকণ; এক শিরার ব্যারাম (Orchitis); পোতার জল হওয়া বা উহার প্রদাহ (Hydrocele); হৃৎপিণ্ডের বাহ্যিক অস্থি; হৃদস্তাবরক ঝিল্লীর বাত জনিত প্রদাহ (Rheumatic Endocarditis); এর্টা (Aorta) নামক বৃহৎ ধমনির প্রদাহ, ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি ইত্যাদি অস্থি স্পঞ্জিয়া ব্যবহার্য। টেষ্টিস (Teste) মতে ইহা হৃদস্তাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pericarditis), কুক্ষুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pleurisy) এবং অত্র বেট ঝিল্লী প্রদাহে (Peritonitis) ব্যবহার্য। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, চিকিৎসার কল দেখিয়া তিনি টেষ্টিস উক্ত মতের পোষকতা করিতে পারেন না।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সামান্য শারীরিক পরিশ্রমে অত্যন্ত দুর্বলতা এবং শরীরে ভারি বোধ ও উহার সঙ্গে মনের অত্যন্ত উত্তেজ, বমনোদ্বগ, মুখমণ্ডল শিটা এবং শ্বাস কষ্ট; শরীরের স্থানে স্থানে দাঁড়ের স্থান কুড়ী জীলোক এবং বালক বালিকাগণের অস্থি; রাজিতে, মাথা

লিচু করিয়া শয়ন করিলে, ঘরের মধ্যে থাকিলে অথবা উচ্চস্থানে উঠিলে
অশ্বখের বৃদ্ধি হয় এবং নীচে নামিতে, আহার এবং পানের পর (কাশির),
সোজা হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে অশ্বখের উপশম ইত্যাদি স্পঞ্জিয়ার
কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগ্ৰণ বিশিষ্ট ঔষধ । স্পঞ্জিয়ার কার্যের সঙ্গে আয়োডিন্,
ব্রোমিন্, হিপার সাল্ফিউরিড্, ক্যালী-বাইক্লরিকাম্, সেলিনিয়ামেস
কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের
সঙ্গে একোনাট্ট, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব, কোনা-
রাম্, ড্রুসিরা, ইগ্নেসিয়া, লাইকোপডিয়াস্, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স-ব্রিক্যা,
কল্করাস্, পল্গেস্টিলা, রাস্ টক্স, মিপিয়া, স্পাইজেলিয়া এবং সাল্ফারের
কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্ফার ।

ডাইলুশন বিচার । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে,
ষুঃভীকাশি, কণ্ঠনালীর অশ্বখে সন্মুদয় প্রকারের ডাইলুশনই উপকারী ।
তিনি উক্ত সকল প্রকারের অশ্বখেই ১১ এবং ২য় দশমিক ডাইলুশন ব্যব-
হার করিয়া কল পাইয়া থাকেন । কংপিওর অশ্বখে ১২ হইতে ৩০ ডাইলু-
শন ব্যবহার্য । ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই আমরা সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া
থাকি । গলগণ্ড এবং একশিয়ার পক্ষে ১ম এবং ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া
এক প্রেইণ মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে ।

স্ট্যানাম্,-(টিন্),-স্ট্যানাম্

(STANNUM,—(TIN),-STANN.)

কোন এক বিষম হোমিওপ্যাথিক ঔষধানল হইতে আদিত স্ট্যানাম্ ক্রম
করিয়া উহাতে যথা নিম্নে স্থগার অব্ মিল্ক্ মিথাইরা ৩য় শতভাগিক ক্রম
পর্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শতভাগিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা
নিম্নে ৪র্থ শতভাগিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কঙ্গেরকা মস্ত্যক উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দক্ষণ গতি উৎপাদনের সহায়কারী বস্ত্রাদির অত্যন্ত বল-
কর, পক্ষাঘাত, আঁকেশ এবং দায়ু শুলের জার বেদনা উৎপন্ন হয় । বাস
যন্ত্রের মৈত্রিক বিস্তার উপরও ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দক্ষণ উক্ত
বিল্লী প্রদাহযুক্ত হইয়া গলাদিয়া গ্রন্থের পরিমাণে পূর্ব মিশ্রিত স্লেমা নির্গত
হয়, বাহুল্য বিস্তৃত হয় এবং বাস যন্ত্রের দায়ু শুলির অত্যন্ত বলকর হয় ।
হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্তা মৃত মহাত্মা ডাক্তার সায়রেল্ হানিমান টোনাংকে
কুমিনাশক ঔষধ বলিয়া অনেক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন । তিনি বলিয়া
গিয়াছেন যে, অস্ত্রের মধ্যে কুমি হইলে টোনাং সেবনে অস্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত
কুমি মরিয়া যায় এবং কোনও প্রকার রেচক ঔষধ রোগীকে খাওয়াইলে
মলের সঙ্গে অস্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত কুমিগুলি নির্গত হয় । অস্ত্রে কুমি থাকুক
আর না থাকুক যদি পরিপাক কার্যের সহায়কারী যন্ত্রের অস্থি কুমির লক্ষ-
ণের জার লক্ষণাদি বর্তমান থাকে, তবে টোনাং দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মনের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং অস্থিরতা ; সর্বদা বিমর্ষ এবং
নিস্তব্ধতা ও কাঁদিবার স্বভাব (ইয়েস্, নেট্রাম্-মিউর, পাস্, স্, রাস্টক্) ;
চুপে চুপে বক্ বক্ করা ; অনিচ্ছা পূর্বক এবং হঠাৎ প্রেমের উত্তর করা ।

অস্ত্রক । জায়ুশুলের জার মাথাধরা বাহা আন্তে আন্তে এবং মৃদু-
ভাবে আরম্ভ হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া পুনরায় ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায় ;
কপালে চাপা বোধ বাহা মধ্যদেশ হইতে বহির্দেশে বিস্তৃত হয় ; মাথার
উপরিভাগে এবং কপালে আঁটা এবং চাপা বোধ বাহা আন্তে আন্তে বৃদ্ধি
পায় এবং আন্তে কমে ; মাথার সম্মুখ ভাগে চাপিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া
ফেলার জার বেদনা ; কপালের বাম পার্শ্ব, কপাল এবং ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের
(Cerebellum) মধ্য দিয়া ব্যাকি লাগার জার অস্বস্ত হইয়া উক্ত স্থানে
যুশ্ যুশ্ চাপা বোধ থাকিয়া যায়, বিশ্রাম কালীন বাহার বৃদ্ধি হয় এবং
নড়া চড়াতে বাহার উপশম হয় ; কপালের দুই পার্শ্ব দপ্পলিয়া বেদনা ।

চক্ষু । বাম চক্ষের নাকের নিকট বর্তী কোণে ফোকা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
ব্রণের জার ক্ষুদ্র বাহা নেত্র নালীর (Fistula Lachrymalis) জার বৃদ্ধি

হয়; আঙনী (Stye) হইলে যে রূপ হয়, বার চক্কের নাকের নিকটবর্তী কোণে দেহের চাপিয়া ধরার জ্বার বেদনা; রাস্ত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় আঁটিয়া লাগিয়া থাকে (ক্যাল্‌ক্-কার্ক, লাইকোপ্‌, মার্ক্‌, সাইলিসি, রাস্‌-টল্‌, সাল্‌ফ্‌)।

মুখমণ্ডল । মুখ মণ্ডল শিটা এবং বসিয়া যায়। মুখ মণ্ডল রুধ ।

মুখ মণ্ডল এবং গলার মধ্য । জিহ্বা হরিদ্রা বর্ণের স্লেয়া দ্বারা লেপযুক্ত; মুখে অত্যন্ত হর্ষক (আর্বিফা, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, ক্রিয়াজ্‌, আয়োড্‌, নাইট্রিক্‌-অ্যাস্‌)। গলার মধ্যে গাঢ়, আটাল, ধূসরের আভাযুক্ত, রক্তমিশ্রিত স্লেয়ার লগার; স্লেয়া ফুলিবার সময় বমনের উল্লেখ হয়; গলার মধ্যে অত্যন্ত শুকাহুতব এবং হাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বার চড়্‌চড়ানি বা জ্বালাহুতব, গিলিবার সময়ই বাহা অধিক অহুত হয় (আলায়্‌, আর্জেন্ট্‌-নাইট্রিক্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌)।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত কুণা, কিছু রোগী বখোচিত পরিমাণে খাইতে পারে না (ব্রাই, ফেরাম্‌, লাইকোপ্‌); আহ্বারের পর দ্রুত জ্বাৰ বিশিষ্ট উদগার উঠা (ব্রাই, চায়না, নাক্স-বম্‌), বমনোদগ, বিশেষতঃ আহ্বারের পর এবং তৎপর পিত্ত বমন (নাক্স-বম্‌); রক্ত বমন (হোমোমেলিস্‌, ওপিয়াম্‌, নাক্স-বম্‌, পডোফ্‌); পাকস্থলীতে ভারি এবং চাপা বোধ এবং স্পর্শনে উহাতে টাটানি; পাকস্থলীতে খিলখরা। উদরে খালি খালি বোধ (কস্‌, সিপিয়া); উদর স্পর্শনেও টাটার (এপিস্‌, ব্রাই, বেল্‌)।

মল । বারবার বাহের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; মলের সঙ্গে ক্রিমি নির্গত হয়; শূল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল রুধ ।

জরনেন্দ্রিয় । কোন প্রকারের স্বপ্ন না দেখিয়াই পুরুষের অঙ্গাঙ্গে বা অনিচ্ছাপূর্বক ধাতু নিঃসরণ। স্রোতালকের অবায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়া (Pro-lapsus uteri) এবং অরায়ু যেন বোনিদ্বার দিয়া স্রোতালের ঠেদিয়া বাহির হইতেছে এরূপ অহুত হওয়া ।

শ্বাস-যন্ত্র । শ্বসতক এবং কঠিনালীতে বশ্‌বশে বোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ক অত্যন্ত হর্ষকবোধ (কার্কো-বেজ্‌-কস্‌); বারুনলের মধ্যে

অতিরিক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মার সঞ্চয় (আন্টি-টার্ট, ইলিকাক, অস্মিয়াম, কস) বাহ্য সামান্য ক্যান্সলেই নির্গত হয়; ক্যান্সি এবং তদ্রূপ গলায় মধ্যে টাঁচিয়া ফেলার ভায় অধুত হয় ও উহার সঙ্গে গলা দিয়া সবুজের আভা-যুক্ত পদার্থ নির্গত হয় (সাইলিসি); গলা দিয়া হুর্গকবুজ, মিষ্টবাদ-বিশিষ্ট পদার্থ নির্গমন (ক্যাক্-কার্ক); সঞ্চার সময় শয়ন করিবার পূর্বে ক্যান্সির বৃদ্ধি; ক্যান্সির দরুণ বায়ুনল এবং বুক টাটানি (কষ্ট, নাস-বহ); সঞ্চার সময়, বিছানায় শয়ন করিলে, রাত্রি ছই প্রহর পর্যন্ত শুক ক্যান্সি এবং গলা দিয়া অল্প পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন; বকের হুর্গলতার দরুণ স্বরভঙ্গ এবং মুহু স্বর বিশিষ্ট শুক ক্যান্সি; গলা দিয়া হরিজ্রাবর্ণের বিশ্রী স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন (ক্যাক্-কার্ক); গলাদিয়া ধূসরের আভাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন (লাই-কোপ); গলা দিয়া গাঢ় শ্লেষ্মা এবং রক্ত নির্গমন; গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে সবুজের আভাযুক্ত পদার্থ নির্গমন (সাইলিসি); গলা দিয়া পচা, বা মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট (ক্যাক্-কার্ক), অথবা লোন্তা স্বাদ-বিশিষ্ট পদার্থ নির্গমন (আছা, ক্যাল্-কার্ক, কাকৌ-বেজ, কস, সিগিয়া); বকের মধ্যে শ্লেষ্মা থাকিলে ঘেরূপ হয়, বকের মধ্যে সেরূপ হুঙ্ হুঙ্ করার দরুণ অনবরত কুণ্ কুণ্ ক্যান্সি; উচ্চ স্থানে উঠিবার সময় শ্বাস কষ্ট এবং শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়া (একন্, আমন্-কার্ক, আন্, ক্যাক্-কার্ক, ক্যাক্ট); সামান্য নড়াচড়াতেই শ্বাস কষ্ট বা শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়া; সঞ্চার সময় শ্বাসকষ্ট, বাহার দরুণ রোগী গায়ের কাপড় ঢল ঢলে করিয়া দিতে বাধ্য হয়; বকের মধ্যে অত্যন্ত হুর্গল এবং পালিবোধ; আঁটিয়া ধরিলে ঘেরূপ হয়, বকের মধ্যে সেরূপ কষ্টান্তব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ নিশ্বাস টানিবার স্বভাব ও মনের অত্যন্ত উবেগ; বকের মধ্যে অত্যন্ত টাটানি; বকের বাম পার্শ্বে স্থলী বিধানের ভায় বা কর্তনবৎ প্রথর-বেদন (ক্যালী-কার্ক, কস, সিগিয়া)।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । বাহ এবং পায় ভারিবোধ ও পক্ষাঘাতের ভায় অত্যন্ত হুর্গল বোধ; সঞ্চার সময় হাত পায়ের পাতা ক্ষীত হয়।

ব্যবহার । হুঙ্স এবং কঠনালী সম্বন্ধীয় যক্ষাকান (Pulmonary and Laryngeal Phthisis); বায়ুনল প্রদাহ; রক্তোৎকাশ; বক্ষ শোথ;

পুঁবাতির অতিরিক্ত নিঃসরণের দরুণ জ্বর বা হেক্টিক্ ফিবার (Hectic Fever); পক্ষাঘাত; মৃগী রোগ; হিষ্টিরিয়া; মুখ বঙলে বেদনা বা স্নায়ুশূল; কৃমি জনিত অন্ত্র ইত্যাদি রোগে ঠানাম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলহীন, বাহ্যিক দরুণ রোগী অনবরত বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয় (সাইলেন্সি); নীচের ঘর হইতে উপরের ঘরে সিঁড়ি ভালিয়া উঠিবার সময় হুঙ্কার ভাব; সজোরে কথা বলিলে বা পুস্তকাদি পড়িলে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে (ককিউল); বেদনাদি আন্তে আন্তে আরম্ভ হয়, আন্তে আন্তে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়; সমুদয় শরীরে শীত বোধ; প্রাতঃকালে এবং রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে দুর্বলকারক বর্ষ (চায়না, কফ, সাল্ফ-আম্) বাহ্যতে অত্যন্ত পচা গন্ধ থাকে (নাক্স-বম্, টাকিস; নড়া চড়া, কথা বলা, উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে নামিতে অন্ত্রের বৃদ্ধি এবং চলিয়া বেড়াইলে ও চীত হইয়া শয়ন করিলে অন্ত্রের উপশম ইত্যাদি ঠানামের কতকগুলি প্রধান প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। জীলোকের জরায়ুর অন্ত্রে ঠানামের কার্য্য অনেকটা সিলিয়ার কার্য্যের ত্রায়। জরায়ুর উপর ইহার কার্য্য অনেকটা আর্জেন্টাম্, কুপ্রোম্ এবং লিকামের ত্রায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্য আদিনিব, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যালেকেরিয়া কার্ক, কটিকাম্, চায়না, হেলিবোরাস, লাইকোপডিয়াম্, পাল্‌সেটিলা, স্ককরাস্, রাস্-টল্, স্পাইক্সিলেয়া এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের ত্রায়।

প্রতিষেধক ঔষধ। পাল্‌সেটিলা।

ডাইলুশন বিচার। হানিমানের মতে এই ঔষধের ৩য় ক্রমের গুঁড়াতেই যথোচিত ফল পাওয়া যায়। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes), ডাক্তার বেজ্ (Dr. Bayes) এবং ডাক্তার ড্রুরি (Dr. Drury) মতে ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন অধিক উপকারী। মৃগি, হিষ্টিরিয়া এবং কাশিতে ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া এবং জরায়ুর অন্ত্র ৩, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া লেবক যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন।

ষ্ট্রামোনিয়াম, -(ধূতুরা),-ষ্ট্রামন

(STRAMONIUM,—STRAM.)

ধূতুরাগাছ বোধ হয় এতদ্দেশে সকল লোকেই জানেন। ইহা পৃথিবীর
প্রায় সমুদয় স্থানেই জন্মে। এই গাছের পাতা, ডাঁটা ইত্যাদি সমুদয় অংশই
এক স্পিরিটে তিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্কের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল।
ইহা মস্তিষ্কে চঞ্চল করিয়া উহার কার্য করার শক্তিকে বিকৃত করে,
যাহার দরুণ বমনোদ্বেগ, প্রলাপ এবং নানা প্রকারের কাল্পনিক বিকটাকার
দেখা ইত্যাদি বেলাডোনা এবং হায়োসায়েনেসের স্তায় মস্তিষ্ক আক্রান্ত
হওয়ার কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার প্রলাপ বেলাডোনা
বা হায়োসায়েনেসের প্রলাপ অপেক্ষা অধিক প্রবল বা উগ্র হয়; ষ্ট্রামো-
নিয়ামের প্রলাপ এবং উন্মত্ততা বেলাডোনা এবং হায়োসায়েনেস অপেক্ষা
অধিক উগ্র বা প্রবল। মস্তিষ্কে রক্তাধিকা বা রক্তাবরোধ করা সত্ত্বে
ইহার ক্ষমতা হায়োসায়েনেস অপেক্ষা অধিক প্রবল বা উগ্র বটে, কিন্তু উহা
বেলাডোনা অপেক্ষা অনেক কম প্রবল বা উগ্র। ইহা মস্তিষ্কের প্রস্তুত
প্রদাহ উৎপাদন করিতে পারে না। ইহা গলার মধ্যে এবং চর্শ্বের
উপর আরক্ত অরের ফুসুড়ীর স্তায় আঙনের স্তায় লাগ ফুসুড়ী উৎপাদন
করে। মস্তিষ্কের উত্তেজনা হেতুই ইহা শব্দের অত্যন্ত অংশের উপর
কার্য করিয়া থাকে। উক্ত প্রকারের কার্যের দরুণ চক্ষুর তারা বিকৃত
হয়, শব্দবোধ সমুদয় অংশের স্পর্শ জ্ঞান শক্তির হ্রাস হয়, বিশেষ বিশেষ
ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়, আক্কেপ (Convulsions), স্ত্রী বা পুরুষ মহাবাদের অভ্যন্ত
ইচ্ছা, স্মৃতিবরোধ ইত্যাদি লক্ষণ গুলি প্রকাশ পায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। উগ্র প্রলাপ (বেল্, ক্যাহ্); অত্যন্ত ভয় (বেল্, বিয়েট্-
আল্‌ব্); সর্বদা গলায়ন করার চেষ্টা; বিছানা হইতে উঠিয়া বাঙরার
চেষ্টা (বেল্); অনবরত অসংলগ্ন কথা বলা; হাসি (হায়োস); মানসিক

এবং শারীরিক শক্তির অত্যন্ত হ্রাসগতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোন ক্ষুদ্র দ্রব্য ভুলিয়া বা কুড়াইয়া তোলার ভাব বাহ্য মূত্বের কতকগুলি পূর্বস্হই সচরাচর অধিক দেখিতে পাওয়া যায় (বেল্, হারোস্); জ্বী বা পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা; বিদেশীয় ভাবায় কথা বলা; উন্মত্ততা; অলোক দেখা এবং অস্ত্র লোকের নিকট থাকিবার ইচ্ছা (ক্রিমাঙ্, হারোস্); সময়ে সময়ে রাগান্বিত হইয়া লোককে মারা বা মারিবার চেষ্টা করা; নর্কসা অহঙ্কারের ভাব এবং একগোঁসামী (প্লাটিনা, ল্যাক্); চীৎকার করা, কামড়াণ এবং নথ দ্বারা আচ্ছাদন; ভঁরখাওয়া; উল্লাসিত এবং সন্তোষের ভাব, গান করা এবং নাচা (ক্রোকাস্); দ্রব দেখা (আনার্কার্ড্, হারোস্, ক্যানাবিস্-ইণ্ড্), বাহার দরুণ-রোগী অত্যন্ত ভয় খায় (আবিসিন্); বিকট আকার দেখা, অপরিচিত লোকের মুখ বা আকৃতি দেখা, অথবা রোগী মনে করে যেন ভয়ানক জন্তুগুলি তাহার পার্শ্বের দিকে লাফাইতেছে, অথবা তাহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে, বাহার দরুণ সে অত্যন্ত কাতুল হয়; জলাতক (Hydrophobia) (বেল্, হারোস্); জল বা জলীয় পদার্থ পানে অনিচ্ছা বা ভয়; জল, আয়না, বা কোন প্রকারের চক্চকে দ্রব্য দেখিলেই আক্ষেপের (Convulsions) উদ্বেগ হয়; গলার মধ্যের আক্ষেপিক সঙ্কোচন; ভয় খাইয়া পেশীর অনিচ্ছা পূর্বক স্পন্দন বা কোরিয়া (Oborea); মৃগীরোগ; উন্মত্ততা; শুষ্ক বায়ু (Mealancholia); সমুদয় ইন্দ্রিয়ের লজ্জতা বা উহার ভীতভাবগ্রাহিতা; পর্যায়ক্রমে উল্লাস এবং বিষম ভাব; সকল লোক এবং সকল বিষয়ে উদ্বীণীনতা (বার্কেট্, কস্, কস্-আস্); রোগীর (ছোট বালক বা বালিকা) ঘুম ভাঙার পর সে প্রথম যে বস্তু সম্মুখে দেখে সে তাহাতেই ভয় খায় (বেল্) এবং উক্ত বস্তু হইতে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে চাহে; অজ্ঞাতসারে নাক দিয়া গৌঁ গৌঁ শব্দ করা; মাড়ি নিরদিষ্টে ঝুলিয়া পড়ে; হাত এবং পায়ে পাতার স্পন্দন; চক্ষুর তারিা বিস্থত (ওপিয়াম্); শ্রবণ শক্তির হ্রাসগতা বা হ্রাস (আনার্কার্ড্, ক্রিমাঙ্, ল্যাক্, বাক্, নেট্রাম্-মিউর); মনে যে ভাবের উদ্ভব হয় কথা বলিতে বলিতে তাহা ভুলিয়া যাওয়া; রোগী কোন বস্তুই প্রকৃত নাম বলিতে পারে না।

অনুভব । আঁখাখোঁরা, বাহার দরুণ রোগী অন্ধকারে চলিতে পারে না এবং চলিতে চলিতে বাম বা পক্ষাৎদিকে তুলিয়া পড়ে (বেল); মধ্য পান করিলে যেরূপ হয়, মাথা সেরূপ টলে (আগারিকাশ); মস্তিকে প্রবল রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (বেল); মাথার উচ্ছ্বাস; মাথার উপরি-ভাগ এবং কপালে দপ দপানি; মুচ্ছা; দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তির বিনাশ; মুখমণ্ডল ক্ষীণ এবং টল্‌টলে; মাথার আক্কেপিক সঞ্চালন, বিশেষতঃ ডাইন সিকে বায়হার মাথা উঠান; অবসন্নতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি এবং শ্রবণ শক্তির বিনাশ ও অচেতনতা (হারোস্, ওপিয়াম); মাথার গাতলা বোধ; কাকিমিয়া বালিস হইতে মাথা তুলিয়া পক্ষাৎদিকে ছাড়িয়া দেওয়া; মস্তিকের শোভ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার আক্কেপিক সঞ্চালন; বাতাক্রান্ত শিরঃস্পীড়া ।

চক্ষু । চক্ষু বিজ্ঞতরূপে ধোলা, হিরডাব বিশিষ্ট এবং বহিম্বিক আকৃষ্ট (আমিল্‌নাইটেট্, নেব্রা, বেল্, হারোস্, ওপিয়াম্), উজ্জল এবং বিকৃত; চক্ষুর ভায়া বিজ্ঞত (বেল্, হারোস্, ওপিয়াম্) এবং কখন কখন অচল এবং উহাতে আলোক জ্ঞান থাকে না (সিকুটা, ডিজিট্); চক্ষুর মৌজক ঝিল্লী কাল্‌চে লাল বর্ণ, বাহার দরুণ মনে হয় যেন চক্ষের রক্ত বহা নালীগুলি ময়লা তরল পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ; সম্পূর্ণ অন্ধতা, অথবা কণিক অন্ধতা; আলোক চক্ষে লাগে বা সহ হয় না; রোগী আলোক দেখিলে পলায়ন করে; উজ্জল আলোক অথবা চক্‌চকে পদার্থ দেখিলেই আক্কেপের উদ্রেক হয় ।

কর্ণ । কানে কম শুনা ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল উচ্চ, লালবর্ণ এবং শোথের ভায়া টল্‌টলে ও ক্ষীণ (একন্, বেল্, ওপিয়াম্); চক্ষু পাগলের ভায়া; মুখাকৃতি ডন্ন উৎপা-দক; মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন (আগারিকাশ, আন্টি-টার্ট্, সিকুটা, ইগ্নেসস্); কপাল কোঁচকান; মনে হয় যেন মুখমণ্ডল বাতাবিক অপেক্ষা লম্বা হইরাছে; মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বের বিসর্প (Erysipelas) এবং উহার সঙ্গে মস্তিকাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Meningitis); পর্যায়ক্রমে পক্ষাবাক্ত এবং আক্কেপের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়; মুখমণ্ডলের আয়তন; বাতনার দরুণ

রোগী পাগলের ভায় হয় ; সমুদ্র শরীরের মধ্য দিয়া আক্কেপিক থাকি বা থাকি লাগা ; রোগী বাহ উপরের দিকে ছোড়ে ; কপালের চর্ম কৌচকান ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা ক্ষীত, শক্ত, শুষ্ক এবং অতিকষ্টে সঞ্চালন করা যায় ; তৌত্‌লার ভায় কথা বলা (কষ্ট, ক্যানাবিস-ইন্ড, সেনেন), অথবা কথা বলিতে একবারে অশক্তি (হারোস) ; মুখগহ্বর এবং উহার পশ্চাত্তাগে অত্যন্ত শুষ্কাত্তব ; মুখদিয়া চক্‌চকে লাল বহিরা পড়ে ; দাঁতে দাঁতে কড়মড় শব্দ করা ; মুখে রক্তমিশ্রিত কেশা উঠে (আর্স, সিকেল) । গলার মধ্যের শুষ্কতা এবং উহার আক্কেপিক সঙ্কোচনের দরুণ গিলিতে অশক্তি (বেল, হারোস, লরোস, প্রাচাস, বিরেট্-আর্) ; গলার মধ্য অত্যন্ত শুষ্ক বোধ (এপিস, নাস্-মক্‌, রাস্-টক্‌) ।

পাকস্থলী এবং উদর । প্রবল পিপাসা এবং টক জ্বা পানের ইচ্ছা (আর্টি টার্, চারনা, ক্‌, বিরেট্-আর্) ; হিকা ; বমনোদ্বগ্‌ ; বমন ; বক্ষ এবং উদর কোটরের মধ্যবর্তী গোল পেথীর প্রদাহ (Diaphragmatitis) ; প্রলাপ ; ডায়েফ্রামে আগা গোড়া জ্বালাতত্তব ; বাস প্রবাস ঘন ঘন ; আক্কেপ ; জল পান করিতে মিলে জল পান করিতে চাহে না ; সকল প্রকারের দ্রব্যেই বাসের ভায় স্বাদ । উদর ক্ষীত এবং বিজ্‌ত, কিছু কষ্টান নহে ; উদরে বেদনা, বাহার দরুণ মনে হয় যেন কেহ নাতি সঙ্কোরে টানিয়া বাহির করিতেছে ; শূল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীত কম্প ।

মল এবং মূত্র । মল, মুত্রাবরোধ ; শিশুগণের ওলাউঠা ; দুর্গন্ধ-বৃদ্ধ মল ভেদ ; টেরা চক্‌ তাকান ; ভয় খাইয়া রোগীর ঘূষ ভাদিয়া যায় ; মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা ; কোষ্ঠবদ্ধ ; মূত্র আন্তে আন্তে মুহূর্ত্তাবে নির্গত হয় (একন্‌, কষ্ট) ; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র নির্গমন (আর্স, বেল, সিকুটা, হারোস, ওপিরাস্) ; হস্তমৈথুন, বাহার দরুণ মূগীরোগ হয় ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের পুরুষ সহবাস এবং পুরুষের জীপহ-বাসের অত্যন্ত ইচ্ছা ; জীলোকের কানোন্ততা (কাহ্‌, চারনা, প্রাটিনা) । অরাস্‌ হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে এই ঔষধের মন সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা ।

বাস যন্ত্র । বরভঙ্গ বা স্বর সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট, উচ্চ, চিকণ,

টিটি শব্দ বিশিষ্ট এবং অস্পষ্ট ; মাতাল দিগের কাশি ; বাস প্রবাস ঘন ঘন এবং কষ্টকর ; বুকের সম্বোধন হেতু বাসরোধ ইওয়ার উপক্রম হওয়া (আসাকিটিডা, ইগ্নেন্স) ; বুকে লাল ক্ষুদ্রী ; মোহক অর ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্পন্দন (একন্, বেল্, প্পাইজেল্) ; নাড়ী দ্রুতগামী, পূর্ণ ও প্রবল ; কোমল, মৃদুগতি বিশিষ্ট ও দ্রুতগামী ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । বাহু এবং হাতের আক্কেপিক সকালন ; বিছানার কাপড়াদি ভোকান (খোঁটা) এবং সার্কালিক অবসরতা ; আঙ্গুল হাড় বা নখকোণী এবং উহাতে অসহ্য বেদনা ; আক্রান্ত স্থানে পূর্ব হইলে উহার ঘর্ষণাদির এই ঔষধে উপশম হয় ; হাত পায়ের স্পন্দন বা ঝাকনি (বেল্, হারোস্) ; পেঙ্গীর অগ্রভাগের স্পন্দন বা ঝাকনি (হারোস্, ক্যালী-আরোড্) ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাঁপনি (ককিউল্, কোনায়াম্, জেল্, মার্ক্) ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় হয় ; উরুর মধ্যদেশ ক্ষীত এবং লালবর্ণ ।

চর্ম । সমুদয় শরীরে উজ্জ্বল লালবর্ণের ক্ষুদ্রী (এপিস্, এরাদ্, বেল্, রাস্-টক্স) ।

নিদ্রা । ঘুমেরধোরে মাঝে গোঁ গোঁ শব্দ হওয়া ; গভীর নিদ্রা (লরোস্, ওপিয়াম্) ; অস্থির নিদ্রা ও বিছানায় বারবার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করা ও শরীরের স্পন্দন ; নিজার ইচ্ছা বা ঝিমান, কিন্তু নিদ্রা ভাল হয় না (বেল্, ল্যাক্, ওপিয়াম্) ; চীৎ হইয়া চক্ষু খোলা রাখিয়া এক দৃষ্টে তাকাইয়া ঘুমান (ওপিয়াম্) ; ভয় থাকিলে ঘেরূপ হয়, ঘুম ভাঙ্গিলে সেরূপ জড়মড় হওয়া ।

জ্বর । সমুদয় শরীর, বিশেষতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শীতল ; শীতলাবস্থার মাথা উষ্ণ ; রোগী গায় কাপড় রাখিতে চাহে না ; মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং লালবর্ণ এবং পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ; প্রবল জ্বর ; চর্ম শুষ্ক এবং আন্তনের স্থায় গরম, বিশেষতঃ মাথা এবং মুখমণ্ডল (বেল্) ; সমুদয় শরীরে শীতল ঘর্ম (আন্টি-টার্ট্, আর্স্, কুপ্রাস্, ডিফ্রিট্, বিরেট্-আৰ্) ; শিশু এবং ছোট বালক বালিকাগণের জ্বর ; ঘুমেরধোরে কাঁদিয়া উঠা ; ঘুমেরধোরে চমকিয়া উঠা বা শরীরের ঝাকনি ; চক্ষু মর্দ্ব খোলা থাকা ; চক্ষুর তারা বড় ও বিস্তৃত ; স্রাবরোধ ।

ব্যবহার । প্রবল তরুণ উন্নততা ; মনোমত্ততা (Delirium Tremens) ; জলাতক (Hydrophobia) ; জীলোকের কানোমত্ততা (Nymphomania) ; আক্ষেপ বা কন্‌বাল্‌সন্স ; মূগীরোগ ; কোরিয়া (Chorea) ; হিষ্টিরিয়া ; চেতনাশূন্য আক্ষেপ ; ভব খাইয়া আক্ষেপিক অস্থখ ; গুল্‌ফায়ের টিক উপরিভাগের হাড়ে বেদনা ; পক্ষাঘাত ; পারার (Mercury) দ্ব্যশরীরে প্রবেশ করায় দরুণ অস্থখ ; আরক্তঅর ; হার অর ; পার কোন প্রকারের ফোটিক রোগের ফোটিক বসিয়া বাওয়া ; ছপিং কক ; আরক্ত অরের পর শোধ ; পোড়া বা, আঙ্গুল হাড়া বা নখকোণী ইত্যাদি অস্থখে ট্রিমোনিয়াম ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । প্রায় অস্থখেই যন্ত্রণা বা বেদনাদি অধিক অস্থত হয় না ; আক্ষেপের সঙ্গে জ্ঞানের কোনও বৈলক্ষ্য্য হয় না ; উজ্জল আলোক, স্পর্শন বা সামান্য আঘাতেই আক্ষেপের পুনরাক্রমণ আরম্ভ হয় ; বেচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গ সঞ্চালনের সহায়কারী পেশীর স্পন্দন ; সমুদয় শরীর শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না (সিকুটা, কুপ্রাস, ওপিয়ারাম) ; ঘাম-মণ্ডলীর অতিরিক্ত চেতনা ; রোগী আপনাকে আপনি অত্যন্ত লম্বা মনে করে ; মল, মূত্র বর্ণ ইত্যাদি স্বাভাবিক নিঃসরণ রুদ্ধ হওয়া ; ভব খাইলে বেরুণ হয়, সমুদয় শরীরের সেরুণ কম্পন (জেল্ম) ; বারম্বার শরীর স্পন্দন (আগারিকান্স, সিকুটা) ; শরীরের মধ্য দিয়া হঠাৎ ঝাকি বা ধাক্কা লাগার জায় অস্থত হওয়া ; আক্ষেপ হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অচল হয় এবং তদরুণ অস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত রোগী অঙ্গাদি সঞ্চালন করিতে পারে না ; জল দেখিলে বা খাইলে আক্ষেপের উজ্জেক হয় ; সমুদয় শরীরের অনবরত অস্থিরতা ; লংড়াণ রোগের পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাত ; একাকী থাকিলে, অন্ধকারে, স্পর্শনে, চক্‌চকে বস্তুর পানে তাকাইলে, গিলিবার সময়, বিশেষতঃ জল বা জলীয় পদার্থ গিলিবার সময়, অস্থখের বৃদ্ধি এবং ঘরের মধ্যে থাকিলে, উজ্জল আলোকে বা অস্ত্রাজ লোকের সঙ্গে থাকিলে, শীতল জলে অস্থখের উপশম ইত্যাদি ট্রিমোনিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । রক্তের উপর ট্রিমোনিয়ামের কার্য্যের

টিরিবিথিনা ।

৫৬৩

সঙ্গে হায়োসায়েরাস্ এবং বেলাডোনার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।
এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আগারিকান্, ক্যামোমিল, ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা, ইগ্‌নেসিয়া, আর্সিনিক, ব্রাইওনিয়া, সিকুটা, লাইকো-পডিয়াম্, নাক্স বমিকা, ওপিয়াম্, প্লাঘাম্, পাল্‌মেটোলা, সাল্‌ফার এবং বিরেট্রাম্ আল্‌বামের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। বেলাডোনা, হায়োসায়েরাস্, নাক্স বমিকা।
অধিক মাত্রায় মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে লেবুর রস, বিনিগার (Vinegar) এবং তামাক ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। ডাক্তার আণ্ডারউড্ (Dr. Underwood) বলেন যে, উন্নততা, প্রলাপ ও স্তম্ভিলোকের কামোন্মত্ততা বা পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ব্যগ্রতা, মূগীরোগ, আক্কেপ বা কন্‌বাল্‌সন্স্, ব্রায়ুশ্ল এবং আক্কেপ বা শ্ল বেদনা ইত্যাদি আক্কেপিক অন্ত্রে ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। লেখকও ডাক্তার আণ্ডারউডের উক্ত মতের পোষকতা করেন। পক্ষাঘাত বা পক্ষাঘাতের অবস্থা, মাথাঘোরা, অনমনতা, মস্তিষ্কের শোথ, পাকস্থলী এবং অন্ত্রের অন্ত্র, বমনোদ্বেষণ, বমন এবং উদরায়ন, মল, মূত্র, বর্ষ ইত্যাদি স্বাভাবিক নিঃসরণ রুদ্ধ হওয়ার দরুণ অন্ত্রে ১২ হইতে ৩০ ক্রম পর্যন্ত ব্যবহার্য। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার করিয়া তিনি সকল প্রকার অন্ত্রেই যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন।

টিরিবিথিনা,—টার্পিন্ তৈল,—টিরেব্

(TEREBINTHINA,—TARPENTINE,—TEREB)

কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধানলয় হইতে আদত পরিষ্কৃত (Distilled) তার্পিন তৈল ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে রেকটিকাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার মিশ্র আরোক (Dilutions) প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । মূত্রকোষের উগর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দ্রুণ উক্ত বস্তুর উত্তেজনা, রক্তাবরোধ এবং প্রদাহ হইয়া থাকে ও রক্ত মূত্র (Haematuria) এবং আলবুমিনুরিয়া (Albuminuria) ইত্যাদি অস্থখ হইয়া থাকে । ইহা কতক পরিমাণে শ্লেষ্মা উৎপাদক ঝিল্লীর উপরাত্ম-শও আক্রমণ করিয়া উহাতে রক্তাবরোধ এবং শ্লেষ্মা জনিত প্রদাহ উৎপাদন করে । কিন্তু ইহা মূত্রাধার ও মূত্রনালীর শৈল্পিক ঝিল্লীই অধিক পরিমাণে আক্রমণ করে এবং তদ্রূপ উক্ত বস্তুর প্রদাহযুক্ত হইয়া মূত্রকৃচ্ছ হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মানসিক অবসন্নতা; মূত্রাববোধ হওয়ার দ্রুণ ঘোর অচে-
তনতার ভাব (ইউরিমিয়া, - Uraemia) (ফল্) ।

মস্তক । মাথাঘোবা; শিরঃশীড়া; মাথার অত্যন্ত চাপা এবং পূর্ণ বোধ ।

নাসিকা । নাকদিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব (একন্. বেল্, ব্রাই, হামামেলিস্) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা এবং নাটক বন্ধ বিশিষ্ট (আস্) ।

মুখগহ্বর । জিহ্বা লাল বর্ণ, নির্মল এবং চক্চকে ।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা শূন্যতা; শ্লেষ্মা বমন; পাকস্থলীতে আগ্নেয়ভব । উদর অত্যন্ত স্ফীত এবং বিস্তৃত (চায়না, গ্রীক্, হিপ্পোক্ৰাট্); মনে হয় যেন উদরের মধ্যে একস্থান হঠাৎ অপর স্থানে বিদ্যাতের জায় কোন পদার্থ হঠাৎ আনাগোনা করে (একন্. কস্. আস্); শূল বেদনা ।

মল । জলবৎ তরল শ্লেষ্মা ভেদ, যাহা প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পায়; অস্ত্রের শ্লেষ্মা জনিত অস্থপের দ্রুণ উদরামব এবং ~~মূত্র~~ মল সঙ্গ মল মূত্র কোষের প্রদাহ ।

মূত্রবস্ত্র । মূত্রকোষ প্রদেশে ভারি এবং চাপা বোধ; মূত্র কোষ প্রদেশে আগ্নেয় বা কসিয়া ধরার জায় প্রবল বেদনা; মূত্রকৃচ্ছ এবং মূত্র ত্যাগের পর মূত্র নাগীতে অত্যন্ত আলা, টাটানি এবং চড়্চড়ানি (ক্যাঙ্ক্); মূত্র পবিনাণে অন্ন এবং রক্ত মিশ্রিত (আস্, ক্যাঙ্ক্, কল্চ্, হামামেলিস্); মূত্রে বায়োলেট্ (Violet) নামক ফুলের গন্ধ ।

খাসযন্ত্র । ক্ষুদ্র রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইলে ধেরূপ হর, সরূপ খাস কষ্ট ; বায়ুনের ভৈষ্যিক ঝিল্লীর অত্যন্ত শুষ্কতা ।

নাড়ী । নাড়ী দ্রুতগামী, ক্ষুদ্র, স্তম্ভবৎ স্পন্দ এবং নৃপ্ত প্রায় ।

ব্যবহার । মূত্র কোষ প্রদাহ (Nephritis) ; মূত্র কোষের ব্রাইটস্ ডিজিজ্ (Bright's Disease of the kidneys) ; রক্তমূত্র ত্যাগ (Haematuria) ; মূত্রাধার প্রদাহ ; মূত্র নালীর প্রদাহ ; প্রমেহ রোগ ; অস্ত্রের কত এবং উহা হইতে রক্তস্রাব ; কৃমি ; উদরাময় ; শোথ ; শরীর শীর্ণ হওয়া ; ওলাউঠার প্রতি জ্বরের পর মূত্রাবরোধ এবং তদরূপ ইউরিমিয়া (Uræmia) হইয়া বিকারের লক্ষণ ইত্যাদি অন্তর্থে টিরিবিম্বিনা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত বলক্ষয় (আর্স্, চায়না, কস্) ; কখন কখন চর্ম্মের নীচে স্পন্দন (হায়োস্, ট্রায়ন্) ; সমুদয় শরীরে ঠাণ্ডা চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম (ক্যাম্ফার, টেবেকাম্, বিরেট্-আল্‌ব্) ইত্যাদি টিরি-বিম্বিনার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ক্যাস্‌হারিস্ এবং কোপেইবা ।

প্রতিষেধক ঔষধ । কক্ষরাস্ ।

ডাইলুশন বিচার । ৩২ এবং ৬৪ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) ১ম হইতে ৩২ দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন । অনেক টিকিংসক ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন ।

ধূজা অক্সিডেন্টালিস্,—ধূজা

(THUJA OCCIDENTALIS,—THUJA OCC.)

ক্যানেন্ডা এবং ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সের অনেক স্থানে এই গাছ জন্মিয়া থাকে । ঐ সকল স্থানে ইহার চাষও হইয়া থাকে । ইহার অল্প বা কচি

পাতা ডাঁটা যথা নিয়মে ২০° ডিগ্রী ওয়ার প্রক্‌ স্পিরিটে তিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মুত্র বহু, জঁমনেন্দ্রিয়, শুষ্কতার এবং চর্মের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল । ইহা উক্ত বস্তুদ্বিকে উত্তেজিত করিয়া উহার স্বাভাবিক নিঃসরণকে পরিবর্তিত এবং উহাকে অল্প ও ক্ষতকারক গুণ বিশিষ্ট পদার্থে পরিণত করে ; উক্ত তরল পদার্থ গুলিকে বিগলনাবস্থায় আনয়ন করিয়া আক্রান্ত অংশগুলিকে বিনাশ করে । চর্ম এবং স্নৈয়িক ক্রিমীর উপর আঁচিলের ভায় ছুসুড়ী এবং স্নৈয়িক আব্‌ (Warts and Condylomata) উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ মধ্যে পরিগণিত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অত্যন্ত মানসিক অন্তরিতা এবং অবসন্নতা ; সর্বদা কান্দবার ইচ্ছা বা স্বভাব (অরাম্‌, ইগ্নেন্স্‌, পাল্‌স্‌, ক্রিয়ার্জ্‌, রাস্‌-ট্রজ্‌) ; সকল বিষয়েই অসহ্যতা ; চিড়্‌, চিড়্‌ করা ; এক গোঁয়ারি (ব্রাই, কাম্‌, নাক্স্‌-বম্‌) ; বাঁচিবার অনিচ্ছা (অরাম্‌) ; চিন্তা করিতে অশক্তি ; আন্তে আন্তে কথা বলা, বাহ্যিক দরুণ মনে হয় যেন উপযুক্ত শব্দ স্রবণ হয় না ; কথা বলিতে বা লিখিতে ভুল হয় ; কথা বলিতে বা লিখিতে হুই এক শব্দ ছাড়িয়া দেওয়া বা বানানাদিতে ভুল যাওয়া (ডাল্‌ক্‌, লাইকোপ্‌) ; মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা (চায়না, কন্‌-আস্‌, নাক্স্‌-বম্‌) ; সমুদয় বিষয়েই সহজে ভুলিয়া যাওয়া বা স্রবণ শক্তির হ্রাস (আনাকার্ড্‌, নাক্স্‌-মফ্‌) ; মনে হয় যেন পেটের মধ্যে কোন জীবিত বস্তু আছে ।

মস্তক । মাথার গোলমেলে বোধ ; চক্ষু বুদ্ধিলে মাথাঘোরা (ল্যাক্‌) ; প্রাতঃকালে মাথা ধরা, বাহ্যিক দরুণ কখন কখন মনে হয় যেন গালের রেলার অস্থি (Malar bone) এবং উপরের মাড়ি প্রদেশ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইবে ; আবার কখন কখন মনে হয় যেন মাথার উপরিতাপে যেন একটী কাঁটা দিয়া হানিতেছে ; আবার কখন কখন মনে হয় যেন কপাল কাটিয়া পড়িয়া যাইবে, বচির্কারুতে চলিয়া বেড়াইলে বাহ্যিক

উপশম হয়; কপাল, কপালের হুই পার্শ্ব এবং মাথার পশ্চাৎ ভাগে ছিঁকিরা
কেলার ভায় বেদনা, রাজিতে এবং শয়ন করিয়া থাকিলে বাহার হুজি
হয়; কপালের হুই পার্শ্ব, কপাল এবং চক্ষুর উপরিভাগে হিত্র করা বা
শুচী বিধানের ভায় বেদনা; কপালের বাম পার্শ্বের উচ্চ স্থানে এবং মাথার
ডাইন পার্শ্বে কাঁটা বিধাইয়া দেওয়ার ভায় বাতনা (আর্গিকা, আগান্নিকান্,
আনাকার্ড্, কফিরা); মাথার চুল কঠিন, শুক এবং জ্যোতিশূত্র হয় ও
পড়িয়া যায়; মাথা অত্যন্ত টাটায়, বাহার দরুণ মাথার সামান্য স্পর্শনও
সহ্য হয় না (একন্, বেল্, চায়না, মার্ক্, নেট্রাম্-মিউর, নাইট্রিক্-আস্) ।

চক্ষু । চক্ষুর ষেতাংশ প্রদাহযুক্ত এবং রক্তের ভায় লালবর্ণ
(বেল্); বালি প্রবেশ করিলে বেক্রপ হয়, চক্ষের মধ্যে সেক্রপ চাপা এবং
শুক বোধ (আস্, কষ্ট্, হিপ্-সাল্ফ্); চক্ষু এবং চক্ষুর পাতার আলা এবং
হল ফুটানের ভায় অহুত হয় (আস্); রাজিতে চক্ষুর পাতার পাতার
লাগিয়া থাকে (ক্যাল্-কার্ক্, গ্রাফ্, লাইকোপ্, সাল্ফ্); একধানি
সরুকাপড় বা কুরাশার মধ্য দিয়া তাকাইলে বেক্রপ হয়, চক্ষে সেক্রপ
ঝাপ্সা দেখা (কোকোশ্, কষ্ট্, নেট্রাম্-মিউর, ফস্, পিট্রোল্, মিসিরা);
চক্ষুর সম্মুখে ভাড়াভাড়ি পাবীর ডানা ঝাড়ার ভায় ধক্ধক্ করা;
আলোক যেন জোনাকী পোকার ভায় দৃষ্ট হয় (আগান্নিকান্, লাইক্রেমেন্,
মার্ক্); চক্ষুর আইরিসের প্রদাহ (Iritis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আইরিসে
সৈন্সিক ফোটক (Condylomata); চক্ষুর মধ্যে বাটিয়া ধরা এবং উহার
সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর উপর ও উহার চতুর্স্পাশ্বর্তী স্থানে অত্যন্ত উষ্ণত্ব;
চক্ষুর পাতার উপর আঁচিলের ভায় দানা দানা ফুসুড়ী (Granular-lids);
চক্ষুর পাতার যৌগিক জিলির প্রদাহ (Conjunctivitis), রাজে ভাল হুয়
না হইলে বাহার হুজি হয়; চক্ষুর পাতার উপর ভূবির ভায় শুকনো
ফুসুড়ী; চক্ষুর পাতার আবের (Tumour) পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

কর্ণ । কান দিয়া পচা মাংসের গন্ধযুক্ত জলবৎ তরল পূর্ব
নিঃসরণ ।

নাসিকা । নাসারুদ্ধে বেদনাক্ত ক্ষত এবং চুনটি পড়া (আলাহ্,
আন্টি-ক্লড্, ক্যালী-বাই, পাল্শ্); নাকের পাতার স্বীতি, উহার কঠি-

নভা এবং উহাতে কসিয়া ধরার জ্বর বেদনা ; নাকের পাতার লাল চূর্ণকালি বিশিষ্ট ক্ষুদ্রী বাহা হইতে কখন কখন কল্‌তানি পড়ে ; নাক দিয়া হর্গকযুক্ত পূর্ব সংযুক্ত স্লেয়া নির্গমন (গ্রাক্, হিপ্-সাল্‌ক্, নাইট্রিক্-আস্) ; শুষ্ক সর্দি, বাহার দক্ষণ নাগরক্, শুষ্ক এবং বহু হয়, সন্ধ্যার সময় বাহার বৃদ্ধি হয় ; নাকের গোড়ার অত্যন্ত কষ্টদায়ক চাপা বোধ (একন্, ক্যালী-বাই, মার্ক্-আয়োড্) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল এবং গালের হাড়ে ছিদ্র করা বা খনন করার জ্বর বেদনা, স্পর্শনে বাহার উপশম হয় ; উপরের ওষ্ঠে, ওষ্ঠের কোণের নিকট কাকি লাগার জ্বর অম্লভূত হয় ; মুখ মণ্ডলে মধ্যে মধ্যে দম্‌কা উচ্চাশ্রুত্ব ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দীর্ঘ কাল্‌চে হরিত্রা বর্ণ এবং উহাতে টাটানি (আয়োড্) ; জিহ্বায় ক্ষত এবং ফোঁকা (নাইট্রিক্-আস্) ; জিহ্বা ক্ষীত এবং উহাতে জালা এবং টাটানি ; জিহ্বার অগ্রভাগ স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায় ; জিহ্বার নীচে ফোড়ার জ্বর নীলবর্ণের ক্ষীতি এবং উহার চতুঃস্পার্শ্ববর্তী স্থানের শিরার ক্ষীতি ও বিস্তৃতি ; মুখের মধ্যে বা বা ক্ষত ; পুড়িলে বেরুণ হয়, মুখের মধ্যে সেকুণ অম্লভূত হয় (আইরিস্, পাল্‌স্, লাক্সনেরিয়া, সাল্‌ক্-আস্) ; গলার মধ্যে চট্‌চটিয়া আঠা স্লেহ্যার দধার বাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় (আলাস্, আমন্-কার্ক্, ক্যালী-বাই) ; গলার মধ্য শুষ্ক এবং শশ্‌ধশে ।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধাশূন্যতা ; উদর উঠা, পিপাসার অত্যন্ত বৃদ্ধি, বিশেষতঃ রাত্রিতে ; পাকস্থলীতে কঠিন বোধ । উদরের পার্শ্বে স্থলীবিধানের জ্বর অম্লভূত হয় ; উদর বর্দ্ধিত এবং ক্ষীত ; গর্ভাবস্থার ক্রম হাত পা বিস্তৃত করিলে বেরুণ হয়, উদরের স্থানে স্থানে সেকুণ উচ্চ হওয়ার জ্বর দৃষ্ট হয় ; উদরের মধ্যে কোন জীবিত পদার্থ নড়িতেছে একুণ অম্লভূত হয়, কিন্তু উহার দক্ষণ কোন বাতনাধি অম্লভূত হয় না (ক্রোকাশ্) ; আহারের পর উদর অত্যন্ত বড় হয় (চারনা, নাক্স-বন্) ; উদর দ্বিগুণ বা ততোধিক ক্ষীত এবং বিস্তৃত হয় ; উদরের মধ্যে গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হয় এবং উদরের মধ্যে যেন কোন জন্তু ডাকিতেছে একুণ ।

অবহৃত হয় (কলোস্) ; কুঁচকির গ্রন্থির ক্ষীতি এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা (ক্যাণ্‌ক্-কার্ক্, ক্রিমোটিন্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, রাড্-টর) ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্কদ্বারে কন্ড্রিকফোটক (Condylomata) ; মলভ্যাগের সময় শুষ্ক দ্বারের কঠোরক সঙ্কোচন ; শুষ্কদ্বারে কতক তদ্রূপ আলা এবং স্পর্শনে উহাতে অত্যন্ত টাটানি (সাল্‌ফ্) ; অর্শরোগ এবং তদ্রূপ শুষ্কদ্বারে বলী বাহা সামান্য স্পর্শনেই অত্যন্ত টাটান ; শুষ্কদ্বারে অত্যন্ত কঠোর স্থলীভিধানের জ্বার বেদনা ; হিমায়রেডেল্ শিরাত্তে (Hæmorrhoidal vessels) চাপিয়া ধরার জ্বার বাতনা বা আলাতুভব ; শুষ্কদ্বারে চুলকানি (সাল্‌ফ্, নাক্স-বম্, সাইলিসি, সিলিরা) ; প্রত্যহ প্রাতঃকালে উদরান্নর (আলোজ্, কমেজ্, সাল্‌ফ্) ; প্রাতঃকালে, প্রথম আহারের পর, উদরান্নর ; দাঁড়ের সময় কখন কখন পেটে বেদনা থাকে এবং কখন বা বেদনা থাকে না ; মল উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ (চেলিডন্), অলবৎ তরল বাহা অতি বেগে শুষ্কদ্বার দিয়া নির্গত হয় (ক্রেটিন্, প্রটিওলা) এবং মল ভ্যাগের সময় অত্যন্ত প্রবল শব্দে দ্বিধিতবায়ু নিঃসরণ (আলোজ্) ; গিপার কুজ্ ছিত্র দিয়া অল নির্গত হইলে বেরূপ হয়, মলভ্যাগের সময় লেহণ শব্দ হওয়া ; কোঠিবদ্ধ (আলাম্, ড্রাই, নাক্স-বম্, ওশিয়াম্, কস্, সাল্‌ফ্) ।

মূত্রযন্ত্র । বারবার মূত্র ভ্যাগের ইচ্ছা এবং প্রচুর পরিমাণে মূত্র ভ্যাগ, মূত্রভ্যাগের পর মনে হয় যেন আরো করেক কোঁটা মূত্র মূত্র-নালী দিয়া বহিরা পড়িতেছে ; মূত্র নির্গমনের সময় মূত্রনালীতে আলাতুভব (অ্যাস্, কোনারাম্, নেট্রাম্-কার্ক্) ; মূত্র পরিমাণে অল্প, কাল্‌চে ; মূত্র পরিমাণে অধিক এবং অলবৎ, প্রমেহ রোগ এবং তদ্রূপ স্লেগা দ্বারা মূত্র নালীর মুখ বদ্ধ হইয়া থাকা ; মূত্রনালী দিয়া হরিদ্রার আভাযুক্ত স্লেগ নিঃসরণ (হাইড্রাট্, মার্ক্) ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষাঙ্গের বাথার (Glans penis) আবরক চর্মেয় উপর (Prepuce) আঁচিলের জ্বার আর্জ্ কুণ্ডী (নাইট্রিক্-অ্যাস্, টাকিন্) ; প্রিপাসের ক্ষীতি ; রাস্ এবং প্রিপাসের চুলকানি (সাল্‌ফ্) ; রাস্তিতে পুরুষাঙ্গ খাড়া এবং তদ্রূপ অত্যন্ত কঠোরভূত হয় ; বাতু নিঃসরণ ; জন-

মেন্জির, বিশেষতঃ অণ্ডকোষাধারে এবং শুষ্ক হার ও অণ্ডকোষাধারের মধ্যবর্তী স্থানে (Perineum) অচূর দ্বন্দ্ব (সাইলিসি, সাল্ফ্); পুরুষাঙ্গে গরমীর ঘা এবং তদ্রূপ মনে হয় যেন পুরুষাঙ্গে একখানি চৌচ বিধিয়া রহিয়াছে; প্রমেহ রোগের ক্রম নিঃসরণ বদ্ধ হওয়ার দরুণ সন্ধিবাত; প্রোট্ট গ্রন্থির প্রদাহ (Prostatitis); পুরুষাঙ্গে অঁচিলের জ্বর কুহুড়ী; কবজভঙ্গ। জ্বালোকের যোনি দ্বারা দিতে অঁচিলের জ্বর কুহুড়ী হইয়া উঠা হইতে কল্‌তানি, রক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত ক্রম নিঃসরণ (নাইট্রিক-আস); যোনি, বোনি দ্বারা দিতে কামড়ানী এবং চুলকানি; শ্বেতপ্রসব এবং তদ্রূপ যোনিদ্বার দিয়া প্রস্রাব জ্বর ক্রম নিঃসরণ; বাম ভিষকোষ প্রদাহযুক্ত বাহ্য প্রত্যেকবার রক্তস্রাবের সময় বৃদ্ধি হয়; ভিষকোষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক জ্বালা এবং বেদনা যাহা চলিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি হয় এবং বাহ্য দরুণ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; যোনি, বোনিদ্বার এবং জ্বরায়ু ইত্যাদিতে খাড়া আকারের ক্রান্তি বা আব (Tumour) এবং উহাতে আলাহুভব; গর্ভসকায়ের তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব।

খাস যন্ত্র। বাস প্রবাস ঘন ঘন; হাঁপানি কাশি (আস্); আহায়েব পরই কাশি।

জুংপিণ্ড। স্পষ্টতঃ জংস্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায় (মোনরেন্, স্পাইজেল), কিন্তু উহার দরুণ রোগীর কোন বিশেষ উৎসেগ নাই।

পৃষ্ঠদেশ। বসিয়া থাকিলে কোমরের পশ্চাৎদেশের ঠিক নিম্নভাগ, শুষ্ক হারের উপরিভাগের হাড় এবং উরুদেশে বেদনা; অনেককাল বসিয়া থাকা বা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে অশক্তি; মেরুদণ্ড বাকা হয়, বাহ্য দরুণ রোগী সমুখদিকে বাকিয়া দাঁড়ায়; উদর উঁচু হয়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। নখ বাকান এবং আব্‌ডু থাবডু (সাঁটি-ক্রুড); নখ মটকা বা কোমল; নখ বাকা হইয়া পড়ে (নেট্রাম-মিউর, সাল্ফ্); হাত এবং পায়ের পাতা কাঁপে। উত্তর কুঁচকির সন্ধি যেন শিথিল হয়, বাহ্য দরুণ চলিতে কষ্ট অসহ্য হয়; পায়ের পাতায় দ্বন্দ্ব (নাইট্রিক-আস, সিলিয়া, সাইলিসি, সাল্ফ্)।

চর্ম। শরীরের নানা স্থানে, বিশেষতঃ হাত এবং অননেন্জিরে,

অঁচিলের জায় ফুজুড়ী (নাইট্রিক্-অ্যাস, ফস্-অ্যাস, টাকিস্); শরীরের নানা স্থানে অত্যন্ত চুলকানি ।

নিদ্রা । অনিবার্য নিদ্রাশ্রুতা (সিমিসিক্, কফিয়া); বায় পার্শ্ব শয়ন করিলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন উৎপাদক এবং অত্যন্ত কষ্টদায়ক স্বপ্ন দেখা ।

যক্ষ্ম । রাস্তিতে প্রচুর পরিমাণে হরিজ্ঞা বর্ণের দর্শ, বাহার দক্ষণ মনে হয় যেন বিছানার চাদর তৈলে ভিজান হইরাছে ।

ব্যবহার । শরীরের স্থানে স্থানে স্নৈমিক স্ফোটক (Condylomata); গায় গরমীর ব্যারাম জন্মিত দাদের জায় ফুজুড়ী; পুরুষাঙ্গ এবং ঘোম্মি দ্বারে অনিবার্য গরমীর বা; প্রমেহ রোগ; অঁচিল; জিহ্বার নীচে ক্ষোতি; মুখে বা; মুখমণ্ডলের বেদনা বা স্নায়ুশূল; হাঁপানি কাশি; ইংরেজী টিকা দেওয়ার দক্ষণ অমুখ (সাইলিসি) ইত্যাদি অমুখে খুজা ব্যবস্থা ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শরীরের উষ্ণাংশের নানা স্থানে-কাকি লাগা; আক্রান্ত স্থান শীর্ণ হয় এবং উহাতে স্পর্শ জ্ঞান থাকে না; সন্ধিতে শোথ; লম্বিকাধিক্য ধাতুতে (Lymphatic temperament) বিশেষ উপকারী; প্রাতঃকালে এবং পূর্বাহ্নে, অপরাহ্ন ওটার পর, বিস্ত্রায় কালীন, বিছানার উচ্চতাতে, মদ্যপানে, তামাক খাইলে অমুখের রক্তি এবং বহির্-কান্ধ ও উত্তাপে অমুখের উপশম ইত্যাদি খুজার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । জননেজিয় এবং মূত্র বহ্নের উপর খুজার কার্যের সঙ্গে ক্যানাবিস্ সাটাইবা, কাহ্‌হারিস্, কোপেইবা, মার্কিউ-রিরাস্, পিট্রোসেলিনাম্ এবং পাল্‌সেটিগার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । অঁচিলের জায় ফুজুড়ীর উপর ইহার কার্যের সঙ্গে নাইট্রিক্ অ্যাসিডের কার্যের অনেকটা সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে ষ্টাকিসেগ্রিয়া এবং সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যানোমিলা, ক্যান্‌ফার, মার্কিউরিয়াস্, পাল্‌সেটিলা, সাল্‌ফার ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম হইতে ৩০ পর্যন্ত সমুদয় ডাইলুশনই ব্যব-হৃত হইয়া থাকে । ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হটকা

থাকে। লেখক ৬ এবং ১২ ডাইলুশনই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার ২০০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া চক্ষুর পাতার মধ্যদেশ এবং বোজক বিলীয় উপর গরমীর ব্যারাম জনিত স্নৈয়িক ফোটকের (Mucous tubercles) ৩৪টি যোগীর চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। খুঁড়ার মূল আরোক একটি তুলিতে লইয়া আঁচিলে লাগাইলে আঁচিল মরিয়া বা চুলিয়া বাইতে দেখা যায়। পুরুষ বা স্ত্রী জননেদ্বিধে উক্ত প্রকারের স্নৈয়িক ফোটক বা আঁচিল হইলে উক্ত প্রকারে মূল আরোকের বাহু প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়।

বিরেট্রায় বিরাইড্,—বিরেট্-বির্

(VERATRUM VIRIDE,—VER. VIR.)

আমেরিকার কাদা বিশিষ্ট এবং ভিজা ভূমিতে এই গাছ জন্মে। ইহার শুকনা মূল একক্লিওরিতে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার, বিশেষতঃ নিউ-মোগাস্ট্রিক নার্ভ (Pneumogastric nerve) উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দ্রুত মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জা সম্বন্ধীয় নার্ভের উৎপত্তি স্থান, গতি উৎপাদনের সহায়কারী নার্ভ এবং রক্তসঞ্চালনের সহায়কারী সমুদয় বস্ত্রের পক্ষাঘাত হইয়া মস্তিষ্ক ও অন্ত্রান্ত বস্ত্রে অত্যন্ত রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং তদ্রূপ প্রদাহ হয়। যে সকল বস্ত্র নিউমোগাস্ট্রিক নার্ভ (Pneumogastric nerve) কার্য্যাবধীন, (যথা হৃৎকুম্ব এবং পাকস্থলী) সে সকল বস্ত্রই উক্ত প্রকারে আক্রান্ত হইয়া থাকে। বেলাডোনা এবং এই প্রকার অন্ত্রান্ত ঔষধ মস্তিষ্কে যে প্রকারের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ উৎপাদন করিয়া মস্তিষ্কে প্রদাহ উৎপাদন করে, বিরেট্রায় বিরাইড্ সে রূপ না করিয়া নার্ভ মণ্ডলীর পক্ষাঘাত উৎপাদন করিয়া মস্তিষ্কের উক্ত প্রকার অবস্থা আনয়ন করে। ইহা গতিশক্তি উৎপাদনের সহায়কারী নার্ভগুলির জ্বলন্ততা বা বলকর উৎপাদন করিয়া আক্কেপ উৎপাদন করার দ্রুত শরীরের

নানী স্থানে কোরিভোর (Chorea) ক্রার বৈজ্ঞানিক উদ্বেক হইয়া থাকে ।
 স্থূলপিণ্ড এবং রক্ত-সঞ্চালনের সহায়কারী বস্তুর উপর ইহার কার্য অতি
 প্রবল হওয়ার দরুন স্থূলপিণ্ডের উচ্চ শক্তি বিশিষ্ট প্রবল স্পন্দন ও নাড়ী
 ক্রান্তগামী হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস মুহু মুহু ও বিলম্বে বিলম্বে বহিয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সর্বদা ব্যগ্ৰতা করার স্বভাব এবং প্রলাপ বলা; মস্তিষ্কে
 রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হেতু উন্মত্ততা (বেল) ।

মস্তক । মাথাধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাবোরা; মাথার
 বেদনা ঘাড়া বাড় হইতে আরম্ভ হয় (সাক্সনেরিয়া); মাথার পূর্ণ এবং ভারি
 বোধ; মাথার অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (একন-
 বেল); মাথার সমুখভাগে অভ্যন্ত বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন
 (আইরিস); মস্তিষ্কের আকরক স্নায়ু প্রদাহ; প্রবল অর; মাথার প্রবল
 রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং তৎপরে মাথা বারংবার এদিক ওদিক
 ঘুরাণ; বমন; অথবা মুখমণ্ডল ক্রম এবং শীতল; নাড়ী মৃদুগতি বিশিষ্ট
 এবং শ্বাস কষ্ট ।

চক্ষু । চক্ষুর তাম্রা বিকৃত (এইলাছ, বেল, সিকুটা, ওলিয়াম্, ট্রায়ন);
 চক্ষু কম দেখা, বস। অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে বা দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলে বা
 চলিয়া বেড়াইলে বাহা অধিক অস্বস্তিত হয়; কোন বস্তুর দিকে অনেককণ
 ভ্রমাইয়া থাকিলে উক্ত বস্তু ভাল দেখিতে পাওয়া যায় না ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল আরক্ত এবং উলটলে (বেল, ব্যাপ্ট),
 শিটা, শীতল, নীলের আভাশ্রু এবং শীতল বর্ণধারা আবৃত (বিরেট্ট-
 আল ব); মুখমণ্ডলের পেশীর আকস্মিক স্পন্দন (আগারিকাশ, সিকুটা,
 ইগ্নেস, নাক্স-বম) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখগহ্বর এবং ওষ্ঠ শুষ্ক; মুখে
 গাঢ় স্বেদার সঞ্চায়; হাল উষ্ণতা গেলে ঘেরণ হয়, জিহ্বার স্বেদন অস্বস্তিত
 হয় (কলোস, আইরিস, প্লাটিনা, সাক্সনেরিয়া, সাল্ক-আস); জিহ্বা হরিত্রা
 বর্ণ এবং উহার মধ্যদেশে লাল দাগ পড়ে । মুখ গহ্বরের পশ্চাত্তানে

এবং আহারবহা গলনালীতে জালা ও তদ্রূপ অনবরত ঢোক গিলিবার ইচ্ছা; আহারবহা গলনালীর আক্ষেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন গলা দিয়া ফেণাযুক্ত রক্ত মিশ্রিত স্লেমা নির্গত হয়, কখন-বা স্লেমা নির্গত হয় না ।

পাকস্থলী এবং উদর । প্রায় অনবরতই কষ্টদায়ক হিকা (সিকুটা, হারোস্, ইগ্নেস্, সাল্‌ফ্‌-আন্‌) ; এবং বমনোবেগ এবং বমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গীতল চর্ম (বিরেট্‌-অল্‌ব্‌, টেবেকাম্‌) ; সামান্য পরিমাণে আহার বা পানীয় দ্রব্য উদরস্থ হইলেই বমন দ্বারা উদ্রিয়া পড়ে ; পাকস্থলীর নিম্নদেশে অত্যন্ত কষ্টদায়ক প্রবল বেদনা ; পাকস্থলীতে মোচড়ান বা ছিঁড়িয়া ফেলার ভাব বেদনা । নাভির ডাইনমিকে বেদনা বাহা কুঁচকি পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; বন্তিকোটরের উপরিভাগে আড়াআড়ি বেদনা এবং টাটানি ; অত্র প্রদাহ (Enteritis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর এবং রক্তবহা নালীর অতিরিক্ত উত্তেজনা, বমন এবং কাল্‌চে রক্ত ভেদ ।

মল । আত্মিক জ্বর বা জ্বরবিকারে কাল্‌চে রক্ত ভেদ, স্নাত্তিতে এবং প্রাতঃকালে বাহা অধিক হয় ।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় । রজঃস্রাব জনিত অস্থখ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে অত্যন্ত রক্তাবিক্য (বেল্‌) ; স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর উদ্রততা (বেল্‌, হারোস্, প্রাটিনা, ট্রায়ম) ; আক্ষেপ বা কন্‌বাল্‌সল্‌ ।

শ্বাস যন্ত্র । শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর, বৃহৎ এবং অত্যন্ত চেঁচামাথা (এই প্রথম স্বেবনে শ্বাস প্রশ্বাস প্রতি মিনিটে ৪৯ হইতে ১৬ বারের ন্যায়) ; বৃক্ক কষ্টগ্রস্তত্ব ; বৃক্ক রক্তাবিক্য বা রক্তাবরোধ (একন্‌) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে অনবরত জ্বালাযুক্ত দৃশ্য-দৃশ্যে বেদনা ; হৃৎপিণ্ড উচ্চ শব্দে এবং প্রবলবেগে স্পন্দন করে ও উহার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত সঞ্চালনের অত্যন্ত উত্তেজনা (একন্‌, বেল্‌) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঝড়ি এবং ঝড়ে অত্যন্ত কন্‌কনানি ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । গা, হাত এবং পায়ের আঙ্গুলে ঝিল ধরা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গ্যাল্‌বানিক্‌ ব্যাটারী নামক যন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত বা প্রভাব লাগে ।

চর্ম । গায় দৃক্‌ড়ী ; হানজর, আরক্ত জরের কুঁকড়ী, বসন্ত এবং

উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর এবং ধমনির অতিরিক্ত উত্তেজনা ও কখন কখন কুক্ষী প্রকোপ পাইবার পূর্বে আক্কেপ (Convulsions) হয় ।

জ্বর । শীতবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ; সমুদয় শরীর শীতল; মুখমণ্ডল, হাত এবং পায়ের পাতার শীতল বর্ণ (আস্, ক্যান্ফার, টেবেকাম্, বিরেট্রাম্ আল্ বাম্) ; জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী পূর্ণ, কঠিন এবং ক্রতগামী (একন্, বেল্) ; উত্তেজনা জনিত জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ও তদ্রূপ আক্কেপ (শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের) ; প্রচুর ঘ্র্ষ এবং তদ্রূপ অত্যন্ত দুর্বলতা বা বলহীনতা (কন্) ।

ব্যবহার । ফেটিক, ছাম, বসন্ত ইত্যাদি এবং অন্যান্য প্রকারের জ্বর বাহাতে ধমনির অত্যন্ত উত্তেজনা থাকে ; কুক্ষ্ প্রদাহ ; কুক্ষ্-বরক ঝিল্লী প্রদাহ ; রক্তাধিক্য, রক্তাবরোধ, মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ, বৃক, মেরুদণ্ড এবং পাকস্থলীতে বাহা অধিক হয় ; কোরিয়া (Chorea) ; আক্কেপ বা কন্বাল্ সন্স ; হৃতিকাবস্থার আক্কেপ ; মৃগীর আক্কেপ ; মস্তিষ্ক এবং কন্স-ক্রকা মজ্জাবরক ঝিল্লী প্রদাহ ; হৃতিকাবস্থার উন্নততা ; পক্ষাঘাত ; বাত-রোগ ; হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ ; হৃৎহাবরক ঝিল্লী প্রদাহ ; পাকস্থলী প্রদাহ ; পাকস্থলীতে বেদনা ইত্যাদি অস্থখে বিরেট্রাম্ বিরাইড্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । মুখমণ্ডল, প্রাণ, হাত এবং পায়ের আঙ্গুলের আক্কেপিক স্পন্দন এবং বিকৃতি ; কোরিয়া (আগারিকান্, সিকুটা, ইগ্নেস্, নাস্-বম্) ; দুর্বলকারক উদবাসনের দরুণ রক্তাঘাত জনিত আক্কেপ ; ভব খাইলে বেক্রপ হয়, রোগীর (শিশু) শরীর সেরুপ কাঁপে, বাহার দরুণ মনে হয় যেন তাহার আক্কেপ হইবে ; পক্ষাঘাত ; অথ প্রত্যহে টন্-টনানি ; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের খাত্ত ; মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ, বৃক, মেরুদণ্ড এবং পাকস্থলীতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; শোথ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ; বস্ম অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে, চলিয়া বেড়াইলে, সন্ধ্যার সময় এবং নড়া-চড়াতে অস্থখের বৃদ্ধি ইত্যাদি বিরেট্রাম্ বিরাইডের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । বিরেট্রাম্ বিরাইডের কার্য্যের সঙ্গে

একোনাইট, আন্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্, বেলাডোনা, ডিজিটালিস, জেলসিনিয়াম্, হেলিথোরাম্, টেবেকাম্ এবং বিরেটাম্ আধামের কার্যের সাধুত্ব আছে।

ডাইলুশন বিচার। ১ম দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক ইহার ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিসর্প, বসন্ত এবং সামান্ত প্রকারের রক্তাধিক্য এবং প্রবাহে ইহার অমিশ্র মূল আরোক, বা মূল আরোক মলে বিশাইয়া লোশন (Lotion) প্রস্তুত করিয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইলে প্রদাহাদির অনেক হ্রাস হয় এবং ইহা দ্বারা প্রদাহাদি একেবারে সারিয়াও যাইতে পারে।

জিঙ্কাম্ মেটেলিকাম্,—জিঙ্ক-মেট্

(ZINCUM METALLICUM,—ZINC. MET.)

কোন এক বিষমত হোমিওপ্যাথিক ঔষধানয় হইতে আদ্যত জিঙ্কের পরি-
কৃত শুঁড়া ক্রয় করিয়া উহাতে বধা নিয়মে সুগার অব-মিক্ বিশাইয়া ৩য়
শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত ইহার শুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক
ক্রমের শুঁড়া হইতে বধা নিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কলেক্কা মৰ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ু-
মণ্ডলের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহ্যিক নরুণ মস্তিষ্ক, মেডুলা অব-
লংগেটা (Medulla Oblongata) এবং কলেক্কা মৰ্জা উত্তেজিত হইয়া
মস্তিষ্কের অবসন্নতা এবং স্নায়ুর উৎপত্তি স্থানের দুৰ্বলতা উৎপাদন করে।
মস্তিষ্কের দুৰ্বলতার পক্ষেই হোমিওপ্যাথিক যতে জিঙ্কাম্ বিশেষ উপকারী।
গ্রীলোকের হৃৎকোষ (Chlorosis) রোগে যেমন হয়, এই ঔষধেও রক্তের
সেচন অবস্থা উৎপাদন করে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। স্মরণ শক্তির দুৰ্বলতা, (আনাকার্ভ, ক্রিমাল্, ল্যাক্, মাজ্-হফ্,
মার্ক্); মনের বেলা বাহা করা যায়, উহার সন্মুখই কুলিয়া বাতরা; সর্বাঙ্গ

বক্ বক্ করা, হতাশের ভাব, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়; সহজেই রাগান্বিত হওয়া; বিরক্ত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ; মানসিক চিন্তা কষ্ট সাধা (জেল্-স্, নার্ভ্-বন্, কন্-সন্, থুন্); বিবেচনা শক্তির বিনাশ এবং অন্ধচেতনার জ্ঞান নিস্তার ভাব (ওপিয়াম্, নার্ভ্-মক্); কার্য্য কর্ণ করিতে অনিচ্ছা ।

মস্তক । মাথা ঘোরা এবং তদ্রূপ চলিবার সময় বাম দিকে টলিয়া পড়া; বায়বীয় মাথাঘোরা, বাহার আক্রমণের পূর্বে নাসিকার গোড়ার প্রথম অঙ্গারের চাপাবোধ এবং একগাছি হতা হারা কসিয়া বাধিলে বেক্রম হয়, দুই চক্ষু সেক্রম কসিয়া বাধার জ্ঞান অনুভূত হইয়া উহার পরক্ষণই অত্যন্ত বমনোবেগ, মুচ্ছার্ত্তাব এবং হস্তের কম্পন; নাকের গোড়ার চাপাবোধ, বাহার দ্রুত মনে হয় যেন নাক চাপিয়া মাথার মধ্যে আনিবে (ক্যালী-বাই); সন্ধ্যার সময় কপালের কোন এক নির্দিষ্ট ক্ষুদ্রাংশে চাপাবোধ; একপেশে (আধ্ কপালিয়া) মাথা ধরা (Hemicrania), মধ্যাহ্নে আহ্বারের পর বাহার বৃদ্ধি হয়; মাথার ছিঁড়িয়া ফেলা বা হুল ফুটানের জ্ঞান বেদনা; সামান্য পরিমাণে মদ্য পান করিলেই মাথা ধরা (থ্যাক্স-বন্, রডো-ডেগ্লেন্); মাথার ভালুতে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্ঞান চাপাবুক বেদনা; ছাল উঠিয়া ক্ষত হইলে বেক্রম হয়, স্পর্শ করিলেই মাথার উপরি-ভাগে সেক্রম টাটানি বা চড়্-চড়ানি, সন্ধ্যার সময় বাহার বৃদ্ধি হয়; মাথার ভালুর চুল পড়িয়া ঘাইয়া তালু খালি হয় (ব্যারাইটা-কার্ক্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার হাড়ে টাটানি ।

চক্ষু । চক্ষুর যোজক ঝিল্লীর প্রদাহ (Conjunctivitis) এবং উহা লালবর্ণ বাহা নাকের নিকটবর্ত্তী কোণেই অধিক হয়; বালির কণা প্রবেশ করিলে বেক্রম হয়, চক্ষে সেক্রম ঘাতনা বাহা সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রে বৃদ্ধি হয় এবং উহার সঙ্গে চক্ষু দিয়া জল পড়া (আস্, কষ্ট্, পাল্-স্); প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় চক্ষু ও চক্ষুর পাতায় জ্বালাহুতব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে শুক ও চাপাবোধ (আলাধ্, আস্, সাল্-ফ্); শৈশবাবস্থার চক্ষু প্রদাহের পর চক্ষুর পাতায় দানার জ্ঞান কুক্ষুড়ী (Granular lids); চক্ষে, প্রধানতঃ ডাইন চক্ষে, চুলকানি, কামড়ানী এবং শুষ্ক্-হুড়ী; চক্ষুর নাকের নিকটবর্ত্তী কোণে চুলকানি, হুটীবিধানের জ্ঞান বেদনা এবং শুষ্ক্-হুড়ী ও

উহার সঙ্গে সঙ্গে ঢকে তাগ্না দেখা; চক্ষুর উপরের পাতার গন্ধাব্যভেদ। তার জারিবোধ (কষ্ট, জেল্‌স্) ; রাত্রিতে চক্ষুর পাতার পাতার লাগিয়া থাকা (কষ্ট, প্রাক্, লাইকোপ্, মার্ক্, রান্টন্, পাল্‌স্, সাল্‌ক্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঢকে চাপাবোধ এবং টাটানি ; চক্ষুর নাকের নিকটবর্তী কোণের মধ্য-দেশে পক্ষীর তার কুহুড়ী বা কীতি (Pterygium) ; ঢকে আলোক সহ না হওয়া (Photophobia) (একন্, বেল্, মার্ক্, সাইলিসি, সাল্‌ক্) ।

কর্ণ । ডাইন কর্ণের মধ্যে পটহের (Tympanum) নিকটবর্তী স্থানে খুঁচী বিধানের তার অভ্যন্তরীণ বাতনা ; কর্ণপুল, বিশেষতঃ নিম্ন বা ছোট বালক বালিকাগণের (পাল্‌স্) ।

নাসিকা । নাকের মধ্যে আলা এবং টাটানি ; নাক বন্ধ হইয়া থাকে (নাক্-বন্, সাইলিসি) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল পর্য্যায়ক্রমে লাল এবং শিটা (একন্) ; মুখমণ্ডলের হাড়ে ছিঁড়িয়া কেবার তার বেদনা বা টাটানি ; ওষ্ঠ শুষ্ক এবং কাটাযুক্ত (আস্, ব্রাই) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । গাঁতের গোড়ার কসিয়া ধরা, ছিঁড়িয়া কেবার তার, কপালিয়া বেদনা ; সামান্য স্পর্শ করিলে বা চাপিলেই মাড়ি দিয়া রক্ত পড়ে (কার্কো-বেজ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, কস্) ; মুখে প্রচুর গালের স্কার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গালের মধ্যে হাঙ্গা দেওয়ার তার কুহুড়ী । গলার মধ্যে শুকাইয়া এবং গলার মধ্যের পশ্চাৎ দেশে দেওয়ার স্কার ; গলার মধ্যে ক্ষত, বেদনা এবং টাটানি ; গলার মধ্যে ছিঁড়িয়া ফেলা এবং কসিয়া ধরার তার বেদনা, বাহ্য গলার মধ্যের পশ্চাৎদিকেই অধিক অগ্রতৃত হই এবং বাহ্য কোন দ্রব্য গিলিবার সময় অধিক অগ্রতৃত হই, কিন্তু চোক গিলিতে বিশেষ অগ্রতৃত হয় না ।

পাকস্থলী এবং উদর । মুখে গোলতা বাদ (নেট্রোমিউর, মার্ক্) ; হঠাৎ বাহ্য কোন বস্তুই নিবারণ করা যায় না (ব্রাই, কেরান্, আরোড্, লাইকোপ্) ; ক্ষুধা মূর্ততা (আলাস্, আস্) ; পিপাসা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাতের তালুতে আলাপ্তব ; টক বা কাঠ উদ্‌গার (কার্কো-বেজ্, কস্, নাক্-বন্) ; মিষ্টদ্রব্য বাইলে বৃদ্ধ আলা ; বমনোদ্বেগ এবং বমন

(আন্টি-টার্ট, ইপিকাক্, লোমিলিয়া); কাঠখমী হইতে হইতে গলা দিয়া রক্ত মিশ্রিত স্বেদ্য নির্গমন; পাকস্থলী হইতে গলার মধ্য পর্য্যন্ত বেল ক্রমি বেড়াইতেছে একুপ অমৃত্ত-হর, বাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয়; পাকস্থলী এবং উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশে জ্বালাপুত্তব (আস্, ক্যাহ্, আইরিগ্)।
 • আহায়েৰ পর উদরের দুই পাৰ্শ্বে বিল ধরার জ্বাৰ বেদনা এবং খাস কষ্ট; উদরের ডাইন পাৰ্শ্বে বাটিরা ধরা (আস্, ব্রাই, চায়না, মাক্, সাল্ফ্); উদর পূৰ্ণ, ক্ষীত এবং বিজৃত; আহায়েৰ পর উদরে চাপাবোধ এবং কসিয়া ধরা (কার্কো-বেজ্, চায়না, নাল্-বম্); অস্ত্রে অধিক পরিমাণে দ্রুতিত বায়ুর সকার হেতু শূলবেদনা, সন্ধ্যার সময়ই বাহার অধিক উদ্রেক হয়; উদরের মধ্যে গড়্-গড়্, কল্-কল্ শব্দ হওয়া বা পেট জলিরে উঠা (আলোজ্, লাইকোপ্, সাল্ফ্); শুষ্কতার দিয়া বারবার উচ্চ শ্বস-বৃত্ত দ্রুতিত বারু নিঃসরণ (আলোজ্, ব্রাই); উদরে দুই দিয়া হানার জ্বাৰ প্রবল বেদনা।

মল এবং মলছার। শুষ্কতারে জালা এবং চুলকানি (সাল্ফ্); ক্রমি থাকিলে বেক্রপ হয়, শুষ্কতারে সেক্রপ হামা দেওয়ার জ্বাৰ হৃৎ-হৃদী (সিলিয়া, স্পাইজেল্); অনিবার্য কোষ্ঠবদ্ধ; মল সব কঠিন শুষ্ক জালা, নেত্র (আমন্-মিউর, নেট্রাম্-মিউর) বাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় বা সজোরে বেগ না বিলে নির্গত হয় না; কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না (সাল্ফ্)।

মূত্রযন্ত্র। বাম মূত্রকোষ প্রদেশে চাপা বোধ; মূত্রাধারে প্রবল চাপ পড়া; প্রাতঃকালেই মূত্র বোলাটিয়া, চিকণ মাটির রসের জ্বাৰ; পশ্চাৎদিকে হেনিয়া বসিলেই কেবল মূত্রত্যাগ করিতে পারা যায়; চলিবার সময়, কাশিবার সময় এবং হাঁচি দেওয়ার সময় অসাড়ো মূত্র নির্গমন (কষ্ট্, নেট্রাম্-মিউর, সাল্ফ্)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের পুরুষাঙ্গ অনেকক্ষণ ধরিয়া খাড়া হইয়া থাকে; অণ্ডকোষে কসিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা বা বাতনা বাহা শুকনিসারক মূত্র (Spermatic Cord) পর্য্যন্ত বিজৃত হয়; খেঁড়-গিয়া বাইরা বা ঘোড়াইরা পড়িয়া একশিরার ব্যারাগ (Orchitis); একটা অণ্ডকোষ উপ-রেণ দিকে আকৃষ্ট; সহজেই স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছার উদ্রেক হয়; স্ত্রীসহবাসের

সময় সামান্য আলিঙ্গনেই ধাতু নিঃসরণ, অথবা ধাতু অনেক কষ্টে নির্গত হয় বা ধাতু একেবারেই নির্গত হয় না ; কোন কারণ ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে ধাতুনিঃসরণ ; শুক্রকরণ (Spermatorrhoea) ; যুগ্ম না দেখিয়াও অগাড়ে ধাতু নিঃসরণ, মুখমণ্ডল শিটা, যেন বলিয়া যায় এবং চক্ষু নীলের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। রাত্রিতে জীলোকের পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত বা অনিবার্য ইচ্ছা, বাধ্য গৃহ করিতে না পারিয়া বোগী হস্তমৈথুন করিবার প্রয়াস পায় ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে রজঃস্রাব অথবা একবারে রজঃস্রোধ ; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation) ; রজঃস্রাবের সময় বড় বড় রক্তের চাপ নির্গমন ; ষ্ঠেত প্রদর এবং তদ্রূপ বোনিঘার দিয়া স্রোতার ভ্রায় গাঢ় পদার্থ নির্গমন ; বোনিঘার দিয়া রক্ত মিশ্রিত স্রোতার ভ্রায় পদার্থ নির্গমন (আলাম) ; রজঃস্রাবের পর ক্ষতকারক ষ্ঠেত প্রদর নিঃসরণ (পাল্‌স) ; বোনির চুলকানির রূপ হস্তমৈথুনের ইচ্ছা হয় ; বাম ডিম্বকোষে ছিদ্র করার ভ্রায় বেদনা, চাপিলে বাহার উপদ্রব হয় এবং বাহা কেবল রজঃস্রাবের সময়ই একবারে থাকে না ।

বাস যন্ত্র । বৃক্‌ আলা এবং টাটানির ভ্রায় বেদনা ; বৃক্কের ডাইন পার্শ্বে স্ত্রীবিধানের ভ্রায় যুশ্‌ যুশ্‌ বেদনা ; বৃক্‌ আটা এবং কষ্ট বোধ ; শুক আক্‌পিক কাশি (হারোস্‌, সিমিয়া, সাইলিস, সাল্‌ক্‌) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া রক্ত মিশ্রিত স্রোতা উঠা ; কাশির সময় রোগী (শিশু) পুরুষাক বা বোনিতে হাত রাখে ; রজঃস্রাবের সময় এবং উহার পূর্বে কাশি, মিষ্ট দ্রব্য খাইলে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

জংপিণ্ড । জংপ্রদেশে কসিয়া ধরা বা স্ত্রীবিধানের ভ্রায় বেদনা বা ব্যতনা ; জংস্পন্দন, কিন্তু তদ্রূপ বিশেষ কষ্ট অনুভূত হয় না ।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশের পেশীতে বেদনা তদ্রূপ ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ সকালনে অগতি ; বলিয়া লিখিলে বা অন্ত কোন প্রকারের পরিশ্রমে ঘাড়ের শ্রান্তিবোধ ; চলিবার সময় কোমরের পশ্চাৎদেশে পেন্টলিয়া ব্যাঘরা বা মোচড়াইয়া পড়ার ভ্রায় বেদনা ; ডাইন কক্ষস্থির নীচে চাপিয়া বা কসিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা ; বলিয়া থাকিলে বা চলিয়া বেড়াইলে পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে বাটিয়া ধরার ভ্রায় অথবা বেদনা ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । সন্ধি শক্ত হয় বা উহা নোহান যায় না এবং সন্ধি-
টিক উপরিতাগে আড়া আড়ি ছুরী বিধানের জ্বার প্রবল বেদনা ; অঙ্গ
প্রত্যঙ্গে হুর্ল ও শ্রান্তিবোধ এবং মোচড়াইয়া পড়িলে বা বেঁটজিয়া
গেলে যেমন হয়, সেমণ অঙ্গভূত হয় ; হাত পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ; সমুদয়
অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বার বেদনা (ব্রাই, কলোস্,
পাল্‌স্, সাল্‌ফ্) ; সমুদয় সন্ধিতে অত্যন্ত চুলকানি । লিখিবার সময় হাতে
হুর্ল বোধ এবং উহার কাঁপনি (নেট্রাম্-মিউর) ; স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের
সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে উক্ত প্রকারের বেদনা ; হাতের আঙ্গুলের প্রথম সন্ধিতে
ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বার বেদনা । পায়ের শিরার ক্ষতি এবং বিস্তৃতি
(হোমামেলিস্, পাল্‌স্) ; পায়ের শোধ (এপিস্, আর্স্, রাস্-টক্) ; উরু
এবং হাঁটুর পশ্চাৎভাগে চুলকানি ; নিম্নাঙ্গে ভারিবোধ ; পায়ের টিবিয়া
(Tibia) নামক হাড়ের আঘাত বেদনা ; পায়ের গোড়াড়ীর বিসর্পের জ্বার
প্রবাহ ; পায়ের অস্থির রক্তের স্রাবিক সঞ্চালন (নেট্রাম্-মিউর) ; পায়ের
পাতার পক্ষাঘাত এবং উহার হুর্লতা ও কন্‌পন ; পায়ের গোড়াড়ীতে ক্ষত
হওয়া বা ছিদ্রকার জ্বার বেদনা (পাল্‌স্) ; পায়ের আঙ্গুলের কঁকে কঁকে
ছাল উঠিয়া বাওয়ার জ্বার ক্ষত (আগারিকাশ্, নাইট্রিক্-আস্, পাল্‌স্) ;
পায়ের পাতার প্রচুর বর্ধ (নাইট্রিক্-আস্, সিলিয়া, সাইলিসি, সাল্‌ফ্) ।

নিদ্রা । নিদ্রা দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি স্তম্ভ বনে করে না ;
ভরানক স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; ঘুমেরবোরে চমকিয়া বা চীৎকার
করিয়া কাদিয়া উঠা ; ঘুমেরবোরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হঠাৎ ধাক্কা লাগার জ্বার
ঝাকনি ।

জ্বর । পৃথমেপের উপরিভাগ হইতে শীত কম্প নিম্নদিকে বিস্তৃত
হয়, কাছিতে বর্ধ ।

ব্যবহার । রক্তাক্রান্ত জনিত অস্থি ; রক্তিকের অবসরজন ;
ফোটক বিশিষ্ট রোগের ফোটক সম্পূর্ণ বিকাশ না পাইতে পারিলে ;
শোধ ; পক্ষাঘাত ; আক্কেপ বা কনবাল্‌সন্স্ ; বাত রোগ ; পায়ের আঙ্গু-
লের কঁকে কঁকে ছাল উঠিয়া বাওয়ার জ্বার বা ; স্ত্রীলোকের পুরুষ
সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা বা কামোদ্ভূততা ; শ্বেতপ্রদর ; রজঃরোধ ; কষ্টকর

রক্তশ্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation); শুক্রকরণ (Spermatorrhoea); একশিরার ব্যসারাম (Orchitis); কোষ্ঠবদ্ধ; কৃমি; মেরুবগ্গের উত্তেজনা; মস্তিষ্কের অস্থখ ইত্যাদিতে জিকান্ ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। শরীরের নানা স্থানের গেম্বর স্পন্দন এবং ঝাকনি (আগারিকান্, সিকুটা); বেদনাদি যেন চর্ম এবং নাসের মধ্যবর্তী স্থানে অনুভূত হয়; রাজিতে ঘূষের অবস্থার সমুদয় শরীরে হঠাৎ ঝাকি লাগার ভায় অনুভূত হয়; রক্তাক্ততা; মস্তিষ্কের অবসন্নতা; মধ্যাহ্নে আহারের পর এবং সন্ধ্যার কিছুকাল পূর্বে, মল্যপানে, নাস-বমিকা থাকিলে, কিশোর কালীন, বসিয়া থাকিলে, উচ্চতাতে এবং রক্তশ্রাবের সময় অস্থখের বৃদ্ধি এবং ক্যান্কার থাকিলে, বহির্কাররূতে এবং খাওয়ার সময় অস্থখের উপশম ইত্যাদি জিকামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ যথোপযুক্ত পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। জিকামের কার্যের সঙ্গে কুপ্রান্ এবং প্রাকামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে কার্কো-বেলিটেবিলিস্, ইগ্নেসিয়া এবং নাস-বমিকার কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যান্কার, হিপার সাল্‌ক্, ইগ্নেসিয়া।

ডাইলুশন বিচার। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, ইহার নিম্ন (১ম, ২য়, ৩য়) ক্রমের গুঁড়াই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পিত্ত গণের পীড়ায় ৩০ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী ইহা পরীক্ষা করা দেখা গিয়াছে। ৩য় ক্রমের গুঁড়া, ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই লেখক অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

তৃতীয় ভাগ ।

তৃতীয় শ্রেণীর ঔষধ

অর্থাৎ

যে সকল ঔষধ ১ম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔষধ অপেক্ষা

কম ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

অসিডাম্ ফ্লুরোরিকাম্, - ফ্লুরোরিক্ অসিড্, - ফ্লুর-অ্যাস্

(ACIDUM FLUORICUM, - FLUORIC ACID, - FLUOR-AC.)

কোন এক বিষত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত ফ্লুরোরিক্ অসিড্ ক্রয় করিয়া উহা হইতে ১ ভাগ লইয়া ৯ ভাগ চুরান জলে মিশাইলে ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয়। এই নিয়মে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশমিক ক্রম পর্যন্ত চুরান জলে প্রস্তুত করিয়া ১ম, ২য় এবং ৩য় ক্রম পর্যন্ত গুটাপার্চা (Guttapercha) নির্মিত শিশিতে রাখিবে। ঐখ ডাইলুশন ডাইলুট্ স্পিরিটে এবং ডংপর রেক্টাইফাইড্ স্পিরিটে ডাইলুশন প্রস্তুত করিতে হয়।

সাধারণ ক্রিয়া । সমুদয় শরীরের উপরই ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাহ্যিক লক্ষণ স্নৈমিক রিম্বী, গ্রহি, অস্থি ইত্যাদি প্রবলরূপে আক্রান্ত হইয়া শরীরের বিকৃত পরিপোষণের দ্বার ব্যবহার লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অসাধারণ একান্ত মনোহীনতা, সকল বিষয়েই নির্ভর এবং স্বয়ং

বাহ্য করা যায় তাহাতেই মনের তৃপ্তি ; চিন্তা উৎপাদক ভাবের উদয় এবং সর্বদা ভয়ের আশঙ্কা ।

মস্তক । কপালের দুই পার্শ্বে চাপিয়া ধরার ভায়ে বেদনা বাহ্য মধ্য-বেশ হইতে বহির্দেশে বিস্তৃত হওয়ার ভায়ে অল্পভূত হয় ; মাথার পশ্চাৎ-ভাগে চিন্মা এবং চাপাবোধ ; মাথার চুল পড়িয়া যায় ; কর্ণের পশ্চাৎবেশের হাড় পোকার ধরা (Oaries) ; মাথার হাড়ের ঘোড়ে ঘোড়ে আগাগোড়া বেদনা ।

কর্ণ । উভয় কানেই অসহ্য চুল্কানি ।

চক্ষু । মনে হয় যেন কেহ সজোরে চক্ষুর পাতা খুলিয়া ফেলে, এবং তদ্রূপ মনে হয় যেন চক্ষের মধ্যে দিগ্ধ বাতাস বহিতেছে ; বালি প্রবেশ করিলে যেক্রণ হয়, চক্ষের মধ্যে সেক্রণ অল্পভূত হয় (নষ্ট, হিপ-সাল্ক, সাল্ক) ।

নাসিকা । তরল সর্দি এবং নাক দিয়া জলবৎ তরল প্রচুর স্রোতা নির্গমন, নাসিকা লাগবণ, ক্ষীত এবং প্রদাহযুক্ত ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁতে উচ্ছ্বাস ; মুখে অতি-রিক্ত পরিমাণে লাগের স্কার ; প্রাতঃকালে জিহ্বা এবং দাঁত স্রোতা বাহ্য আবৃত ; দাঁত লীহ লীহ পোকার ধরে (Caries) ; জিহ্বার চতুর্দিক গভীর ক্ষাতিযুক্ত এবং উহার মধ্যভাগে বৃহৎ আকারের পচাযুক্ত কড় । সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই গলার মধ্য প্রদাহযুক্ত হইয়া উহাতে বেদনার উদ্রেক হয় এবং তদ্রূপ কোন প্রব্য গিলিবার ব্যাধাত জন্মে ; গলার মধ্যের সঙ্কোচন এবং উহাতে আঁটাবোধ ; প্রাতঃকালে গলা খেকুর দিলেই গলা দিরা রক্তবিশ্রিত স্রোতা নির্গত হয় ।

মুখমণ্ডল । দ্রুতগোচ্য বালক বালিকার মুখমণ্ডলে শুষ্ক খোঁসা এবং চুলকানি বিশিষ্ট কুহুড়ী ; মুখমণ্ডল এবং কপালের চর্মে সপুষ্ট ত্রণের ভায়ে কুহুড়ী ; শৈশবাবস্থার পরমীর ব্যারাম (Infantile Syphilis) ।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা সর্বাণেকা প্রবল ; অত্যন্ত নিশাসা এবং ঠাণ্ডা প্রব্য পানের ইচ্ছা ; বারম্বার উল্গার উঠা ; বমনোদ্বেগ, উল্গার উঠা এবং জলগবোধ ; আঁটারের সামান্য অনিয়ম হইলেই বমন এবং

অধিক পরিমাণে মল ভেদ এবং দাঁতের পূর্বে পেটকামড়ানী ; উদরোৰ্দ্ধ প্রদেহে পূর্ণ এবং চাপাবোধ ; আহারের আভ্যন্তরিক কালে পাকস্থলীতে ভারিবোধ । বারম্বার শুষ্কবার দিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণ এবং উদগার উঠা, যাহার দরুণ রোগী অনেক উপশম অমুভব করে ; উদরের শোথের জ্বর ক্ষীতি এবং তদরুণ উদরে কসিয়া বা বাটরি ধরার জ্বর অমুভূত হওয়া ।

মল । কোঠবদ্ধ ; মল কঠিন ; বিলম্বে বিলম্বে মল ত্যাগ (ব্রাই) ।

মূত্রযন্ত্র । প্রচুর পরিমাণে ফিকা রক্তের পরিষ্কাররূপে মূত্রত্যাগ, যাহার দরুণ রোগী উপশম অমুভব করে ; মূত্র ত্যাগের সময় এবং উহার পর মূত্রনালীতে অসহ্য জ্বালামুভব (ক্যাছ) ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের জীসহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা এবং স্নাত্তিতে পুরুষাঙ্গ অত্যন্ত খাড়া হয় ; জীসহবাসের সময় অত্যন্ত স্রববোধ এবং অনেকরূপ ধরিয়া জীসহবাসের ইচ্ছা ; জীসহবাসের সময় ধাতু অনেক গোণে নির্গত হয় বটে, কিন্তু স্রববোধ হইলে পরিষ্কাররূপে ধাতু নির্গত হয় এবং ধাতু নিঃসরণের পর কোন প্রকারের অসুখ অমুভূত হয় না । জীলো-কের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে রক্তঃশ্রাব ; প্রচুর বা অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তঃশ্রাব ; রক্ত গাঢ় এবং চাপ চাপ, থানা থানা ; ক্ষতকারক বেষ্টপ্রদর নিঃসরণ এবং তদরুণ ঘোনিষারের চুলকানি ; শুনের বোটা ক্ষত ও কাটা-যুক্ত এবং উহাতে চুলকানি ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । ডাইন্‌ স্ক্লেফের সন্ধিতে বেদনা যাহা হাতের আঙ্গুলের দিকে বিস্তৃত হয় এবং তদরুণ মনে হয় যেন বাহ্যর মধ্য দিয়া বাতাস বহিয়া যাইতেছে ; বাম হাতের তর্জনীতে বেদনা ; উক্ত অঙ্গুলীর মধ্যদেশে আগাগোড়া বেদনা ; নখ মট্‌কা হয় বা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় ; আঙ্গুলহাড় (Whitlow) ; নখকোণী (Onychia) । পা হইতে উদর পর্যন্ত স্থানের শোথের জ্বর ক্ষীতি ; পায়ের পাতার তলায় জ্বালা এবং উহাতে হঠাৎ বিধানের জ্বর অমুভূত হওয়া ; পায়ের পাতা উষ্ণ এবং জ্বালামুক্ত ; পায়ের আঙ্গুলের কঁাকে কঁাকে ক্ষত ; পায়ের শিরার ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি ।

নিদ্রা । সন্ধ্যার সময় নিদ্রাবেশ বা স্মিধান ; নিদ্রানুভূতা এবং

নিদ্রার ইচ্ছা শূন্যতা ; অল্প কালের জন্য নিদ্রা হইলেও রোগী আপনাকে আপনি স্মৃৎ মনে করে ; শেষ রাত্রিতে ভোর হওয়া হওয়া সময়ে স্বপ্ন দেখা ।

জ্বর । সমুদয় শরীর উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষণ ; প্রচুর পরিমাণে টক এবং হর্গন্ধবৃদ্ধ ঘর্ম্ম ; অপরাহ্নে প্রচুর ঘর্ম্ম ।

ব্যবহার । শরীরের যে প্রকার পরিপোষণের অভাবে সাইলিসিয়া, ক্যাকেরিয়া ইত্যাদি ব্যবহার্য্য, সেপ্রকার অসুখে ক্লোরিক্ আসিড্ ও ব্যবহার্য্য । অস্থি, বিশেষতঃ লম্বা অস্থি অস্থ্য ; নালী বা (Fistula) ; আঙ্গুল হাড় (Whitlow) ; নখকোণী (Onychia) ; অজীর্ণ রোগ ; বহুমূত্র (Diabetis) ; শিরার ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি ; পারা (Mercury) এবং সাইলিসিয়ার (Silicea) অপব্যবহার জনিত অস্থ্য, হুইস্কি (Whisky) নামক মদ্যপানে অত্যাচার জনিত যকৃতের প্রদাহ এবং কঠিনতা ইত্যাদি অসুখে ক্লোরিক্ আসিড্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । ক্লান্ত না হইয়া পেশী সঞ্চালনের কমতা ; অলসবোধ বা গা মাটিমাটি করা ; শক্তির হ্রাস বা বিনাশ ; কোন ক্ষত শুকাইয়া যাইয়া উহার দাগের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান লালবর্ণ হয় এবং অত্যন্ত চুলকায় । বৃদ্ধ বয়সের অস্থ্য ; গবমীর ব্যারাম বা পারাজনিত অস্থ্যের দক্ষণ অকালে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া । প্রাতঃকালে, বিশ্রামে, বসি অবস্থা হইতে উঠিলে, দাঁড়াইলে, বসিয়া থাকিলে অস্থ্যের বৃদ্ধি এবং নড়াচড়া এবং চলিবার সময় অস্থ্যের উপশম ইত্যাদি এই ঔষধের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মध्ये পরিগণিত ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । সাইলিসিয়া, আসিনিক, ক্যাকেরিয়া-কার্প, ক্যাকেরিয়া কফরেটা, ফস্ফাস্, মার্কিউরিয়াস্, সাল্ফার ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সঙ্গে ক্লোরিক্ আসিডের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । এম এবং ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক নামের কবিতা পুরাতন উদরাময়, গরমীর ব্যারাম জনিত জিহ্বা এবং গলায় বদনের ক্ষত ও অস্থি পোকায় ধরা (Caries) ইত্যাদি পরবর্তী পীড়াতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । আঙ্গুল হাড়, নখকোণী, নেত্র এবং দন্তনালী,

নিরার ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি, যাতার চুল পড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি অনুরূপে ৬
হইতে ৩০ ডাইলুশন দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায় ।

আসিডাম্ অক্সালিকাম্-অক্সালিক্ আসিড্,-অক্স-আস্

(ACIDUM OXALICUM,-OXALIC ACID,-AC. OX.)

কোন এক বিষমত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালব হইতে আদত চাক্স অক্স-
জালিক্ আসিড্ ক্রয় করিয়া উহার এক ভাগ, ৯ ভাগ বেক্টিফাইড্ স্পিরিটে
(১ গ্রেইণ্ অক্সালিক্ আসিড্, ৯ ফোঁটা (মিনিম্) বেক্টিফাইড্ স্পিরিটে)
মিশাইয়া ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয়। ১ম দশমিক ক্রমের
১ ফোঁটা, ৯ ফোঁটা বেক্টিফাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া যথানিয়মে ২য় দশমিক
ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এরূপ ৩য় এবং ততোধিক দশমিক
ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্বির যথানিয়মে স্বগার অব্ মিকের
সঙ্গে মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার উপর ইহার
কার্য অতি প্রবল। মস্তিষ্কের উপর ইহার কার্য আরো প্রবল, যাহার
দরুণ মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার মেরু (Cerebro-spinal axis) কার্য
করিবার ক্ষমতা বিনাশ করিয়া ইহা জীবন হঠাৎ বিনাশ করিয়া থাকে।
ইহা প্রবল আক্কেপিক অনুরূপ উৎপাদন করে, যাহার দরুণ বুকের পেশীতে
আক্কেপ অধিক অনুভূত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায়
না, আক্রান্ত স্থানে স্পর্শগত থাকে না, স্নায়ুশূল এবং পক্ষাঘাতের লক্ষণাদি
প্রকাশ পায়। ইহা শ্বাসযন্ত্রের প্লেগ্মিক ঝিল্লী আক্রমণ করিয়া উহার
প্রদাহ উৎপাদন করে এবং অধিক মাত্রায় ইহা দ্বারা বিযাক্ত হইলে আহাৰ-
বহা নালীর প্লেগ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া প্রদাহবৃত্ত হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । চিন্তা করিয়া কোন বিষয়ে ভাব জুটাইবারে অশক্তি ; মনের
অত্যন্ত চঞ্চল্য ; শীঘ্র শীঘ্র চিন্তা এবং কার্য করা (কফিয়া) ; বেদনাদির

বিষয় চিন্তা করিলেই যেন বেদনাদির (জীলোকের) পুনরাব্রূষণ হয় (ব্যারাইটা-কার্ক) ।

মস্তক । মাথাঘোরা; শয়ন করিয়া থাকিলে মাথা কিম্ব কিম্ব করে; মাথার খালি খালি বোধ; মস্তিষ্ক একবারে রক্তশূন্য হইলে ঘেরূপ হয়, সেরূপ মুচ্ছার ভাব; কপাল এবং মাথার উপরিভাগে যুগ্মবেদনা এবং ভারিবোধ; কানের পশ্চাৎভাগে ক্রম বিধাইয়া রাখিলে ঘেরূপ হয়, মাথার সেরূপ কসিয়া বা চাপিয়া ধরার দ্বারা বেদনা ।

চক্ষু । পুস্তকাদি পড়িবার সময় অক্ষরগুলি যেন জ্বলিয়া যায়; চক্ষে অন্ধকার দেখা, উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা এবং ঘর্ষ; উভয় চক্ষুর কোটরের মধ্যে বেদনা, বাম চক্ষুর কোটরেই যাহা অধিক অনুভূত হয় ।

নাসিকা । হাঁচি; সর্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে স্লেমা নির্গমন; নাকের ডাইন পার্শ্ব লালবর্ণ, উজ্জ্বল এবং ক্ষীত যাহা নাকের আগা হইতে আরম্ভ হয় (বেল) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা এবং নীল বর্ণ; মুখমণ্ডলে উষ্ণতা; মুখমণ্ডলে পূর্ণবোধ; মুখমণ্ডল ঘর্ষাত (টেবেকাম, বিরেট্‌আন্) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মাড়ি হইতে রক্ত পড়া এবং মাড়ির স্থানে স্থানে বেদনা; মাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত; জিহ্বা ক্ষীত, বেদনামুক্ত, লালবর্ণ, শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত; জিহ্বা ক্ষীত এবং গাঢ়, সাদা লেপযুক্ত; মুখে টক স্বাদ (ক্যাক্স-কার্ক, ব্যাগ-কার্ক, নাক্স-বম্); মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠা (আয়োড, মার্ক, নাইট্রিক-সল্ট); গলার মধ্য এবং পাকস্থলীতে জ্বালা; গলার মধ্যে ছাল উঠা বা চাচিয়া কেলার দ্বারা অনুভূত হয়; গলার মধ্যে গাঢ় স্লেমার সঞ্চার; গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট বা বেদনানুভব ।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধার বৃদ্ধি; ক্ষুধা এবং স্বাদ একবারে থাকে না; পিপাসা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা, ক্ষুধাশূন্যতা, বমনোদ্যোগ এবং শূল বেদনা; বুকজ্বালা, সন্ধ্যার সময় বাহার বৃদ্ধি হয়; কাঠি উল্গার বা টক উল্গার উঠা; প্রত্যেকবার আহারের পর উদগারে স্বাদশূন্য বায়ু নিঃসরণ; বায়ুবার দ্বিধা (ইথেন্স, হায়োস্); বমনোদ্যোগ এবং বায়ু-

হার বমন ; পেটে খালিবোধ, বাহার দ্রবণ রোগী বারবার শাইতে বাধ্য হয় ; পাকস্থলীর মধ্যে চাপিয়া ধরার জ্বাৰ প্রবল বেদনা ; পাকস্থলীর মধ্যে জ্বালাহুতব (আর্স, কল্‌চ, মার্ক-কর) ; পাকস্থলীতে অত্যন্ত টাটানি, বাহার দ্রবণ সামান্য স্পর্শনেই পাকস্থলীতে ভয়ানক বেদনার উদ্রেক হয় ; বহুত প্রদেশে হুচী বিধানের জ্বাৰ বেদনা, দীর্ঘ নিখাসে বাহার উপশম হয় , উদরের বাম পার্শ্বে ক্রমাগত বেদনা এবং হুচী বিধানের জ্বাৰ বাতনা ; নাভিপ্ৰদেশে শূল বেদনার জ্বাৰ বেদনা (কলোস) ; অতি কষ্টে গুহদ্বার দিয়া দূষিত বায়ু নির্গত হওয়া ; উদরে আলা এবং বেদনা ।

মল । অনবরত অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মল নির্গমন ; মল কাল্‌চে, কাদার জ্বাৰ এবং পরিমাণে অধিক ; রক্তমিশ্রিত স্লেয়া ভেদ ; কাকি পান করিলেই উদরাময় ; শয়ন করিলেই উদরাময় পুনরায় আরম্ভ হয় ; গুহে চাপিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা এবং শূলানি ; কৌণপাড়া ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রকোষ প্রদেশে বেদনা ; বারবার প্রচুর পরিমাণে পরিকার শুকনা ঘানের রক্তবিশিষ্ট মূত্র ত্যাগ ; মূত্রের সঙ্গে অক্সালেট্‌স্‌ থাকে (Oxaluria) ; মূত্রনালীতে ক্ষত হওয়ার জ্বাৰ আলা ; মূত্র ত্যাগের সময় পুরুষদের মাথায় বেদনাহুতব ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের জীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা ; অণুকোষে জ্বাৰি বোধ এবং উহাতে ঘোটড়াইয়া পড়া বা থেঁতলিয়া যাওয়ার জ্বাৰ বেদনা ; শুক্রনিঃসারক নৃত্রে (Spermatic Cord) আগাগোড়া খোঁচা বিধার জ্বাৰ বেদনা (ক্লিমেটিস্‌, স্পঞ্জ) ।

শ্বাসযন্ত্র । কথা বলিবার সময় হবভঙ্গ এবং কণ্ঠনালীতে বেন স্লেয়া সঞ্চিত রহিয়াছে এরূপ অহুত্ব হয় ; প্রবল পরিশ্রমে অনবরত শুক কাশি ; শ্বাস কষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীতে সঙ্কোচক বেদনা এবং উহাতে সাঁই সাঁই শব্দ হওয়া ; ডাইন দিকে যন্ত্রণাদি অধিক অহুত্ব হয় ; হৃৎস্নায়ুশূল ; মধ্যে মধ্যে উপশম বোধ ; বাম হৃৎকুসে এবং হৃৎপিণ্ডে হুচী-বিধানের জ্বাৰ প্রবল বেদনা যাহা উদরোর্দ্ধ প্রদেশ পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় ; হৃৎস্নায়ুশূল (Angina Pectoris) ; বুকে জ্বাৰিবোধ এবং জ্বালাহুত্ব যুল্‌যুলে বেদনা ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে খোঁচা বিধার দ্বায় বেদনা ; হৃৎস্পন্দন, যাহার দরুণ মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড অনবরত ধড়্‌ধড়্‌ করিতেছে ; নাড়ী ক্রতগামী, স্থল ও নুপ্ত প্রায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরে নীতল ও চট্‌চটীয়া ঘর্ষ (টেবেকাম, বিরেট্‌-আব্‌) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । হই স্বকের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা যাহা কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; বুক হইতে সন্ধাস্থি পর্যন্ত স্ত্রী বিধানের দ্বায় অনুভূত হয় ; পৃষ্ঠদেশে প্রথম বেদনা যাহা ক্রমে ক্রমে উরুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তদরূপ অত্যন্ত কষ্টানুভব বা ব্যতনা, যাহার দরুণ উপশম পাওয়ার আশায় রোগী রানস্বার পাশ পলিবর্তন কবে বা নানা ভাবে থাকে ও কৌপায় বা কৌকার ; কঁচুকের দুর্বলতা বা তাঁ পা ইত্যাদি নিম্ন শাখা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; পৃষ্ঠদেশে এত দুর্বল হইবা পড়ে যে উহার দরুণ রোগী মোজা হইয়া দাঁড়াইতে বা বসিতে পারে না ; কপেরুকা মজ্জাব প্রদাহের দরুণ পক্ষাঘাত এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ; মধ্যে মধ্যে শ্বাস কষ্ট ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এক বিশেষ প্রকৃতির অবশবোধ । বুক হইতে হাতের আঙ্গুলের আগা পর্যন্ত অবশবোধ ; বাহুতে ছুরী দিয়া কাটার দ্বায় বেদনা ; হৃৎস্বায়শূল ; সজোবে খেঁতুলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, ডাইন মণিবন্ধে সেরূপ বেদনা ; রোগী মণিবন্ধ প্রসারণ করিতে চাহে ; রোগী হাত দিয়া কোন দ্রব্য ধরিতে পারে না ; হাতে গারি-বোধ এবং উহা মৃতবৎ ঠাণ্ডা ; আঙ্গুল এবং নখ নীলবর্ণ ; আঙ্গুল স্পন্দন করে । পা ইত্যাদি নিম্ন শাখা ঠাণ্ডা, নীলবর্ণ এবং উহার চালনা শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ ; পা ইত্যাদি নিম্ন শাখায় অবশবোধ এবং উহা শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না ; বাম হাঁটুর বহির্দেশের পেশীর অগ্রভাগে ভয়ানক সঙ্কোচক বেদনা ।

চক্ষু । দাড়ি গোপ কামাইবার সময় মনে হয় যেন গাণাদি স্থানের ছাল উঠিয়া বাহিতেছে ; চক্ষু চক্কাকারে কৌচ্‌কাইয়া যায় ।

নিদ্রা । হাইতোলা ; দিনের বেলা নিদ্রাবেশ ; হৃৎস্পন্দন হইয়া রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ।

জ্বর । শীত এবং উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি ; শীত এবং উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কাঁপনি এবং সুখমণ্ডল লাগবর্ণ ; কসেরূপা মজ্জার নিম্ন দিক হইতে উর্দ্ধদিকে হামা দেওয়ার জ্বর শীতবোধ ; প্রত্যেকবার শারীরিক পরিশ্রমে উষ্ণাত্তব ; শরীরে দমকা উষ্ণাত্তব এবং উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ষ ; শীতল চট্‌চটিয়া ঘর্ষ ।

ব্যবহার । হৃৎসায়ুশূল ; পক্ষাঘাত, বিশেষতঃ যাহা শরীরের নিম্নাংশ হইতে উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হয় ; মস্তিষ্ক এবং কসেরূপা মজ্জার প্রদাহ (Myelitis) । কসেরূপার সায়ুশূল ; পাকস্থলী এবং অন্ত্রের প্রদাহ (Gastritis and Enteritis) ; পাকস্থলীতে বেদনা ইত্যাদি অন্ত্রে অক্জালিক আসিড্ ব্যবস্থা । ওলাউঠার যে অবস্থায় হাইড্রোসারেনিক আসিড্ ব্যবহৃত হয়, অনেক সময় সেই অবস্থায় অক্জালিক আসিড্, ৩য় ক্রমের শুঁড়া, ১ গ্রেইন্‌ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অঙ্গাদিতে এক বিশেষ প্রকৃতির অবশ্যবোধ যাহা প্রায় পক্ষাঘাত বলিয়াই অনুভূত হয় এবং যাহা নিম্নাঙ্গ হইতে উর্দ্ধাঙ্গে বিস্তৃত হয় ; লক্ষণাদি ক্রমাগত বর্তমান না থাকিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশ পায় ; শরীরের স্থানে স্থানে স্পন্দন বা হুটী বিধানের জ্বর ঘটনা, কোন কোন স্থানে যাহার উজ্জেক হয় এবং যাহা কএক পলক বা সেকেন্ডের অধিক অবস্থিতি করে না । বেদনা বস্ত্রণাদির কথা স্মরণ বা চিন্তা করিলেই উষ্ণতার উজ্জেক হয় (ব্যারাইটা-কার্ক) ; চিনি, কাফি, মদ্য ইত্যাদিতে অন্ত্রের বৃদ্ধি । বহির্বাযুতে অন্ত্রের উপশম ইত্যাদি অক্জালিক আসিডের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । অক্জালিক আসিডের কার্যের সঙ্গে আসিনিকের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বিত্ত কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে মার্কিউরিয়াম করোসাইবাসের সন্ধক আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । চা খড়ি অথবা চুন ; কার্বোনেট্ অব ম্যাগ্নেসিয়া অক্জালিক আসিডের প্রতিষেধক ঔষধ ।

ডাইলুশন বিচার । ওলাউঠাতে ২য় এবং ৩য় ক্রমের শুঁড়াই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসকের মতে ইহার ১২

ক্রমের আরোক অধিক উপকারী। যে প্রকার পক্ষাঘাত নিরাস হইতে শরীরের উদ্ধারকে বিস্তৃত হয়, তাহাতে এই ঔষধের ১ম এবং ২য় দশমিক ক্রমের শুঁড়া, ১ গ্রেইন্ মাত্রায় বিশেষ উপকার দর্শে।

আসিডাম্ সাল্ফিউরিকাম্,—সাল্ফিউরিক্ আসিড্,—সাল্ফ-অ্যাস.

(ACIDUM SULPHURICUM,—SULPHURIC ACID,—AC. SULPH.)

কোন এক বিস্তৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত (Strong) সাল্ফিউরিক্ আসিড্ ক্রয় করিয়া উহার ৫ ফোঁটা (মিনিম্), ২ ছই ড্রাম্ ২৫ মিনিম্ চূরান জলে মিশাইয়া ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ১ম শততমিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে চূরান জলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৫ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্, ৯৫ ভাগ চূরান জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা ৩য় দশমিক এবং ৩য় শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ৫ম ও ততোধিক শততমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আদত সাল্ফিউরিক্ আসিড্ রক্তহীন এবং উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৮৪৩ এবং উহাতে জল মিশাইলে উহা অত্যন্ত উষ্ণ হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। স্নৈয়িক বিলী, বিশেষতঃ আহারবহা নালী (Alimentary Canal) এবং শাণ বস্তুর স্নৈয়িক বিলীর উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল। চর্ম্মের উপরও ইহার কার্য্য প্রবল বটে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন। সর্কলা খিট্ খিট্, বক্ বক্ করা, চিড়্ চিড়্ করা এবং রাগ করা (ক্রোধ, ক্রাম্); অধৈর্য্যতা; সমুদয় কার্য্যেই তাড়াতাড়ি করা (সাল্ফ্)।

মস্তক। বেন মস্তক ঢল্ ঢলে হইরাছে এক্রণ অস্বস্ত হইয়াছে;

হস্তিক এণাল হইতে ওপাশে সেন হঠাৎ সরিয়া পড়িয়া কপালে হঠাৎ থাকা লাগে এক্ষণ অশূভ হর (নাক্স-বক্স, হায়োস্, সাস্টক্স), বহির্কীয়ুতে চলিয়া বেড়াইলে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং ঘরের মধ্যে ছুপ সারিয়া থাকিলে বাহার উপশম হয়; কপাল এবং কপালের ছই পার্শ্ব ও কর্ণের পশ্চাৎভাগে থাকা মারার ভায় কঠোরক বাতনা, পূর্বাঙ্গে এবং সন্ধ্যার সময় বাহার বৃদ্ধি হয়; শিরঃশীতা, বাহা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হয় এবং হঠাৎ দূরীভূত হয়; পাকিয়া পূর্ব হইলে বেক্রপ হয়, সমুদয় বাধার বহির্দেশে সেক্রপ বেদনা, স্পর্শনে বাহা অধিক বেদনায়ুক্ত হয়।

চক্ষু । প্রাতঃকালে চলিয়া বেড়ানোর সময় ডাইন চক্ষুর বহির্দেশের কোণে সেন কাঁকড়াবির ভায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে এক্ষণ অশূভ হর; চক্ষুর পুরাতন প্রদাহ; চক্ষু দিয়া জল পড়া।

কর্ণ । কানে কম শুনা (ক্যাক্স-কার্স, সাল্ফ্)।

নাসিকা । শুকনা সর্দি এবং উহার দ্রুপ ভ্রাণশক্তির হ্রাস বা অভাব এবং স্বাদশূন্যতা (আন্টি-টার্ট, পাল্ফ্)।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল মৃতবৎ শিটা বা ফিকা; ডিমের দ্বারা লাল শুকাইয়া লাগিয়া থাকিলে বেক্রপ হয়, মুখমণ্ডলে সেক্রপ অশূভ হয় (আলাম্)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । নিশ্বাস প্রদানে অত্যন্ত দুর্গন্ধ (অপিকা, হিপার সাল্ফ্, নাইট্রিক্-অ্যাস, নাক্স-বক্স); হরাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থি হইতে জিহ্বা পর্য্যন্ত বেদনা; জিহ্বা পুড়িয়া বাওয়ার ভায় অশূভ হয় (আইরিস্, গ্রাটিনা, পাল্ফ্, সাক্সুনেরিয়া); টক খাইলে বেক্রপ হয়, দাঁত সেক্রপ টক হয়; মুখে থা (থোরাক্স, অ্যামোড, হেলিবোরাস্, হাইড্রাট্); তালুকা এবং আহারবহা গলনালীর উপরিভাগের ত্রৈম্বিক স্নায়ু ক্ষীণ এবং উহাতে রক্তাবরোধ ও ক্ষত। গলার মধ্য ক্ষীণ, বাহার দ্রুপ মনে হয় সেন গলার মধ্যে ডেলার ভায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে; গলার মধ্য অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত, বাহার দ্রুপ কোন দ্রব্য গিলিবার ব্যাধাত জন্মে (বেল্); গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া বাওয়ার ভায় অশূভ হয় (অর্জেন্ট, এরাম্, নাক্স-বক্স, সাক্সুনেরিয়া); হরাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির (Sub maxillary glands)

ক্ষীতি এবং প্রদাহ ; ডিপথিরিয়া রোগে গলার মধ্যের পশ্চাৎভাগে করলা লেবু ভায় হরিদ্রা বর্ণের স্লেষ্মার ভায় পদার্থ যেন ঝুলিয়া পড়ে ।

পাকস্থলী এবং উদর । টক উল্গার উঠা (আলাম্, কার্কো-বেজ্, কস্) ; প্রবল হিকা (সিকুটা, ব্রাই, হারোস্, ইমেস্, বিরেট্-আব্) ; আভালদিগের বমন (নাস্-বম্) ; মদ্য না মিশাইয়া দিলে সকল প্রকারের পানীয় ভ্রুবোই পাকস্থলীতে অত্যন্ত ঠাণ্ডাবোধ হয় । উদরে দুৰ্গন্ধবোধ, বাহার দ্রুণ মনে হয় যেন রক্তঃপ্রাণ শীত্ৰই আরম্ভ হইবে ; এক দিকের কুচকি সম্বন্ধীয় অঙ্গবৃদ্ধি ।

মল । সর্পনাই নবম মল ভাগ ; উদরানয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুৰ্গন্ধতা ; নরম মলত্যাগের পর পেটে খালি খালি বোধ ; গোলা-নীর ভায় ঘোলাটিয়া মল ভাগ (একন্) ; শিশু বা ছোট বালক বালিকাপণের মল বাত্ৰাদ্বয়ের ভায় হরিদ্রা বর্ণ, গদের ভায় চট্-চটিয়া আঠা ; মল নরম, কাইয়ের ভায়, হরিদ্রার আভায়ুক্ত সাদা ; মল কতক কঠিন, কতক তরল এবং উহার সঙ্গে অধিক পরিমাণে তরল স্লেষ্মা ও রক্তের ছিট থাকে ; মল অত্যন্ত দুৰ্গন্ধযুক্ত ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাধারে বেদনা বাহার দ্রুণ মূত্রের বেগ থামিয়া যায় ।

জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং প্রচুর পরিমাণে রক্তঃপ্রাণ (আস্, ক্যাক্-কার্ক্, নাস্-বম্) ; কতকারক, অথবা জালা উৎপাদক দ্রুণের ভায় শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ (ক্যাক্-কার্ক্, কোনায়ান্, পাগ্-স্, সিলিয়া) ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বসতক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্য এবং কণ্ঠ-নালীতে থল্-থলি বা খড়্-খড়ি বোধ ; নিশ্বাস প্রবাহ ঘন ঘন ; বুকের মধ্যে উত্তেজনার দ্রুণ কাশি এবং শুষ্করণ প্রাতঃকালে গলা দিয়া কাল্-চে রক্ত, বা হরিদ্রাবর্ণ, রক্তের ছিট বিশিষ্ট টক স্বাদের তবল শ্রেষ্মা নির্গমন ; কাশির পর উল্গার উঠা ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া রক্তের ছিটযুক্ত স্লেষ্মা নির্গমন ; কুফুস হইতে প্রচুর রক্তঃপ্রাণ ; কুফুসের স্কেটিক রোগ (tuberculosis) ।

চক্ষু । শরীরের স্থানে স্থানে নীলবর্ণ আভায়ুক্ত গোম্‌হা বাত্ৰাণ

জার (Ecohyrnoses) দৃষ্ট হয় (আর্নিকা, ফস্, সিকেল্) ; থেঁতুলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে আঘাত প্রাপ্ত স্থান সহজেই পচিবার উপক্রম হয় (আস্) ।

নিদ্রা । অনেক রাত্রিতে ঘুম হয় এবং অতি প্রচুরে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ।

জ্বর । শীতবোধ ঘরের মধ্যে বাহ্যে অধিক অনুভূত হয় এবং ঘরের বাহিরে যাহার উপশম হয় ; অঙ্গ চালনার সময় শীতবোধ ; প্রচুর ঘর্ষ এবং তন্দ্রকণ অত্যন্ত দুর্বলতা ; রক্ত্রিতে প্রচুর ঘর্ষ (চায়না, ফস্, ফস্-আস্) ।

ব্যবহার । আঘাত প্রাপ্ত হওয়া, থেঁতুলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার দরুন অনুধ ; সার্বাস্থিক দুর্বলতা ; রক্ত্রাঘ বা পুঁ‌যাদি রসক্ষয় হেতু জ্বর বা হেপ্টিক্ ফিবার, (Hepatic Fever) ; রক্ত্রোৎকাণ ; বক্ষাকাণ ; রক্ত্রাঘ ; উদরাময় ; মুখে ঘা ; পাকস্থলীর অঘলের বারাম ; হিকা ; আত্মিক-জ্বর ; চক্ষু প্রমোহ ইত্যাদি অনুধে সাল্‌ফিউরিক্ আসিড্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । প্রচুর ঘর্ষ ও তন্দ্রকণ অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলক্ষয় ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন শরীর কাঁপিতেছে, কিন্তু শরীর বাস্তবিক কাঁপে না ; বেদনাদি ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হয়, কিন্তু হঠাৎ দূরীভূত হয় ; বোনিটার, গুল্‌বার, নাক ইত্যাদি দিয়া বে রক্ত্রাঘ হয়, উহার রক্ত্র কাল্‌চে (হামামেলিস্, ফস্) । বৃদ্ধ বয়সে, বিশেষতঃ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের শেষ রক্ত্রঃরোধের সময় অনুধে বিশেষ উপকারী । বহির্বারু, মধ্যাহ্নে আহ্বারের পর, ঠাণ্ডা বা আত্মবায়ুতে অনুধের বৃদ্ধি ইত্যাদি সাল্‌ফিউরিক্ আসিডের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমুগ্ধ বিশিষ্ট ঔষধ । সুন্দর মিনারেণ্‌ আসিডস্ (Mineral Acids) ; আর্নিকা, ডিজিটালিস্, পাল্‌সেটিলা, সাল্‌ফাব ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সঙ্গে সাল্‌ফিউরিক্ আসিডের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । পাল্‌সেটিলা ।

ডাইলুশন বিচার । ডাক্তার হিউজের (Dr. Hughes) মতে ২য় এবং ৩য় দশমিক ডাইলুশন ব্যবহার্য্য । বক্ষাকাশে জ্বর এবং অন্যান্য রোগে দুর্বলকারক অর্থে ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া লেখক বিশেষ উপকার পাইয়া থাকেন ।

আসিডাম্ কার্বোলিকাম্,-কার্বোলিক্ আসিড্,-কার্ব্-আস্

(ACIDUM CARBOLICUM,—CARBOLIC ACID,—AC. CARB.)

কোন এক বিস্তৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত কার্বোলিক্ আসিড্ ক্রয় করিয়া যথানিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে মিশ্রিত করিয়া ইহার মিশ্র আরোক বা ডাইলুশন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কন্সেন্ট্রা মৰ্জ্জা সঞ্চীয় স্নায়ুর উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। উহা উক্ত স্নায়ু মণ্ডলীর জীবনী শক্তি হ্রাস করিয়া শরীরের ঘন এবং তরল পদার্থকে বিকৃত করে এবং তদনুযায়ী তরল পদার্থে উদ্ভিদ এবং জাতব পদার্থের বীজ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে আত্যন্তিক প্ররোগে শরীরের উপরে ইহা বিরূপ কার্য করিয়া থাকে কেবল যে তাহাই প্রতীত হয় এমন নহে, নিম্ন শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ এবং জাতব দেহে ইহা রোগ আরামের জন্ত বা ঔষধার্থ এবং রোগ নিবারক বরূপ বিরূপ কার্য করে তাহাও জানিতে পারা যায়। অতি অল্প পরিমাণ কার্বোলিক্ আসিড্ জলে মিশাইয়া উক্ত মিশ্র আসিড্ কোন প্রকার উদ্ভিদ বা জাতব দেহে ঢালিয়া দিলে উহা দ্বারা উদ্ভিদ পদার্থ এবং কীটাত্তর্য তৎক্ষণাৎ এক-বারে বিনষ্ট হয়। এই শক্তি নানা প্রকারের পচন ক্রিয়া দমন করে। এইরূপে ইহা পচন সংক্রমণ নিবারক বা প্রতিষেধক রূপে কার্য করিয়া থাকে। জাতব দেহের পচন ক্রিয়া নিবারণ করে বলিয়া পূঁঘ দ্বারা বিবাক্ত হওয়ার দরুণ রোগ, মৃতদেহ ছেদন করা সময়ে অস্ত্রের খোঁচাদি লাগিয়া বিবাক্ত বা, ছুঁতরণ বা পৃষ্ঠাঘাত (Carbuncle) এবং যে প্রকার বা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া উঠে (Hospital Gangrene), সে সকল রোগে কার্বোলিক্ আসিড্ বিশেষ উপকারী।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ঘন। কোন প্রকার চিন্তা বা মানসিক পরিভ্রমে অনিচ্ছা; অত্যন্ত বিট্‌বিট্, চিচ্‌চিচ্‌ করা।

মস্তক। কপালের চতুর্দিকে এক গাছি রবারের কিতার দ্বারা

পাত কসিয়া বাঁধিয়া রাবিলে বেরুণ হয়, মাথার সেরুণ ভারিবাধ এবং ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনা (অ্যাক্টি-টার্ট, চেলিডন্, মার্ক, নাইটিক্-আস, সান্‌ক্); কপালের মধ্য দিয়া আঁড়া আঁড়ী কসিয়া ধরার জ্বর অহতুত হয়; মাথার উপরিভাগের বাম পার্শ্বে ক্ষুদ্র ত্রণের জ্বর কোকা বা কুকুড়ী; মাথার ছাড়ের উপরে চুলকানি (কষ্ট্, গ্রাক্, সিপিরা, সাইনিসি, সাল্‌ক্)।

চক্ষু । ডাইন চক্ষুর কোটরের উপরিভাগের স্নায়ু-শূল (কলোস্)।

নাসিকা । জ্ঞান, শক্তি স্বাভাবিক অপেক্ষাও অধিক তীক্ষ্ণ বা প্রথম; নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া থাকে; নাকের মধ্যে ক্ষত এবং উহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পুঁদের জ্বর রেন্ন নিঃসরণ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা, অথবা আরক্ত ও টল্‌টলে এবং আলায়ুক্ত।

গলার মধ্য । গলার মধ্যে বা বা টাটানি বাহা ডাইন পার্শ্বেই অধিক অহতুত হয়। গলা খেকুর দিলেই গলা দিয়া পরিষ্কার সাদা রেন্না নির্গত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা বা রুচি শূন্যতা; হইকি (Whisky) নামক মদ্য পানের ইচ্ছা (আসেরাম্); অনবরত ঢেকুর বা উল্গার দ্বারা প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু উঠা; অত্যন্ত বমনোদ্বেষ্ট এবং বমনের ইচ্ছা (অ্যাক্টি-টার্ট)। উদরের ডাইন পার্শ্বে বেদনা; উদরের ছই পার্শ্বে, প্রোমী প্রদেশে (Iliac Regions) বেদনা; পেটের মধ্যে গড়্‌গড়্‌, কল কল শব্দ হওয়া এবং উহাতে মোচড়ানী ও পেট বেন ক্ষীত হইয়াছে এরূপ অহতুত হয় (চারনা, লাইকোপ্)।

বল । শৈশবাবস্থার ওলাউঠা (Cholera Infantum) এবং পড়া ডিমের জ্বর দুর্গন্ধযুক্ত বলভেদ।

মূত্র । মূত্র কাল্‌চে, কাল্‌চে সবুজের আভাযুক্ত কটাবর্ণ; মূত্র কাল্‌চে ধূমের রস্‌ বিশিষ্ট এবং জ্বর গুণ বিশিষ্ট পদার্থ মিশ্রিত।

জ্ঞানেন্দ্রিয় । জ্ঞানোক্তির অতিরিক্ত পরিমাণে কাণ্ডে রক্ত-প্রাব; বহির্বীরূতে চলিয়া বেড়াইবার সময় বাম ভিষকোষে বেদনা বাহা শীঘ্র শীঘ্রই সাহিয়া যায়; হৃদিকা-জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বস্তিকোটরস্থ

যন্ত্রাদিতে পচনের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া ; অরারুর মুখের চতুর্স্পার্শ্ববর্তী স্থানে ক্ষত (হাইড্রাট্) ।

খাদ্য যন্ত্র । নিখাস প্রবাস গৌ গৌ, ঘড়্ ঘড়্ শব্দ বিশিষ্ট (ওপি-রাম্) ; অণুস্থায়ী খুশ্ খুশ্ কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে হুড়্ হুড়্ বা খুশ্ খুশ্ করা ; বুক যেন অত্যন্ত কম প্রশস্ত এরূপ অস্বভূত হয়, বাহার দরুণ মনে হয় যেন বুক ও উদর কোটরের মধ্যস্থিত গোল পেশী (Diaphragm) কুক্ষ্ণ চাপিয়া রাখিয়াছে ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশীতে টাটানি ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । বাম বাহুতে অনবরত তারি এবং প্রান্তিবোধ ; ডাইন বাহুর পেশীতে টাটানি ; বাম বাহুর সমুখ ভাগে কনকনিয়া বেদনা । কুঁচ্কির সন্ধি হইতে পা ইত্যাদি শরীরের নিম্ন শাখায় সীসার ভায় তারি-বোধ ; বাম হাঁটুর সন্ধির হাড়ের (Patella) নীচে কনকনানি বা টাটানি ; মনে হয় যেন হাঁটুর সন্ধি সঞ্চালন করা যাইবে না, কিন্তু সঞ্চালনের সময়ে উক্ত প্রকারের বেদনা একবারেই অস্বভূত হয় না ; বাম পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক হাড় প্রথমে বেদনা ।

চর্ম । শরীরের নানা স্থানে চুলকানি (সালফ্) ; সমুদয় শরীরে কোম্বার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ী বাহা অত্যন্ত চুল্কায, ঘবিলে বাহার উপশম হয়, কিন্তু ঘবিবার দরুণ আক্রান্ত স্থানে আশার উদ্বেক হয় (সালফ্) ।

ব্যবহার । আরক্ত জ্বর, ডিপ্ থিরিয়া (Diphtheria), আয়িক জ্বর ইত্যাদি বাহাতে শরীরের কোন কোন অংশ বা যন্ত্রে পচা লাগে ; মৈথিক ঝিরী পচিয়া উঠা হইতে পচা তর্গকবুদ্ধ অস্বভূত পূর্ব নির্গমন ; মৈথিক রোগ ; মুখে ঘা ; নর্দামার ঘোষজনিত অস্বথ ; মূত্রকোষের ব্রাইটস্ ডিজিজ (Bright's Disease) ; খোস বা চুলকানি ; গার চুলকানি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণের তার ফুসুড়ী (Prurigo) ; সংবৃত বসন্ত (Variola Confluens) ; কণ্ঠ-নালী প্রদাহ (Laryngitis) ; বায়ুনল প্রদাহ ; অজীর্ণ ; গর্ভাবস্থার বমন বা বমনোবেগ (Morning Sickness) ; উদরায়ন ; বমন সম্বলিত শিরঃশীতা ; মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মর্জ্জার উত্তেজনা ; অরারুর মুখের চতুর্স্পার্শ্ববর্তী স্থানে ক্ষত ; ডিপ্ থিরিয়া (Diphtheria) ; কোন কোন প্রকারের মেলেরিয়া জনিত

অর ; পূর্ব দ্বারা রক্ত বিবাক্ত হওয়ার দরুন যকৃতের ফোড়া এবং আমাশয় ; মস্তিষ্কের শুষ্ক শোথ ; মূত্রাবরোধ হেতু ইউরিমিয়া (Uraemia) জনিত ঘোর অচেতনতা ইত্যাদি অস্থখে কার্বোনিক্ আসিড্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত অলসবোধ, গা মাটিমাটি করা এবং অত্যন্ত বলহীন ; সামান্য চলিয়া বেড়াইতে অত্যন্ত ক্লান্তি বা শ্রান্তিবোধ ; রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে যেন তাহার সর্পি লাগিয়াছে ইত্যাদি কার্বোনিক্ আসিডের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । স্বাস্থ্য মণ্ডলীতে কার্বোনিক্ আসিডের কার্য্য অনেকটা জেল-সিনিয়ামের কার্য্যের ছায় । পাকস্থলীর উপর ইহার কার্য্য অনেকটা ক্রিয়াজোট এবং কার্বো-বেজিটেবিলিসের ন্যায় । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আদিনিফ, ব্যাপ্টিসিয়া, ল্যাক-সিল, ফফরাস্, নাইট্রিক্ আসিড্, মিউরিয়াটিক্ আসিড্, রাস্টক্স্ এবং গাল্ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধ ঔষধ । স্যাকারেট্ অব্ লাইম্ গোল (Saccharate of lime in solution) সেব্য ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য় এবং ৩য় ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

আগারিকাশ্ মাকেরিয়াস,—আগার-মাক্

(AGARICUS MUSCARIUS,—Agar. MUSC.)

ইউরোপ, আশিয়া এবং আমেরিকায় শুষ্ক ভূমিতে এই গাছ জন্মিয়া থাকে । ইংলণ্ডে এই গাছ সচরাচর জন্মে না । কিন্তু স্কটল্যাণ্ডে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । ইহার কাঁটা, কৌড়কের (Fungus) ছাল ফেলিয়া দিয়া ভালরূপে ধুইয়া যথানিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহার শুকনা কৌড়ক যথানিয়মে সুগার অব্ মিকের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার শুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্কের উপর ইহার কার্য মদ্য (মদ্য), আকিস এবং তড়িতির ন্যায়, বাহ্যিক দ্রব্য নেশার ন্যায় হইয়া রোগীর চেতনা একেবারেই থাকে না । অনেক কাল ধরিয়া মদ্যপানে অত্যাচার হেতু বেরুণ হয়, এই ঔষধও শরীরের সেরূপ বিরূপতা বহু উৎপাদন করে । স্থানিক প্রয়োজে শরীরের উপর ইহা এক উত্তেজক (Irritant) এবং ধ্বংসকারী বিষের ন্যায় কার্য্য করিয়া আক্রান্ত স্থানে প্রদাহ, বিকৃতি এবং কখন কখন উক্তস্থানের মৈত্রিক কিল্লীর পচন উৎপাদন করিয়া থাকে । কসেফকা সর্জা সম্বন্ধীয় দারুণগুলি ইহা দ্বারা অত্যন্ত প্রবলরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে । উক্ত দারুণগুলির যথোপযুক্ত উৎপাদনের সহায়কারী দারুণই অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে, বাহ্যিক দ্রব্য শরীর কম্পন, কোরিয়া (Chorea), আক্ষেপ (Convulsions) ইত্যাদি অস্থির উৎপন্ন হয় । জ্ঞান উৎপাদক দারুণগুলিও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, বাহ্যিক দ্রব্য কসেফকা সর্জা ও দারুণগুলিতে বেদনা এবং বেরুণের উপর স্পর্শ করিলে টাট্টার ও বেদনামুক্ত হয় । এই বেদনা কোবর প্রদেশস্থ বেরুণওই অধিক অস্থির হয় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সকল বিষয়েই উদাসীনতা ; কোন প্রকার প্রবোধ উত্তর দেওয়ার অনিচ্ছা (কস্, কস্-মাস্) ; প্রলাপ উক্তি এবং অনবরত পাগলের ন্যায় বক্ বক্ করা বা ছুটছুটি করা ; সর্জন্য বিছানা হইতে উঠিয়া বাওয়ার চেষ্টা ; পারিবারিক শক্তির অত্যন্ত চালনা (বেল, হাবোস্) ; সর্জন্য চটিয়া বাওয়া ; একগোঁয়েবী ; বিমর্ষভাব ; অবাধতা (ক্রাই, ক্যান, মাস্-বন্) ।

স্নায়ু । বহির্কায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে মাথাধোরা (আন্টি ক্রুড, ক্যাল্-ক-কার্ক, প্রোনবন্, সিগিয়া, সাল্-ক্) ; স্নায়ুপানে নেসা হইলে বেরুণ হয়, সেরূপ পা টলা (ট্রান্) ; ঘুণ্ ঘুণে মাথা ধরা, কপালেই বাহা অধিক অস্থির হয়, বাহ্যিক দ্রব্য রোগী মাথা এমিক ওমিক ঘুরাইতে বা নাড়িতে বা ঘুণ পাওয়ার ন্যায় চক্ বুজিতে বাধ্য হয় ; কপালের হাড়ের দুই পার্শ্ব হইতে নাকের গোড়া পর্যন্ত কমিয়া ধরা ; সকল ব্যক্তি কোরিয়া (Chorea) রোগাক্রান্ত এবং বাহাদিপের অর হইলেই প্রলাপ (Delirium)

হয়, তাহাদিগের শিরঃশীতা বা মাথার বেদনা (বেল্); শরীরের স্পন্দন; মাথার বরফের ন্যায় ঠাণ্ডাবোধ (বিরেট্-আল্‌ব্), প্রধানতঃ কপালের হাড়ের ডাইন পার্শ্বে কাঁটা বিঁধিয়া রাখার ন্যায় বেদনা বা ব্যতনা (জানি-কার্ড্, কফিয়া, ইগ্‌নেস্); মাথার পশ্চাদ্দেশে ভারিবোধ, বাহ্যিক দ্রবণ মাথা পশ্চাদ্ধিকে টলিয়া পড়ে (চারনা) ।

চক্ষু । চক্ষুর পাতার স্পন্দন (চিনিমাম্-সাল্‌ফ্); চক্ষুর গোলকের কন্‌কনানি ও স্পন্দন; চক্ষের আক্ষেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর ব্যবহার না হইলেও চক্ষে অত্যন্ত দুর্বলবোধ; চক্ষের সম্মুখে নানা প্রকারের চিত্র বা দাগ দেখা (কাইমট্); চক্ষুর সম্মুখে নানা প্রকারের কম্পমান রক (Vibrating Spectra) দৃষ্ট হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাব্যোরা; চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ বা জালের ভায় অথবা ক্রাণার ভায় দৃষ্ট হয় (সাল্‌ফ্, সাইক্লোমেন, মার্ক্, কস্, সিপিয়া, সাইলিসি); চক্ষুর পাতার মধ্যবর্তী স্থান অপ্রশস্ত; চক্ষু অস্পষ্ট দেখা; সকল সময় এক প্রকার দূরে দেখা যায় না ।

কর্ণ । অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগিলে যেরূপ হয়, কান সেরূপ লালবর্ণ এবং উহাতে জ্বালা এবং চুলকানি ।

নাসিকা । প্রাতঃকালে নাক ঝাড়িবার সময় নাক দিয়া রক্ত পড়া (আস্‌চা, ব্রাট্) এবং তৎপর নাক দিয়া ভয়ানক রক্তস্রাব; নাকে কোন প্রকার গন্ধই লক্ষ্য হয় না (একন্, বেল্, কলোস্, কল্‌চ্, হিপ্-সাল্‌ফ্, লাইকোপ্) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা শুষ্ক (আস্‌, ব্যাপ্ট্, বেল্, ফস্, রাস্-টক্স্); জিহ্বা সাদা লেগযুক্ত; মাড়ি ক্ষীত; কোন প্রকার ধারক (Astringent) জব্য থাকিলে যেরূপ হয়, আহারবহা গলনালীর উপরিভাগে সেরূপ শুষ্কবোধ এবং উহার সঙ্কোচন । না কাশিলেও গলা দিয়া কঠিন স্লেমা নির্গত হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । পচা ডিমের স্বাদ বিশিষ্ট উল্কার উঠা (আন্টি-টার্ট্, আণিকা, সোরিনাম্, সিপিয়া), অথবা পচা আতা কলের গন্ধবিশিষ্ট উল্কার উঠা; হিকা; বমনোদ্বেষ্ট এবং বমন; আহারেব ৩ ঘণ্টা পর পাকস্থলীতে জ্বালা বাহা ঘূশ্‌ঘূশে চাপাবোধে পরিণত হয় এবং উহার

সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্যোগ । যকৃতের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার বিকৃতি; যকৃত প্রদেশে সূচীবিধানের দ্বারা বেদনা; অস্ত্রের মধ্যে গড়্ গড়্, কল্ কল্ শব্দ হওয়া (আলোজ্, লাইটকাপ্, সিমিরা, সাল্‌ক্); বাম পার্শ্বের ক্ষুদ্র পাক্ষিক হাড়ের নীচে সূচীবিধানের দ্বারা অসহ্য হইয়া উঠা এবং দিগ্বা দিগ্বা দ্বিতীয় বায়ু নিঃসরণ; উদর ক্ষীত এবং বিকৃত ।

মল । মল পিত্তযুক্ত ঘাসের দ্বারা সঙ্কটবর্ণ (ইলিকাক্, ম্যাগ্-কার্ক্); প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই উদরাময় (আলোজ্, পডোফ্, কমেজ্, সাল্‌ক্); আহারের পর উদরাময়; উদরে গড়্ গড়্, কল্ কল্ শব্দ সম্বলিত উদরাময় (আলোজ্); আক্কেপিক শূলবেদনা সম্বলিত উদরাময় এবং দাঁতের সময় শুষ্কতার দ্বারা দ্বিতীয় বায়ু নিঃসরণ (কলোস্) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রনালা দ্বারা আঁটাল চট্‌টিয়া স্বেদনা নির্গমন ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের জীৱনবাসের ইচ্ছা হইয়া বটে, কিন্তু জীৱন-জনের সময় পুরুষাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে (আর্জেণ্ট-নাইট্‌ক্, ক্যানারাম্, ক্যালিডিয়াম্); জীৱনবাসে ধাতু নির্গত হওয়ার পর অত্যন্ত দুর্বলতা এবং অলসবোধ (চারনা, কস্, ফস্-আস্, ষ্টাকিস্) এবং উরুদেশে অত্যন্ত দুর্বলবোধ ও বেদনা; জীৱনবাস বিষয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছা (চারনা, কস্); জীৱনবাসের অসমর্থতা নিম্নলিখিত সন্ধ্যার তৈলিয়া নামের দ্বারা অত্যন্ত বেদনা বাহা সহ্য করিতে না পারিয়া রোগী ছট্‌ফট্ করে; যোনি ও যোনিদ্বারে ভয়ানক চুলকানি (আস্, ক্যানারাম্, ক্রিগজ্, নেট্রাম্-বিউব্, নাইট্‌ক্ আস্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষসহবাস এবং পুরুষ আলিঙ্গনের অত্যন্ত ইচ্ছা (ক্যান্) ।

শ্বাসযন্ত্র । সময়ে সময়ে প্রবল কাশির আক্রমণ হাঁচি হইয়া শেষ হয়; হঠাৎ আক্কেপিক কাশি, পূর্ণাক্ষ বা দিনের বেলা বাহ্যিক বৃষ্টি হয়; কণ্ঠনালাতে কণ্ঠবোধ এবং সঙ্কোচক বাতনা, বাহ্যিক দ্রবণ বাসরোধ হইবে বলিয়া ভয় হয় (একন্, ল্যাক্); বৃক্ক অত্যন্ত কষ্ট এবং সঙ্কোচক বাতনা (আস্, ফস্); শ্বাস কষ্ট ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । বাড় শব্দ হয় বা উহা নোয়ান দ্বারা না (একন্); হই স্বক্কেপ মধ্যবর্তী স্থানে এক বিশেষ প্রকৃতির দুর্বলতা এবং শব্দ

বোধ যাহা ঘাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; মাথা হেট করিয়া অনেককণ ক্রমাগত উপুড় হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেরূপ বেদনা (বাস্ টেক্স); থেঁতলিয়া গেলো বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশের পেশীতে সেরূপ অহুত হয়, যাহার দরূপ মাথা সমুখ দিকে বাকা হইয়া পড়িলে মনে হয় যেন পৃষ্ঠদেশে পেশীগুলি খাট হইয়াছে; মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে কসেরূকা মৰ্জ্জার আগাগোড়া বেদনাহুতব; কসেরূকার মধ্যে খেঁচা বিধার জ্ঞান জালায়ুত বেদনা; মেরুদণ্ড স্পর্শ করিলেও বেদনাযুক্ত হয় (সিমিসিক্, ফন্স); শরীর ফিরাইলে বা ঘুরাইলে মেরুদণ্ডে অত্যন্ত প্রবল বেদনার উদ্বেক হয়; পিপড়া হামা দিয়া গেলে যেরূপ হয়, মেরুদণ্ডের মধ্যে সেরূপ অহুত হয়; বহির্বিষ্মুতে চলিবার সময় গুহ্বারের উপরিভাগে স্থচী বিধানের ভাব হঠাৎ প্রবল বেদনা; কোমর এবং কোমরের নিম্ন প্রদেশে, ও গুহ্বারের ঠিক উপরিভাগে প্রবল বেদনা; পৃষ্ঠদেশ যেন শক্ত হইয়া থাকে যাহা ঘাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । হাতের কাঁপনি (কন্স); বাম বাহু এবং সমুখ বাহুতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; বাম সমুখ বাহু এবং কহুইয়ের পেশীতে কসিয়া ধরার ভাব অহুত হয়; নিহারাক্রান্ত হইলে বা বরফে অনেককণ থাকিলে যেরূপ হয়, হাত এবং হাতের আঙ্গুলে সেরূপ লাল বর্ণ ক্ষীতি এবং উহাতে চুলকানি ও জ্বালাহুতব; ক্ষুদ্র সন্ধি-বাতের ন্যায় হাতের আঙ্গুল শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না। পাহার পেশীর (Gluteal Muscles) স্পন্দন; পা যেন শ্রান্ত এবং ভারি অহুত হয়; পা দুর্বল; শ্রান্ত হইলে যেরূপ হয়, পায়, বিশেষতঃ, ডাইন উরুর সন্ধিতে সেরূপ বেদনা; নিহারাক্রান্ত হইলে বা বরফে অনেককণ ভিজিলে যেরূপ হয়, পায়ের আঙ্গুল সেরূপ লালবর্ণ এবং উহাতে চুলকানি ও জ্বালাহুতব (এপিস)।

জ্বর । সামান্ত নড়াচড়াতেই শীতবোধ; বিছানায় কাপড় সমান্ধ উঠাইলেই শীতবোধ।

নিদ্রা । বারম্বার হাই তোলা; নিদ্রার অত্যন্ত ইচ্ছা; ঘুম হওয়া হওয়া সময়ে চক্কিয়া উঠা এবং শরীর স্পন্দন।

ব্যবহার । শৃগীরোগ; কোরিয়া (Chorea); কসেরূকা মৰ্জ্জার

রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার উদ্ভেজনা ; কসেদক রক্তের কোমলতা ; আত্মিক অর বা অর বিকার ; মদোন্মত্ততা (Delirium Tremens) ; সংনাশ রোগ ; মাতালদিগের যন্ত্রের কার্য সম্বন্ধীয় অসুখ ; অক্লীর্ণ ; বাতরোগ ; চক্ষুর নানা প্রকারের রোগ ; আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া বাওয়ার ন্যায় বা ; নিহারাক্রান্ত হওয়া (Frost-bite) জনিত অসুখ ; অনর্থক মোটা হওয়া (Obesity) ইত্যাদি অসুখে আগারিকান্ ব্যবহার্য্য :

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শরীরের নানা স্থানের পেশীর স্বল্পমান স্পন্দন ; রোগী (দ্রৌলোক) মনে করে যেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহার আপন নহে ; শরীরের উর্দ্ধ এবং নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত ; চলিতে চলিতে বেথানে সেখানে টলিয়া পড়া ; সমুদয় শরীরের স্পন্দন ; পেশীর ভয়ানক স্পন্দন (সিকুটা, ফাইনষ্ট্, ট্রামন্) ; ঘুন হওয়া হওয়া সময়ে চমকিয়া উঠা এবং পেশীর স্পন্দন, (বেল, হায়োস্, ট্রামন্) ; শীত কম্প বাহা শরীরের উর্দ্ধভাগ হইতে নিম্নভাগে বিস্তৃত হয় ; চলিবার সময় অথবা সামান্য শারীরিক পরিশ্রমে বর্ধ হওয়া ; নিহারাক্রান্ত (Frost-bite) হওয়ার দ্বারা স্থানে স্থানে লালবর্ণ হওয়া এবং উহাতে চুলকানি এবং জ্বালাদ্রুতব ; বরফ বা বরফের সূচী বিঁধাইলে যে রূপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে সেরূপ অসুস্থ হইতে হয় ; মাতালদিগের শিরঃপীড়া । প্রাতঃকালে, আহারের পর, মৈথুন কার্যে অত্যাচারে, রাত্রিতে, শীতল বাতাসে, মানসিক পরিশ্রম বা চিন্তাতে, সূর্য্যের রশ্মিতে, বিপ্রাণে, জল বৃষ্টি বা বজ্রাদি পতনের পূর্বে অসুখের বৃদ্ধি এবং নড়া চড়া বা চলিয়া বেড়াইলে অসুখের উপশম ইত্যাদি আগারিকানের কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমুত্তম বিশিষ্ট ঔষধ । আগারিকানের কার্যের সঙ্গে সিমি-সিকিউগা, ক্যানাবিস্ ইত্যিকা, হায়োসায়েরমাস্ এবং ওপিয়ামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বির কোন কোন বিবরে ইহার কার্যের সঙ্গে ক্যাল্কেরিয়া কার্বোনিকা, সিকুটা, কফিয়া, কোনায়াস্, ল্যাকেসিস্, জাবরাতি, নাক্সবমিকা, কফরাস্, কফরিক্ আসিড্, ফাইনষ্টগ্, পাল্-সেটিল, টারেন্টুলা এবং জিকানের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্ফার, কফিয়া, পাল্-সেটিল, সুরা ।

ডাইলুশনবিচার । ওর হইতে ৬ষ্ঠ ডালুইশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসকের মতে আগারিকাশের মূল আরোক দ্বারা মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শে ।

আলোজ্,—আলোজ্

(ALOE, —ALOE SOCOTRINA,—ALOE.)

সোকোট্রা দ্বীপে যে প্রকার আলোজ্ জন্মে (Socotrine Aloe) উহা বধা নিরমে প্রকৃষ্ট পিঠিতে ত্রিভাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । বহুতের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, বাহার দ্রুত পিত্তের অতিরিক্ত সঞ্চায় হইয়া থাকে । দ্বিতীয়তঃ ইহা বৃহৎ অন্ত্রের পৈশিক অংশ এবং শুষ্ক আক্রমণ করে, বাহার দ্রুত শুষ্ক অধিক পরিমাণে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া অর্শরোগ হয় এবং বস্তিকোটরস্থ বস্ত্র, প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয় আক্রান্ত হইয়া থাকে । শুষ্কের উপর ইহার কার্য্যের বিষয় চিকিৎসকের বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্তব্য ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মানসিক পরিশ্রমে অত্যন্ত অনিচ্ছা (নাক্স-বম্), কারণ ইহা দ্বারা রোগী অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়ে ; নড়িতে অনিচ্ছা ; পর্য্যায়ক্রমে মনের অবসন্নতা এবং চাক্ষুণ্য ।

মস্তক । কপালের মধ্য দিয়া আড়াআড়ী বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্রে ভারিবোধ এবং বমনোদ্যোগ (নাক্স-বম্, পডোফ্) ; চক্ৰকোটরে উপরিভাগে চাপিয়া ধরার ভাবী ঘূর্ণঘূর্ণ বেদনা ; মাথার সম্মুখভাগে উক্ত প্রকারের বেদনা ; মাথার উপরিভাগে ভারিবোধ (ক্যাট্টে, সাল্ফ্) ; উচ্চতাতে মাথা বেদনার বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা প্রয়োগে মাথা বেদনার উপশম (আস্) ; কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়ার দ্রুত মাথাধরা বা মাথা বেদনা ; পাকস্থলী এক অন্ত্রের অন্ত্র সম্বলিত মাথাধরা ।

চক্ষু । চক্ষুকেটিরের মধ্যে বেদনা, বাঁহার দক্ষণ মনে হয় যেন বেদনা উক্ত স্থানের পেশীতে স্থিত; এই বেদনা ডাইন পার্শ্বেই অধিক অনুভূত হয় (সিমিসিক্, স্পাইজেল); পাখীর ডানা কাড়িলে যেদ্রুপ হয় চক্ষুর সম্মুখে সেদ্রুপ ধড়্ ফড়্ করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলে উচ্চাত্ত্ব্য ; চক্ষুর সম্মুখে যেন একটা হরিদ্রা বর্ণের আঙ্গটা নড়িতেছে এরূপ অনুভূত হয় ; রোগী চক্ষু ছোট করিয়া তাঁকাইতে বাঁধা হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে বেদনা ; চক্ষে ভারি বোধ এবং বমনোদ্বেগ ।

মুখগহ্বর । দাঁতের অগ্রভাগের মধ্যদেশ ধারাল, বাঁহার দক্ষণ জিহ্বার আঘাত লাগিয়া যা হয় ; মুখে ধাতুর স্বাদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শূলুশ্বে শুক কাশি ।

পাকস্থলী এবং উদর । তিক্ত উদগার উঠা ; বক্ষাঙ্গির (Sternum) নীচে অত্যন্ত কষ্টদায়ক চাপাবোধ । বক্তৃত প্রদেশে অম্লত্ব, উষ্ণ, চাপা এবং কসিয়া ধরার ভাব অনুভূত হয় ; উদরের ডাইন পার্শ্বে পীজবার হাড়ের নীচে শূলুশ্বে বেদনা, দাঁড়াইলে বাঁহার বৃদ্ধি ; উদর, বিশেষতঃ নাস্তিপ্রদেশ, বেদনামুক্ত ; উদরে মোড়ানোর জ্বর বেদনা, পেট কামড়ানো, যাহার দক্ষণ রোগী বসিয়া সম্মুখ পানে বাঁকিয়া পড়িতে বাঁধা হয় ; (কষ্ট, কলোস, আইরিস, বিরেট্-আক্) ; বাকের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত না হইয়া কেবল কতক পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু নির্গত হয় (ব্রাই) ; উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত (আন্টি-ক্রুড্, ব্রাই, চারনা), বিশেষতঃ উদরোচ্চ প্রদেশ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরের নানা স্থানে দূষিত বায়ু (Flatus) ঘুরিয়া বেড়ায় (লাইকোপ, হিপ-সাল্ফ, পাল্) ; শুষ্কতার দিয়া জালা উৎপাদক, দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু নিঃসরণ বাঁহাতে পেটের বেদনার অনেক উপশম হয় ; দান্তের সময়, উহার পূর্বে এবং পরে পেটকামড়ানো (মার্ক্) এবং মল ত্যাগের সময় প্রবল শব্দে দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আগারিকাশ, পুজা) ; উদরে দুর্বল লোথ, যাহার দক্ষণ মনে হয় যেন উদরাময় হইবে (কাইমট্) ; তলপেট এবং শুষ্ক ভারিবোধ ; মলত্যাগের সময় কৌণ পাড়ার সময় অথবা শয়নাবস্থা হইতে উঠিবার সময়, স্পর্শ করিলে উদরের উপস্থিত পেশীতে বেদনার উল্লেখ হয় ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্ক উষ্ণ এবং ভারিবেশ ও উহাতে টাটানি ; শুষ্ক উষ্ণ এবং আলাহুতব (আস্) ; শুষ্ক দ্বারে চুলকানি এবং আগা (আস্, ক্যাঙ্ক, সাল্‌ক্) ; শুষ্ক দ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রের (Sphincter Ani) দুর্বলতা বা উহার শক্তির হ্রাস ; দিনের বেগা অনবরত বাহ্যের বেগ ; বাহ্যের বেগের দ্রুত রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; বাহ্যের বেগের দ্রুত প্রাতঃকালে উঠার সময় বিছানা হইতে তাড়াতাড়ি পারধানার বাইতে বাধ্য হওন্ (আগা-রিকাশ্, পডোফ্, কমেঙ্ক্, সাল্‌ক্) ; বাহ্যের বেগের সঙ্গে সঙ্গে মূত্র নির্গমন ; উদরাময়ের বেগের জ্বায় বাহ্যের বেগ, কিন্তু মল নির্গত না হইয়া কেবল উষ্ণ দূষিত বায়ু নির্গত হইয়া বেগের উপশম হয়, কিন্তু বায়ু নিঃসরণের পর আবার বাহ্যের বেগ পুনরায় স্মারন্ত হয় ও মনে হয় যেন শুষ্ক দ্বারের উপরিভাগে একখানি কাঠ লাগিয়া রহিয়াছে (আনাকার্ড্) ; মল ত্যাগের পর মনে হয় যেন শুষ্ক আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে (নাক্স-বম্) ; অসাড় বা অনিচ্ছাপূর্বক মল নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দূষিত বায়ু নিঃসরণ (কস-আস্) ; আহার বা পানের পরই বাহ্যের অত্যন্ত বেগ হয়, বাহার দ্রুত রোগী তাড়াতাড়ি পারধানার বাইতে বাধ্য হয় (কলোস্) ; বিনা বেগেই মল নির্গত হয় ; মল এবং মূত্র এক সঙ্গেই নির্গত হয় (হায়োস্) ; দান্তর সময় অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলহীন ; মল পরিমাণে অল্প, কটার আভাব, অর্ধ তরল ; মল উজ্জল হরিদ্রা বর্ণ (চেলিডন্), গোলাবির জ্বায় ; তেলার জ্বায় ; অলবৎ তরল ; ভিজা গোঁদের জ্বায় অধিক পরিমাণে স্লেয়া মলত্যাগ ; শুষ্ক দ্বারে অর্শের বলি বাহির হয় (ক্যাক্-কার্ক্, ল্যাক্, পাল্‌স্, সাইলিসি) বাহ্য আঙ্গুর ফলের জ্বায় ঝোপার ঝোপার প্রকাশ পায় (মিউর-আস্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক অনবরত ঠেলিয়া নামার জ্বায় অহুত হয় ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র ত্যাগের সময় মূত্র নালীতে আলাহুতব ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের তলপেটে বেদনা, বাহার দ্রুত মনে হয় ; বন রক্তস্রাব শীঘ্রই আরম্ভ হইবে (কলোফিলাম্, সিমিসিক্, পাল্‌স্, সাক্স-নরিয়া) ; জরায়ু প্রদেশে পূর্ণ এবং ভারিবেশ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমর এবং কুঁচকি প্রদেশে প্রসব বেদনার জ্বায় বেদনা, দাঁড়াইলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে, প্রচুর রক্তস্রাব (আহ্, আমন্-কার্ক্,

ক্যাক্স-কার্ণ, নাক্স-বন্স) ; খেত প্রদর এবং তদ্রূপ ঘোনিহার দিয়া রক্ত মিশ্রিত স্বেদ্য ভায় পদার্থ নির্গমন ও খেত প্রদর নিঃসরণের পূর্বে তল-পেটে শূল বেদনার ভায় বেদনা ।

প্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । কোমরে বাতের বেদনা এবং উহার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে শিরঃপীড়া ; বসিরা থাকিলে শুষ্ক হারের ঠিক উপরিতাণে চাপা এবং ভাবিবোধ, নড়া চড়াতে বাহার উপশম হয় ।

কবহার । আমাশয় ; উদরাময় ; অশ্রোপ ; পেটকামড়ানী ; জর-রুই জড়তা ; রক্তস্রাব ইত্যাদি অন্ত্রে আলোজ্ বাবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । পৃষ্ঠদেশে বেদনা (বেল, দিমিলিক, নাক্স-বন্স, পাল্‌স) ; অত্যন্ত বলক্ষয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষ (চায়না) ; বেদনাদি অলক্ষণ থাকে ; মোটা চর্কিযুক্ত শরীর এবং অগস বৃদ্ধ ব্যক্তি ; বৃদ্ধ বয়স । উষ্ণতা, উষ্ণ, তিজা বারুতে, প্রাতঃকালে, অপরাহ্নে এবং সন্ধ্যার সময় ; বহির্বারুতে, নড়া চড়াতে, দাঁড়াইলে এবং আহারের পর অন্ত্রের বৃদ্ধি এবং সন্ধ্যার সময় ; বহির্বারুতে, নড়া চড়াতে, দাঁড়াইলে এবং আহারের পর অন্ত্রের বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা প্রয়োগে, শীতকালে বা শীতল বাতাসে এবং দূষিত বারু (Flatus) নিঃসরণে অন্ত্রের উপশম ইত্যাদি আলোজের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ ।

সমন্বিত বিশিষ্ট ঔষধ । আলোজের কার্য্যের সঙ্গে ইন্ধনাম্, কলিনগনিয়া, নাক্স-বমিকা এবং সাল্‌কারের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ আছে । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক্, জেটুন, চায়না, কলোসিহ্, লাইকোপডিয়াম্, পডোক্সিলাম্ এবং পাল্‌গেটিনার কার্য্যের সাদৃশ আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । সাল্‌কার, মাষ্টার্ড (Mustard), বিনিগার, এবং বেজিটেবেল্‌ অসিড্‌স্ (Vegetable Acids) । ক্যান্ডার দ্বারা কতক-কণের ক্ষত উপশম হয় ।

ডাইলুশন বিচার । আমাশয় রোগে ৩, ৬ এবং ৩০ ডাইলুশনই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার ডানহাম্ (Dr. Dunham) এবং ডাক্তার ওয়েল্‌সের (Dr. Wells) মতে ইহার ২০০ ডাঃ দ্বারা অধিক উপকার

দর্শে । চিকিৎসার ফল দেখিয়া আমরা ডাক্তার ডান্হাম্ এবং ডাক্তার ওয়েল্‌স্ প্রভৃতি চিকিৎসক মহাশয়গণের উক্ত মতের পোষকতা করিতে পারি । অনেক কালের পুৰাতন আমাশয় রোগের চিকিৎসায় ২০০ ডাইলুশন ব্যবস্থা কবিতা অত্যন্ত ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যাইতে দেখা যায় । আবার অনেক সময় তরুণ রক্তামশয় রোগে পেটকামড়াণী এত প্রবল ও কষ্টকর হয়, যে কোন ঔষধ দ্বারাই উহার উপশম হয় না । এমতাবস্থায় আলোজ্ ২০০ ডাঃ, ৬ ফোঁটা মাত্রায়, ২১৩ মাত্রা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায় । এমনকি, অনেকের ১ মাত্রায়ই পেটকামড়াণী সারিয়া যাইতে দেখা যায় ।

আলুমিনা,—আলাম্

(ALUMINA,—ALUM)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত আলুমিনার গুঁড়া ক্রয় করিয়া উহার সঙ্গে যথা নিয়মে জ্বার অব্ মিক্ মিশাইয়া ওষু-
নততমিক ক্রম পর্য্যন্ত ইহা গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । গতি উৎপাদনের সহায়কারী নান্ন ইহা দ্বারা সোজাসোজী আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহার দরুণ পক্ষাঘাত উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু শৈথিল্যিক কিল্লী (মল্ল এবং যোনি দ্বারের শৈথিল্যিক কিল্লীই অধিক) ইহা দ্বারা বিশেষ রূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহার দরুণ উক্ত অংশের নিঃস-
রণের পরিমাণের হ্রাস হইয়া উহাতে অত্যন্ত শুষ্কতা অমুভূত হয় এবং তদ্রূপ উহাতে অধিক বা সামান্য পরিমাণে উত্তেজনাও হইতে পারে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । স্মরণ শক্তির দুর্বলতা বা হ্রাস (আঘ্ণা, আনাকাড্, ক্রিনাজ্, লাক্, মার্ক্, নেটাম্-মিউর, নাক্স-গঙ্, ফন্-আন্); সময় যেন আন্তে আন্তে কাটে (নাক্স-বন্); অসহ ক্লান্তিবোধ (অরাম্); মনের ভাব সকল

সময়ে এক রকম থাকে না, অর্থাৎ রোগী কোন কোন সময়ে আঁপনার উপর অত্যন্ত বিশ্বাস করে, আবার কখন বা একবারে ভীত হয়; সর্বদা চিড়্-চিড়্, বক্ বক্ করা (কাম্); এক গৌরেন্দী (ব্রাই, নাক্স-বন্, কাম্); মানসিক অবসন্নতা (পাল্); ভবিষ্যতের বিপদের আশঙ্কা (আনাকাড্, আর্, চিনিনাম্ সাল্, কাক্-কার্)।

মস্তক। মাথাঘোরা, যাঁহার দক্ষণ মনে হয় যেন চতুর্দিক দ্বারা বন্ধ চক্রাকারে ঘুরিতেছে (আর্গিকা, বেল, কোনারাম্, তাই, নাক্স-বন্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার বমনোদগে হইতে হইতে মূর্ছার ভাব (গোবি-লিবা); প্রাতঃকালে মাথাঘোরা (ফন্, নাইট্-ক্-আর্), চক্ষু মেলিলে মাথা ঘোরা (ল্যাক্); অচেতনতাব জ্ঞাব নিদ্রা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখ পানে টলিয়া পড়ার ভাব; মস্তিষ্কে স্ত্রী বিধানের জ্ঞায় প্রথমে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদগে; দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকিলে কপালে জ্বালাযুক্ত, বা চাপিয়া ধরাব জ্ঞায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণাভব, বহির্বাযুতে বাহার উপশম হয়; মাথার উপরিভাগে চিড়িক্ মাথার জ্ঞায় বা দপ্-দপিয়া বেদনা; আঁটা টুপী পরিলে যেকপ হয়, কপালে সেকপ চাপা বোধ।

চক্ষু। চক্ষে জ্বালা এবং চাপা বোধ (আর্); চক্ষে কম বা ঝাপসা দেখা, যাঁহার দক্ষণ রোগী চক্ষু বারম্বার মুছিয়া ফেলিতে বাধ্য হয় এবং চক্ষু বাহা মুছিয়া ফেলিলেই সারিয়া যায় (ক্রোকাশ্, পাল্); প্রদীপের আলোক যেন সূর্য্য বা চন্দ্ৰের বেষ্টক মণ্ডলেব জ্ঞায় মণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া অনুভূত হয়; ঘুম হইতে জাগিলে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে (আন্টি-ক্রুড্, সাইলিস, সাল্) এবং চক্ষু মেলিলে চক্ষে জ্বালাভব ও আলোক পানে তাকাইতে অশক্তি (একন্, বেল্, লাইকোপ্); চক্ষুর পাতা পুক হয় (পাল্, গ্রাফ্); চক্ষুর পাতা শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত।

কর্ণ। সন্ধ্যার সময় এক কান লালবর্ণ এবং উহাতে উষ্ণাভব; সন্ধ্যার সময় বা রাত্রিতে কানের মধ্যে স্ত্রী বিধানের জ্ঞায় বাতনা।

নাসিকা। দুই নাসাবন্ধের মধ্যবর্তী ছাঁড় ক্ষীণ, লালবর্ণ এবং স্পর্শনে বেদনাযুক্ত (আর্, মার্); নাকের বায়ু পাতাব ক্ষীণ এবং কঠিনতা; নাকের আগা দৃঢ়গত; নাসাবন্ধে ক্ষত (আন্টি-ক্রুড্,

অরাম্ গ্রাফ্, ক্যালী-বাই, নাইট্রিক্-অস্, পাল্‌স্) ; নাসিকার পুরাতন শৈল্পিক রোপ্, এবং তদ্রূপ নাসাবদ্ধে ব মধ্যে মরা চামড়ার জায় থোপা বা চুমটী বিশিষ্ট কঁত ও নাক দিগ্ হরিস্রা বর্ণের গাঢ় শ্রেণী নির্গমন (ব্যারাইটা-কার্ক্, গ্রাফ্, হিপ্-সাল্‌ফ্, ক্যালী-বাই, মার্ক্, পাল্‌স্) ।

মুখমণ্ডল । ডিমের লাল লাগিয়া শুকাইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মুখমণ্ডলে সেকপ্ কসিয়া বা চাপিয়া ধবাব জায় অন্তর্ভূত হওয়া (ব্যারাইটা-কার্ক্, ক্যালেনড্, গ্রাফ্, সাল্‌ফ্-অস্) । নিম্ন মাড়ির অনিচ্ছাপূর্বক আক্ষেপিক স্পন্দন বা সঞ্চালন ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁত যেন নড়ে এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক লম্বা হইয়াছে একপ্ অন্তর্ভূত হয় (কার্বো-অনিমেগ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-অস্) ; মুখে লালব অধিক সঞ্চাব, অগচ্ মুখে শুষ্কবোধ ; মাড়ি ক্ষীত এবং উহা স্ফোত রক্ত পড়া (মার্ক্, নাইট্রিক্-অস্) ; গলার মধ্য লালবর্ণ এবং ক্ষীত (বেল্, লাক্, মার্ক্) ; সন্ধার সময় গলার মধ্যে অত্যন্ত শুষ্কভব, বাহার দরুণ রোগী গলা খেকুব দিয়া বারম্বার গলার মধ্য পরিষ্কার কবিত্তে বাধ্য হয় ; প্রাতঃকাল এবং সন্ধার সময় গলার মধ্যে আঁটাল শ্লেষ্মাব সঞ্চাব (আমন্‌মিউব্, ক্যালী-বাই) ; এক-খানি কাঠের চৌচ বিবিধা থাকিলে সেকপ্ হয়, গলার মধ্যে সেকপ্ অন্তর্ভূত হয় (আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, নাইট্রিক্-অস্, হিপ্-সাল্‌ফ্) ; গিলিবীর সময় আচাববহা গলনালীর উপরিভাগ চইতে পাকস্থলী পর্যন্ত সঙ্কোচনের জায় অন্তর্ভূত হওয়া (লাইকোপ্) ; ডেলার জায় কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে সেকপ্ হয়, গলার মধ্যে সেকপ্ চাপা বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে টাটানি, শ্বশ্বশ্বে এবং শুষ্ক বোধ ।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা বা রুচী একবারেই থাকে না, (অস্, কাক্-কার্ক্, চায়না, নেট্রাম্-মিউর, সাল্‌ফ্) ; মাংসে অরুচি (আণিকা, কার্বো-পেজ্, গ্রাফ্, সাল্‌ফ্) ; যদ্যপি চা খড়ি, কাঠের কয়লা এবং এই প্রকার অন্ত্যন্ত প্রকারের অপাক কারক দ্রব্যে স্পৃহা ; টক্ উদগার উঠা (কার্বো-বেজ্, ফস্, নাস্-বম্, সাল্‌ফ্) ; বৃক্ জ্বালা ; পাকস্থলীর সঙ্কোচন এবং মোচড়ান যাগ্ আচাববহা গলনালী দিয়া গলার মধ্য পর্যন্ত বিস্তৃত

হয়। মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে উদরের ডাইন পার্শ্বে খেঁৎলিয়া বাগুয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ভ্রায় বেদনা এবং সোজা হইলে উক্ত প্রদেশে হঠাৎ বিধানের ভ্রায় বাতনা; অত্র বৃদ্ধিতে (Hernia) বেরূপ হয়, উদরের ডাইন পার্শ্বের আব্দোমিনেল্ রিংয়ের (Abdominal Ring) স্থানে সেরূপ বাটিয়া বা চাপিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা (কোকাস্, নাইটি ক্-আস্, নাক্স্-বম্) ।

মল । গুহের জড়তা (ক্যান্ফার, ওপিয়াম্, দিপিরা), বাহার দরূণ নরম মল ত্যাগ করার সময়ও অত্যন্ত কৌণ্ পাড়িতে হয় (কার্কে-বেজ্, চায়না); অঙ্গের মধ্যে অধিক মল সঞ্চিত না হইলে বাহ্যেব বেগ হয় না, অথবা মল ত্যাগের ক্ষমতাও থাকে না; গুহদ্বারে চুলকানি এবং জ্বালা (আস্, সিনা, গ্রীক্, সালক্); মল ত্যাগের পর গুহদ্বারে জ্বাল উঠিয়া যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহেব সঙ্কোচন এবং গুহদ্বারে বাটিয়া ধরা (নেট্রাম্ মিউর); মল ভেড়ার মলের ভ্রায় কঠিন গুটলে (ওপিয়াম্, প্লাঘাম্); মল ত্যাগের সময় গুহদ্বারে কর্তনবৎ বেদনা এবং তৎপর রক্ত পড়া (মার্ক্, নাক্স্-বম্); যে সকল জ্বীলোক শিশুগণকে স্তন দ্বন্দ্ব পান করার তাহাদিগের কোষ্ঠবদ্ধ (ওপিয়াম্, নাক্স্-বম্) ।

মূত্রৈযন্ত্র । মল ত্যাগের সময় কোণ্ পাড়া কালীন মূত্র নির্গমন, অথবা কোণ্ না পাড়িয়া রোগী মূত্র ত্যাগ কবিত্তে পারে না; মূত্রাধার এবং জননেদ্রিয়ে দুর্বল বোধ ।

জননেদ্রিয় । দিনের বেলায় জ্বীলোকেব পচুর পরিমাণে, (আগা-গ্রিকান্) ক্ষতকারক বা উগ্র স্বেতপ্রদব নিঃসরণ যাহা পায়েব পাড়া পর্য্যন্ত বহিয়া পড়ে; উগ্র, ক্ষতকারক স্বেত প্রদব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জননেদ্রিয়ে জ্বালাগুক্ত যাতনা; ঘোনিদ্বাণাদি ক্ষীত এবং ক্ষতযুক্ত চর্ম (কোনারাম্, আরোড্, ক্রিগাজ্, মার্ক্, কস্, পালস্), বাহার দরূণ সময় সময় অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয় এবং ঠাণ্ডা জল দ্বারা আক্রান্ত স্থান ধোয়াইয়া দিলে বাহার উপশম হয়; কষ্টকর স্বপ্ন রজ্জ্বশ্রাব এবং তদরূপ ফিকা রজ্জ্ব বিশিষ্ট রক্তশ্রাব (কস্); রজ্জ্বশ্রাবের পর শরীর এবং মন উভয়েরই অবসন্নতা (আবন্-কার্ক্, কার্কো-অনিমেস্, ককিউলাস্) ।

শ্বাসদ্বয় । ক্রমাগত গুণ্ গুণে শুক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে

বসন এবং স্বাস্থ্যের হওয়া ; স্নাত্তিতে শুষ্ক কাশি (সিবিসিক্, হায়োস্, লাইকোপ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্য শুষ্কানুভব ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্য এবং বুকে বেদনা ও অনিচ্ছাপূর্বক বা অসাড় সূত্র নির্গমন (কষ্ট্, কল্চ্) ; প্রতিদিন প্রাতঃকালে অনেকক্ষণ ধরিয়া শুষ্ক কাশি, অতি কষ্টে কতক পরিমাণে সাদা স্লেয়া নির্গত হইয়া বাহার শেষ হয় ; মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে উদরের বাম পার্শ্ব হইতে বুকের মধ্যভাগ পর্যন্ত স্থচী বিধানের জ্বাৰ বেদনা বা যাতনা ; কথা বলিলে বুকের টাটানি বৃদ্ধি পায় ; কোন ভারি দ্রব্য উঠাইলে বুকে টাটানির বৃদ্ধি বা টাটানির উদ্বেগ হয় (রাস্টক্) ।

পৃষ্ঠদেশ । খেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাৎদেশে সেরূপ বেদনা ; কোমর প্রদেশস্থ মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া তন্তু লোহ বিধাইলে যেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেরূপ যাতনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । পেশী ইত্যাদি খেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, কঙ্কের সন্ধিতে সেরূপ বেদনা, বাহ উপরের দিকে উঠাইলে বাহা অধিক অস্বস্ত হয় ; হাতের আঙ্গুলের নখের নীচে চর্ষণবৎ বেদনা । পায়ের আঙ্গুল লালবর্ণ হয় এবং চুলকায় (আগারিকাশ্) ; শরীরের নিম্নাংশে অত্যন্ত ভারিবোধ, বাহার দক্ষণ উহা সঞ্চালন করিতে অত্যন্ত কষ্ট অস্বস্ত হয় বা উহা একবারেই সঞ্চালন করা যায় না । চলিয়া বেড়ানোর সময় হেলিয়া টলিয়া পড়া বা পা কাঁপা, বাহার দক্ষণ রোগী বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয় ; সন্ধ্যার সময় উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ; দিনেব বেলা ভিন্ন বা চক্ষু না মেলিয়া রোগী চলিতে পারে না ; বসিয়া থাকিলে পায় ঝি ঝি ধরে বা একবারে অবশ ও অসাড় হয় ; বসিয়া থাকিলে পায় অত্যন্ত ক্লান্তি বা শ্রান্তিবোধ ; পা এবং উরুদেশে অনেকক্ষণ ধরিয়া কসিয়া ধরা, বাহার দক্ষণ মনে হয় যেন উহাতে খিল ধরিয়াছে এবং বাহা নিম্নদিকে বিস্তৃত হয় ; হাঁটু কাপে ; পায়ের ডিমে বারম্বার খিল ধরা ; চলিবার সময় পায়ের গোড়াড়ীতে (Heel) অবশবোধ ; অত্যন্ত কোমল এবং স্নীত হইলে যেরূপ হয়, পায়ের পাতার তলায় সেরূপ বেদনা (আণ্টি-ক্রুড্) ।

চর্ম্ম । সমুদয় শরীরে অসহ বেদনা, বিশেষতঃ শরীর উত্তপ্ত হইলে

বা বিছনায় শয়ন করিয়া থাকিলে ; যে পর্য্যন্ত রক্ত না পড়ে, রোগী সে পর্য্যন্ত শরীর চুলকায় এবং চুলকানের পর অত্যন্ত জ্বালায় উদ্বেক হয় (ক্রিমোটস্, মার্ক্, মেজিরিয়াম্, সাল্ফার) ; গায় শুক টেটারের ত্রায় (Tettary), চুলকানি বিশিষ্ট কুস্কুড়ী ।

নিদ্রা । নিদ্রা উদ্বেগযুক্ত এবং নিদ্রাবস্থায় গোলমালে বোধ ও স্বপ্ন দেখা ; চোবের বিষয় স্বপ্ন দেখা ।

ব্যবহার । পুৰাতন আঁকাবের অস্থখ, বিশেষতঃ বায়ুনলপ্রদাহ, আহারবহা গলনালীব উপরিভাগেব স্লেয়াজনিত অস্থখ ; শ্বেতপ্রদর এবং প্রমেহ রোগ ; কোষ্ঠবদ্ধ ; সীমাজনিত শূলবেদনা ; যকৃতের অস্থখ ; কসেরুকাব বিকৃতাংশ জনিত অস্থখ ; লোকোমটোর আটাক্সি (Locomotor Ataxy) নামক পক্ষাঘাত ; ক্লোরোসিস (Chlorosis) ; অরায়ু ভানব্রষ্ট হওয়া (Prolapsus Uteri) ইত্যাদি অস্থখে আনুগুণ্য ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত শ্রান্তি এবং অবসন্নবোধ, বাহ্যর দৰ্শন রোগী বসিষা পড়িতে বাধ্য হয় (চারনা, সাল্ফ) ; কোন প্রকারের প্রবল কঠিন ব্যায়াম চইয়া গেলে ঘেরুপ হয়, চলিবার সময় সেরুপ পা কাঁপে ; অলসবোধ বা গা মাটি মাটি করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শবীরের কম্পন (চারনা, সাল্ফ) ; কসেরুকা মজ্জার অস্থখের দৰ্শন পক্ষাঘাত ; রোগী চক্ষু বৃদ্ধিয়া চলিতে পারে না ; সর্কদা ক্লান্তিবোধ এবং নিদ্রার ভাব । জীর্ণ জীর্ণ শরীর, বৃদ্ধ বয়স ; শৈশবাবস্থা (কোষ্ঠবদ্ধ), যৌবনাবস্থায় (মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ) ; রোগের বারম্বার পুনরাক্রমণ । প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে, সন্ধ্যার সময়, দিনের বেলায় (শ্বেতপ্রদর) ; শীতকালে, অমাবস্তা পূর্ণিমা তিথিতে, একদিন অন্তর একদিন, নড়াচড়াতে, ঠাণ্ডা জ্বা খাইলে, গোল আলু খাইলে, মাংসের কোণ খাইলে অস্থখের বৃদ্ধি এবং বহির্বায়ুতে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, উষ্ণ জ্বা খাওয়ার সময় অস্থখের উপশম ইত্যাদি আনুগুণ্য কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আনুগুণ্য কার্যের সঙ্গে ব্যারাইটা-কার্ক্, প্রায়াম্ এবং কোনার্যামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । গুহের উপর ইহার কার্য অনেকটা বিরেটাম্ আনুগুণ্যের ত্রায় । এতদ্বির কোন

কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে অরাম্, গ্রাফাইটিস্, ব্রাইওনিয়া, ফেরাম্, ইপিকাকিউএনা, ল্যাকেসিস্, ফক্ষরাস্, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স-বমিকা, পাল্‌সেটিল্লা এবং সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ব্রাইওনিয়া, ক্যাম্ফার, ক্যামোমিলা, নাক্স বমিকা, ইপিকাকিউএনা ।

ডাইলুশন বিচার । ৬,১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই অধিক ব্যবহৃত হয় ।

আনাকার্ডিয়াম্ ওরিয়ান্টেল্,-(ভেলা গোটা),-আনাকার্ড্

(ANACARDIUM ORIENTALE,—ANAC.)

ভেলা গোটার বহির্দেশের খোসার মধ্যের কোষে যে এক প্রকার রস থাকে, তাহাই হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই রস দ্বারা রক্তকগণ কাপড়ে চিহ্ন দিয়া থাকে । এই রস বথা নিম্নে সুগার অব্‌ মিক্সের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহার আরোকও প্রস্তুত হইতে পারে ।

সাধারণ ক্রিয়া । জ্ঞান উৎপাদনের সহায়কারী ঝায়ুমণ্ডলে ইহার কুর্য্য অতি প্রবল, যদ্বারা ইহা মস্তিষ্ক এবং বিশেষ বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে অসন্ন করিয়া মস্তিষ্ক এবং সমুদয় ঝায়ু মণ্ডলীর দুর্বলতা উৎপাদন করে । চন্দ্রের উপরও ইহার কার্য্য অতি প্রবল ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । স্মরণ শক্তির অত্যন্ত দুর্বলতা বা হ্রাস (আগ্‌নাম্, আদ্রা, ক্রিয়াজ, লাক্, মার্ক্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-মফ্, ফস্-মাস্); মনের উদ্বেগ বা চিন্তা এবং ভবিষ্যতে কোন বিপদ ঘটিবে এরূপ আশঙ্কা (আস্, আলাম্, ক্যাক্-কার্ক্, চিনিনাম্-সাল্‌ফ্); শপথ করা এবং অভিশাপ দেওয়ার অনিবার্য্য ইচ্ছা (বিরেট্-আব্); অত্যন্ত খিট্‌খিট্‌ করা, রাগান্বিত হওয়া এবং প্রতিবাদ করার স্বভাব (ব্রাই, ক্যাম্, নাক্স-বম্, হিপ্-সাল্‌ফ্, ক্যালী-ক্লোরেট্);

রোগী মনে করে যেন তাহাকে ছুইটী ইচ্ছার পরিচালনা করিতেছে, বাহার একটীতে, একটী কার্য্য করিতে বলে, অপরটী উহা করিতে বারণ করে ; চলিবার সময় মনে হয় যেন এক ব্যক্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, বাহার দক্ষণ ভয়ের উপর হয় ; পৃথিবীর সমুদয় বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইচ্ছা এবং আপনার উপর এত অবিশ্বাস হয় যে, উহার দক্ষণ রোগীকে যে কার্য্য করিতে বলা যায় সে যেন তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিবে না তাহার একরূপ বিশ্বাস হয় ; ভ্রম (হায়োস্, ট্রামন) ।

মস্তক । সমুদয় জ্ঞানেঞ্জিরের দুর্বলতা ; মাথার উপরিভাগের বাম পার্শ্বে যেন একখানি কাঠের চৌচ বিধাইয়া রাখিয়াছে এরূপ অশুভূত হয় এবং তদক্ষর উক্ত স্থানে চাপাবোধ ; কালির সময় বা দীর্ঘ নিশ্বাস টানিবার সময় মাথার উপরিভাগে চাপিয়া ধরার জায় বেদনা ; কাঁটা মারিয়া রাখিলে বেরূপ হয়, কপালের দুই পার্শ্বে সেরূপ চাপিয়া ধরার জায় ঘৃণ্ণুশে বেদনা (আগারিকাম্, আর্পিকা, কফিয়া, ইগ্‌নেস্) ।

চক্ষু । ডাইন চক্ষুর কোটরের ঠিক উপরের কিনারায় ঘৃণ্ণুশে চাপাবোধ ; চক্ষে ঝাপসা বা অস্পষ্ট দেখা ; চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত ; সন্ধ্যার সময় প্রদীপের চতুর্দিক যেন সূর্য্য বা চন্দ্ৰের বেটকের জায় একটী বেটক দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া দৃষ্ট হয় ।

কর্ণ । ক্ষত হইলে বেরূপ হয়, দাঁতে দাঁতে চাপিলে বা কামড়াইলে কানে সেরূপ বেদনা ; কানে গুণ্ণ্ণ, গুণ্ণ্ণ, ভন্ ভন্ শব্দ হওয়া ।

নাসিকা । প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলে নাকে যেন সোলা পোড়ার গন্ধের জায় কালিনিক গন্ধ লাগে ; নাকে অনববত পাররা বা সুরগীর গুয়ের গন্ধের জায় গন্ধ লাগে, আপন গায়ের কাপড় সোঁকাইলে বাহা অধিক অশুভূত হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । সামান্য ঘরিলেই মাড়ি দিয়া রক্ত পড়ে ; মুখের মধ্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ফোকা গড়া (নাইট্রিক-অ্যাস্) ; মুখে কোনও স্বাদ থাকে না, নতুবা মুখে এবং আহারে অত্যন্ত বিশিষ্ট স্বাদ । টাচিয়া কেলিলে বেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ অশুভূত হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । মধ্যাহ্নে আহারের সময় সমুদয় উপদ্রব

বা লক্ষণ অদৃশ্য হয় এবং আহায়ের প্রায় ২ ঘণ্টা পর উহা পুনরায় আরম্ভ হয় ; হিজা, উদগার উঠা, বমনোদ্বেগ এবং বমন । একখানি চোঁচ বা কাঠের টুকরা অস্ত্রে মোচড়াইয়া বিঁধাইয়া দিলে যে রূপ হয়, নাভির চতুর্স্পর্শবর্তী স্থানে সেরূপ বেদনা বা বাতনা উদরে অনবরত গড়্, গড়্, কল কল শব্দ হওয়া (লাইকোপ্) ।

মল এবং মলদ্বার । বারবার অভ্যন্ত বাহ্যের বেগ, কিন্তু বারবার মল ভ্যাগের জন্য কোঁথ পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেগ কমিয়া যায় এবং মল একবারেই নির্গত হয় না ; শুধু যেন কোন শক্তি থাকে না এবং মনে হয় যেন শুধু একটি ডেলার জায় কোন কঠিন পদার্থ বা একখানি কাঠের টুকরা লাগিয়া থাকিয়া ওলুটার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে (আলোক্) ; শুধুর জড়তা, এমন কি সামান্য পরিমাণ মলও অতি কষ্টে নির্গত হয় (আলাম্) ।

শ্বাসযন্ত্র । একখানি ছিপি বা ডেলার জায় কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যে রূপ হয়, বুকের ডাইন পার্শ্বে সেরূপ ঘূর্ণঘূর্ণে চাপাবোধ ; হৃৎপ্রদেশে হৃদী বিধানের জায় প্রথর বেদনা, কোমরের পশ্চাৎদেশ পর্যন্ত বাহা বিস্তৃত হয় ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । বাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (রাস্টক্) ; বাম কন্ধাহিতে হৃদী বিধানের জায় ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনা, আন্তে আন্তে বাহা রোগীকে আক্রমণ করে ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । কোন একটা ভাগি বস্তুর হঠাৎ আঘাত লাগিলে যে রূপ হয়, বাম বাহুর মধ্যভাগে সেরূপ বেদনা ; হাতে অভ্যন্ত শুকাহুত্ব ; হাতের পাতা এবং হাতের আঙ্গুলের সন্ধিতে থিল ধরার জায় বাতনা । কসিয়া বন্ধনী (Bandage) বাঁধিয়া রাখিলে বা কসিয়া ধরিলে যে রূপ হয়, বসিয়া থাকিলে হাঁটুর সন্ধিতে সেরূপ বেদনা, বা হাঁটুর সন্ধি শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ; হাঁটুতে পক্ষাঘাতের জায় অশাড় এবং অবশবোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুতে ক্লান্তিবোধ এবং হাঁটু শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না, যাহার দরুণ রোগী চলিতে পারে না ; গোড়াডী (Heel) হইতে ডিম পর্যন্ত পায়ের সমুদয় অংশে সবিরাম আকারের থিল ধরার জায় কসিয়া ধরা ; চলিয়া বেড়াইবার সময় অথবা বসি অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে পায়ের ডিমে (খোড়ার) থিলধরা ; পাছার বাম দিকের পেশীতে

(Left Gluteal muscles) যেন একখানি কাঠ কুটির। রহিয়াছে এমন অস্থিত হয়; উরুদেশে কষ্টদায়ক ঘূর্ণ ঘূর্ণে রক্তের চাপাবোধ, থাকিয়া থাকিয়া, কখন কখন বাহার হঠাৎ উল্লেখ হয়; পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক হাড়ে কসিয়া ধরার জার কষ্টদায়ক বেদনা।

চর্ম। শরীরের স্থানে স্থানে দাঁদের জার সাদা কুসুড়ী বা দাগ পড়া; অত্যন্ত চুলকানি বিশিষ্ট কুসুড়ী; চর্মের চুলকানি, চুলকাইলে বাহার বৃদ্ধি হয়; গায় স্পর্শ জ্ঞান শূন্যতা সম্বলিত কুষ্ঠ রোগের (Anæsthetic Leprosy) জার কুসুড়ী।

ব্যবহার। নানা প্রকারের উষ্মতা; এই ঔষধের মনের প্রাকৃতিক লক্ষণ সম্বলিত নানা প্রকারের স্নায়বিক অস্থখ; জ্বপিশেষের অস্থখ; পেটের অস্থখ অনিহিত এবং স্নায়বিক শিরঃপীড়া; স্মরণ শক্তির দুর্বলতা, হ্রাস বা একবারে বিনাশ; আক্রান্ত স্থানে স্পর্শ জ্ঞান শূন্যতা সহ কুষ্ঠরোগ (Anæsthetic Leprosy); দাঁদের জার কোন কোন প্রকারের চর্মরোগ ইত্যাদিতে আনাকাডিরাম্ ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় শরীরের দুর্বলতা, বাহার দ্রুপ রোগী দ্বিবা রাত্রিই বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে চাহে (ককিউল); নীচের বয় হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের বয়ে উঠিবার সময় অবসরতা বা স্ক্রুঁর ভাব; একখানি কাঠের চৌচ বিঁধিয়া থাকিলে যেকোন হয়, শরীরের স্থানে স্থানে সেরূপ চাপিয়া ধরা বা ঘিঁষানের জার বেদনা বা যাতনা; যেন হয় যেন আক্রান্ত স্থান একটা লোহের নাগ বা লোহের পাত দিয়া কসিয়া বাঁধা রহিয়াছে; আক্রান্ত স্থানে পক্ষাঘাতের জার দুর্বলতা এবং কম্প-মান দুর্বলতা; হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস গায় সহ হয় না; সহজেই সর্দি লাগে (বেল); স্নায়বিক এবং হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত রোগী, বৃদ্ধ বয়সে, গর্ভাঘাতের এবং বাহাদিগের মনোঅস্থতা (Hypochondriasis) থাকে, ভাদাহিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রি হই প্রায় পর্যন্ত, বসি বা শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে অস্থখের বৃদ্ধি এবং রাত্রি হই প্রায়ের পর, দিনের বেলা, শয়ন করিয়া থাকিলে, অথবা বর্ণে অস্থখের উপশম ইত্যাদি আনাকাডিরামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। বস্তিকের উপর আনাকাউরিনের কার্য কক্ষরিক্, আসিড্ এবং জিকের হার। চর্মের উপর ইহার কার্য এপিস, ক্রোটন, রাস্টক্স, মেম্বিরিয়াম্ এবং আর্টিকার হার। এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে একোমাইট্, আসিনিক, ক্যালকেরিয়া, কার্বোনিকা, নাল্-মফাটা এবং নাল্ বমিকার কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। কফিয়া, ক্যাস্কার।

ডাইলুশন বিচার। ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্রবণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশে কখন কখন ২০০ ডাইলুশন দ্বারা অভ্যস্ত ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যায়।

ব্রোমিয়াম্,—ব্রোমিন্,—ব্রোমিন্.

(BROMIUM,—BROMINE,—BROM.)

কোন এক বিষম হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত ব্রোমিন্ ক্রম করিয়া উহার ১ ফেঁটা (মিনিম্), ২০৯ ফেঁটা (মিনিম্) চূর্ণান জলে দিশাইয়া ইহার ১ম শততমিক ডাইলুশন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ৩য় দশমিক ক্রম যথানিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়। ৪র্থ এবং ততোধিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে রেকটিকাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার প্রথম শততমিক ক্রমের আরোক চূর্ণান জলে প্রস্তুত হওয়ার দক্ষণ ইহা অনেক দিন ভাল থাকে না। অতএব উক্ত ক্রম আবশ্যক হইলে সদ্য সদ্য প্রস্তুত করিয়া লওয়া উচিত।

সাধারণ ক্রিয়া। ঐন্দ্রিয়িক বিলীল উপর, বিশেষতঃ ক্রীমবস্ত্রের ঐন্দ্রিয়িক বিলীল উপর, ইহার কার্য অতি প্রবল। বায়ুনলের উপরিভাগ বা কর্ণালীই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া উহা অভ্যস্ত প্রদাহযুক্ত হয় এবং উহাতে এক কৃত্রিম পর্দা উৎপন্ন হয়, যাহার দক্ষণ সপর্দা ঘুড়ী কাশি (Membranous croup) এবং ডিপ্‌থেরিয়া (Diphtheria) রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ইহা

কৃতকারক বিষের ভ্রায় কার্য্য করিয়া থাকে, বাহার রূপণ পাকস্থলীর প্রবল প্রদাহ হইয়া অত্যন্ত অবসন্নতা এবং চরম বা পতনাবস্থার (Collapse) লক্ষণাদিই প্রকাশ পায় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মানসিক পরিভ্রমের ইচ্ছা ।

মস্তক । শিরঃশীড়া ; সূর্য্যের উত্তাপে কপালে অত্যন্ত ভারি এবং চাপা বোধ, ছায়াতে বাহার উপশম হয় ; দুধ খাইলে শিরঃশীড়া ।

চক্ষু । ডাইন চক্ষু দিয়া জল পড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-নিঃসারক গ্রন্থি (Lachrymal Gland) ক্ষীতি ; বাম চক্ষুর মধ্য দিয়া স্ফী-বিধানের ভ্রায় বাতনা অমুভূত হওয়া ।

কর্ণ । বাম কর্ণমূলস্থ গ্রন্থির কঠিন ক্ষীতি বাহ্য স্পর্শনে উচ্চ বলিয়া অমুভূত হয় ; বাম কর্ণমূলস্থ গ্রন্থি পাকিয়া উহাতে পূঁথ হয়, উহার মুখ অত্যন্ত নির্মল হয়, উহা হইতে জলের ভ্রায় কৃতকারক কল্‌তানি পড়ে এবং উহাতে ক্ষীতি কঠিন থাকে ও কোন মতেই কমে না ; আরক্ত অরের পর কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থির ক্ষীতি ।

নাসিকা । প্রবল সর্দি ও ডাইন নাসারন্ধ্র বন্ধ হয়, উহাতে আপা গোড়া কত হয় ও তৎপর বাম নাসারন্ধ্র অক্রান্ত হয় ; নাক দিয়া প্রচুর তরল স্লেয়া নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি (একন্. জেল্‌স্.) ; অনেক দিন ধরিয়া অনিবার্য্য সর্দি ; নাকের মধ্যে এবং নাসারন্ধ্রের ধারে কতের ভ্রায় জালা এবং টাটানি (এইলাছ্., এগ্রাম, সিপা) ; নাক ক্ষীত এবং উহাতে কত, টাটানি ও মরা চামড়ার ভ্রায় চুম্‌টী পড়া বাহ্য তুলিয়া কেবিলে রক্ত পড়ে এবং বেদনাযুক্ত হয় (নাইট্রিক্-অ্যাস্.) ।

মুখমণ্ডল । সুখাকৃতি ধূসরের আভাযুক্ত মেটে রক্ত বিশিষ্ট ; মুখ মস্তকে বেন মাকড়ের জাল লাগিয়া রহিয়াছে এক্রণ অমুভূত ॥ (ব্যারাইটা-কার্ক, কার্লস্., গ্রাঙ্ক্.) ।

গলার মধ্য । গলার মধ্যে টাটিয়া কেলার ন্যায় অমুভূত হয় ; মুগ্‌গহ্বরের পশ্চাৎ ভাগ এবং আহারবহা গলনাগীর উপরিভাগের মৈমিক কিল্লীর ক্ষীতি ।

উদর । উদর ক্ষীভ ও বিস্তৃত এবং গুহ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ (অ্যালোজ্, আণিকা, চায়না) ।

মল এবং মলদ্বার । অর্শরোগ এবং উহার দরুণ গুহ্বারে অভ্যন্তর বেদনায়ুক্ত বনী বাহির হওরা, কিন্তু রক্ত পড়ে না (Blind Piles) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাল মলত্যাগ ।

জননেদ্রিয় । জীলোকের বোনিদ্বার দিয়া সর্জারে এবং উচ্চ শব্দ করিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণ (লাইকোপ্) ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব (আস্, ক্যালক্-কার্ক্, নাক্স-বন্) ; অভ্যন্তর উচ্ছল লগ্ন বর্ণের রজঃস্রাব (বেল্, ইপিকাক্) ; রক্ত বেদ আন্তে আন্তে চূয়াইয়া পড়ে এবং তদ্রূপে অভ্যন্তর নিস্তেজতা এবং বলহীন (কার্কো-আনিমেল্, চায়না), অথবা রজঃস্রাবের সময় রক্তের সঙ্গে পর্দার স্তায় ছেকড়া ছেকড়া পদার্থ নির্গমন (সাইক্রোমেন্) ; রজঃস্রাবের পূর্বে এবং রজঃস্রাবের সময় জরারূপে প্রবল সঙ্কোচক বেদনা, বাহ্য অনেক বগ্টা ব্যাপিয়া থাকে এবং যাহা সারিয়া গেলেও পেটে টাটানি থাকিয়া যায় ।

শ্বাস যন্ত্র । কণ্ঠনালী বা বায়ুনলের উপরিভাগে ঠাণ্ডা বোধ ; নিশ্বাস টানিবার সময় শীতবোধ ; কণ্ঠনালী বা বায়ুনলের উপরিভাগে আঁটাবোধ ; কণ্ঠনালী বা বায়ুনলীর পশ্চাদ্দেশে হৃদী বিধানের স্তায় অস্ব-ভূত হয় এবং লাল বা চোক গিলিবার সময় উহাতে আঁটাবোধ ; কণ্ঠনালী বা বায়ুনলীর উপরিভাগে টাচিয়া কেলা বা ছাল উঠিয়া বাওয়ার স্তায় অস্বভূত হয়, বাহ্য দরুণ সঙ্কায় সময় কাশিঃ উজ্জেক হয় (কার্কো-বেজ্) ; বায়ুনল বা উহার উপরিভাগে হৃৎ হৃদী, বাহ্য দরুণ কাশিঃ উজ্জেক হয় ; বায়ুনলীতে সঙ্কোচন অথবা বায়ুনলের উপর বেদ গলার মধোর চাপ পড়ে একপ্রণ অস্বভূত হয় ; অরভঙ্গ, বাহ্য দরুণ রোগী স্পষ্টরূপে কথা বলিতে পারে না ; অর শূভতা ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গিলিবার সময় বেদ হঠাৎ শ্বাসরোধ হইয়া আইসে ; নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং নিশ্বাসের ক্ষুদ্র ব্যাকুলতা ; সময়ে সময়ে সর্জারে গভীর নিশ্বাস টানিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে ; শ্বাসকষ্ট ; গভীর নিশ্বাস টানিতে অশক্তি ; মনে হয় বেদ শ্বাসনালী

গুলি ধুম বারি পরিপূর্ণ রহিয়াছে (ব্যারাইটা-কার্ক, নেট্রাম-বাস) ; ডাইন-ফুসুসই অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে ।

নিদ্রা । কান বয়েস কষ্ট যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত হাঁহিতোলা এবং নিদ্রাবল্য (অ্যান্টি-টার্ট) ।

চর্ম্ম । গলায় সম্মুখস্থিত থাইরয়েড্ গ্রন্থি (Thyroid Gland), অণ্ড-কোষ, হরাস্থির নিম্নস্থিত (Sub-maxillary Glands) ও কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থির ক্ষীতি এবং কঠিনতা (ব্যারাইটা-কার্ক, ক্যাঙ্ক-কার্ক, কোনারাম, আরোড্, প্রাক্, নেট্রাম-কার্ক) ; বাহ এবং মুখ মণ্ডলে ত্রণ (সাইলিসি) ।

ব্যবহার । বায়ুনল এবং কঠনালী বা বায়ুনলের উপরিভাগে প্রদাহ জনিত অশ্বখ ; কঠনালী প্রদাহ (Laryngitis) ; ফুংড়ীকাশি ; ডিপ-থিরিয়া ; বায়ুনলের প্লেথ্রা জনিত রোগ এবং ফুসুস প্রদাহ ; সপর্দা কষ্টকর রক্তস্রাব (Membranous Dysmenorrhœa) ; গলগণ্ড (Goitre) ; অণ্ড-কোষ, কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থি, হরাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির ক্ষীতি এবং কঠিনতা ইত্যাদি অশ্বখে ত্রোমিন ব্যবহার্য্য । ফুন্ডী কাশিতে স্পঞ্জিয়ার পর ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । বেদনা যন্ত্রণাদি দূরীভূত হইয়া গেলে অত্যন্ত দুর্বলতা এবং অলসবোধ ; বাহ বরফের ভ্রায় শীতল, অথবা কেবল সন্ধ্য বাহ বা হাত শীতল । সন্ধ্যাকাল হইতে রাত্রি ছই প্রহর পর্যন্ত অশ্বখের বৃদ্ধি ; বাস পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় ; নড়া চড়া, চলিয়া বেড়ান এবং বোড়ার চাপিয়া বেড়াইলে অশ্বখের উপশম ইত্যাদি ত্রোমিনের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আরোডিন, স্পঞ্জিয়া ।

প্রতিষেধক ঔষধ । বকস উৎপাদক ত্রব্য বা ঔষধ । ত্রোমিনের দৃক নোঁকিয়া বিযাক্ত হইলে আকোনিয়ার ধুম টানিলে বিশেষ উপকার দর্শে ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য় এবং ৩য় শতভাগিক ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসক ইহা ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমিক ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

কার্বো আনিমেলিস্,-কার্বো আনিমেল্

(CARBO ANIMALIS,—ANIMAL CHARCOAL,—CARB.-AN.)

গরুর চৰ্ম পোড়াইয়া উহা দ্বারা এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। যথানিয়মে অগ্নির অব- মিত্তের সঙ্গে কিশাইয়া ৩য় শতভাগিক ক্রম পর্য্যন্ত ইহার শুঁড়া প্রস্তুত হয়। ৩য় শতভাগিক ক্রমের শুঁড়া হইতে যথানিয়মে ইহার ৪র্থ শতভাগিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্রহি এবং পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় বস্ত্রের উপ-
রই ইহার কার্য্য সৰ্ব্বপ্রধান, বাহার দ্রুণ গ্রহি ওলি ক্ষীত, প্রদাহযুক্ত ও
কঠিন হয়, উহাতে ক্ষত হইয়া থাকে এবং পরিপাক সম্বন্ধীয় বস্ত্র আক্রান্ত হইয়া
অজীর্ণের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। গ্রহি ওলির কঠিনতা উৎপাদন
করিয়া তৎপরে উহাকে কঠিন কর্কট রোগে (Scirrhus Cancer) পরিণত
করা এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। একাকী থাকিবার ইচ্ছা (হারোস্, ইগ্নেনস্, রাস্টক্স);
সৰ্ব্বদা বিষমভাব এবং চিন্তাবৃত্ত থাকে; কথোপকথনে অনিচ্ছা; স্নানান্তে
চিন্তা বা মনের উষ্মগ, বাহার দ্রুণ মনে হয় যেন রক্ত গরম হইয়া ফুটিতেছে
এবং বাহার দ্রুণ রোগী শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়।

স্বস্তক। প্রাতঃকালে সাধারণ গোলমালে বোধ, বাহার দ্রুণ রোগী
জাগ্রিত কি নিদ্রিতাবস্থার আছে সে কিছুই স্থির করিতে পারে না; মাথা
হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকার পর মাথা খাড়া করিলে মাথাধোরা এবং
উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্যোগ; স্নানান্তে মাথাধ ভাবিবোধ এবং উহার সঙ্গে
সঙ্গে শ্রান্তিবোধ; মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে কপালে ভাবিবোধ, বাহার
দ্রুণ মনে হয় যেন চক্ষুর উপরিভাগে একটা ভারি দ্রব্য চাপিয়া রহিয়াছে;
সাধারণ উপরিভাগে বেদনা, বাহার দ্রুণ মনে হয় যেন মাথার হাড় ভাঙিয়া
থাক বত হইয়াছে; মাথার ডাইন পার্শ্বে ছিঁড়িয়া ফেলার ভাব বেদনা।

চক্ষু। চক্ষুর সম্মুখে যেন একখানি জাল স্থাপন রহিয়াছে, একরূপ
অস্বস্ত হয়।

কর্ণ । কানে গোলমেলে শুনা; রেংগী বুঝিজে পারে না শব্দ কোন দিক হইতে আসিতেছে ।

নাসিকা । প্রাতঃকালে নাক দিয়া রক্ত পড়া (ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক) এবং রক্তস্রাবের পূর্বে মাথাখোঁরা ও মাথার গোলমেলে বোধ; সর্দি এবং তন্দ্রাশয় গলার মধ্যে চাঁচিয়া কেগার জ্বর অমুতৃত হয়, সন্ধার সময়, স্নাত্তিতে এবং গিলিবার সময় বাহার বৃদ্ধি হয়; নাকের আগা লালবর্ণ এবং স্পর্শনে বেদনাবৃত্ত হয়; নাকের চর্মে বাটাংবোধ এবং উহা কাটিয়া যাওয়া; নাকের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রণ; নাকের আগার কঠিন, নীলের আভাবুক ক্ষীতি বা আব (Tumour) ।

মুখমণ্ডল । মুখাকৃতি কম, মাটির রঙের জ্বর; মুখ মণ্ডলের বিশর্প এবং মুখমণ্ডলে তাহার রঙের ক্ষুদ্রী; যুবা, গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট লোকের মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রণ; ওঠে ফোকা বা কাটা ।

মুখগহ্বরে এবং গলার মধ্যে । জিহ্বার আগার জালাহতব এবং মুখগহ্বরে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বর অমুতৃত (ক্যাক্-কার্ক, কলোস্); দাঁত নড়ে এবং কোন দ্রব্য চিবাইবার সময় দাঁতে অত্যন্ত বেদনা (মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্); প্রত্যহ প্রাতঃকালে মুখে তিক্তবাদ (নাক্স-বন্, ক্যাক্-কন্, পাল্‌স্); মুখের মধ্যে জালাবৃত্ত ফোকা । গলার মধ্যে স্লেয়ার স্ফার; বারবার থক্ থক্ করিয়া কানিয়া স্লেয়া তোলা; গলার মধ্যে জালা (জাল্, ক্যাহ্, ক্যান্); গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বর অমুতৃত হয়, বাহা পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং গিলিবার সময় বাহার বৃদ্ধি হয় না; বুক জালায় বেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ জালাহতব, আহারের পর বাহার উপশম হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । অনেককণ পূর্বে বাহা যাওয়া নিয়াছে তাহার স্থান বিশিষ্ট উদগার উঠা (অ্যাক্টিক্-কুড্, পাল্‌স্); বুকজালা (ক্যাক্-কন্); বাৎস যাওয়ার অনেককণ পর পর্যন্তও বমনোবেগ (কার্কো-বেজ্) । উদর অত্যন্ত ক্ষীত এবং বিস্তৃত; উদরে প্রচুর দ্বিভ বায়ুর স্ফার (জালাজ্, কার্কো-বেজ্, চায়না, লাইকোপ্); মিড্‌ফাইনে বেরূপ হয়, তলপেটের ডাইন পার্শ্বে সেরূপ বাতনা; শুষ্ক ঘরের ঠিক উপরিভাগের

মধ্য ও বোনিয়ার দিয়া শুষ্কতার পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলার ভায় বেদনা ; কঠিন আকারের বাগীতে পূঁষ হয়, অথবা কুচিকিংসার উহাতে কত হইয়া উহার ধার কাগচে হয় এবং উহা হইতে ছানার জলের ভায় ছেক্কা ছেক্কা পছির ভায় হর্নকুড় পদার্থ এবং পূঁষ নির্গত হয় ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্ক এবং শুষ্কধারে আলাহুতব (আস্, ক্যাক্, ক্যাপ্) ; শুষ্কতার দিয়া তরল আঁটাল পদার্থ চুয়াইয়া পড়া (সাই-লিসি) ; শুষ্কধারে অর্ধের অত্যন্ত ক্ষীত বলী, চলিবার সময় বাহাতে অত্যন্ত আলায় উদ্রেক হয় ; মল পরিমাণে অল্প এবং গোণে নির্গত হয় ; মল ভ্যাণের সময় রক্ত পড়ে ।

মূত্রযন্ত্র । প্রস্রাব কল্পার সময় মূত্রনাগীতে আলা এবং টাটানি (ক্যানারিস্-স্যাট্) ; রাত্রিতে বারবার প্রস্রাব করা ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের ধাতু নিঃসরণ ; পুরুষাঙ্গে হর্নলবোধ ; শারীরিক এবং মানসিক হর্নগতা ; পরমীর বা এবং বাগী (Syphilis and Buboes) । জীলোকের নিরমিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং প্রচুর রক্ত-প্রাব (আমন্-কার্, আস্, বোয়াল্, ক্যাক্-কার্, নাল্-বন্) ; রক্ত-প্রাবের সময় রোগী এত হর্নল হইয়া পড়ে যে উহার দক্ষণ সে কথা বলিতেও অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে (আলাস্, ককিউলাস্) ; খেতপ্রদর, বাহা বিছানার কাপড়ে লাগিয়া হরিদ্রাবর্ণ হয় (ক্রিয়াজ্) ; জরারুর জীবার কঠিনতা এবং উহাতে কত (কোনারাম্) এবং উহাতে আলাহুতব (আস্) ; জরাদ্ব্যুতে আলা আরম্ভ হইয়া উক্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; বস্তিকোটর এবং শুষ্কধারের ঠিক উপরিভাগে প্রস্রাব বেদনার ভায় বেদনা ; বোনিয়ার দিয়া চট্‌চটিয়া আঁঠা রক্ত মিশ্রিত ক্রেন নিঃসরণ, বাহার দক্ষণ রোগী অত্যন্ত হর্নল হইয়া পড়ে ; জরারুর কর্কট রোগ (Uterine Cancer) ; যে সকল জীলোক আপন সন্তানগণকে স্তন দুগ্ধ পান করার তাহারিগের স্তনে ছুরি বিধানের ভায় বেদনা, চাপিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; স্তনের স্থানে স্থানে কঠিন এক-বেদনাবৃত্ত হয় ; সন্তান প্রসবের পর একমাস কাল স্তন বিসর্পের ভায় ক্ষীত এবং প্রদাহযুক্ত থাকে (Erysipolatus Inflammation) ; স্তনে কোড়া বা আবেয় ভায় কঠিন ক্ষীতি এবং স্তনের চর্মে অসম ও চল্‌চলে ; স্তনে

আলায়ুক্র বেদনা; শুনে মলিন নীলের আভায়ুক্ত দাগ পড়ে; শুনে বেদনা, যাহার দরুণ বোগলের দিকে কসিয়া ধরার জায় অল্পভূত হয়; রাত্রিতে বর্ষা; মানসিক অবসন্নতা বা বিমর্ষতা; শুনের কিরাস্ কর্কট রোগ (Scirrhus Cancer of the breast) ।

ঋসযন্ত্র । প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলে গলার মধ্য এবং ঋসযন্ত্রে ছাল উঠিয়া বাওয়ার জায় অল্পভূত হয় ও শ্বরভঙ্গ (কষ্ট, কফিয়া, কস); শ্বরভঙ্গ, সন্ধ্যার সময় যাহার বৃদ্ধি হয় (কার্ণো-বেজ); থুণ্‌থুণে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কঠিনালী বা বায়ুনলের উপরিভাগ ও বৃকে আঁটাবোধ; অত্যন্ত প্রবল শুক কাশি, যাহার দরুণ উদর একরূপ আলোড়িত হয় যে উহার দরুণ মনে হয় যেন উদর খন্ডিয়া পড়িবে এবং যাহার দরুণ রোগী অল্প চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে বাধ্য হয়; যে পর্য্যন্ত শ্লেষাদি নির্গত না হয়, সে পর্য্যন্ত বৃকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয়; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলে এবং প্রায় সমুদয় দিনই উক্ত লক্ষণাদি বর্তমান থাকে; বৃকে আলায়ুক্র এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে চাপিয়া ধরার জায় বেদনা ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবার গ্রন্থি কঠিন, ক্ষীণ এবং বেদনা-যুক্ত (বোরাক্স, ক্যাক-কার্ক); ভাবিলে ঘেঁরুণ হয়, কোমরের পশ্চাৎ ভাগে সেরূপ চাপিয়া ধরা, বা কসিয়া ধরার জায় বেদনা এবং তদরুপ কোমর সঞ্চালনে অশক্তি; কোমরের পশ্চাৎভাগ দিয়া আড়াআড়ি কসিয়া ধরার জায় অত্যন্ত প্রবল বেদনা বাহা প্রত্যেকবার পা বাড়াইবার সময়ই অল্পভূত হয়; শুষ্ক ঘরের ঠিক উপরিভাগে মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁত-লিয়া বাওয়ার জায় বেদনা, স্পর্শ করিলে যাহাতে আঁলার উদ্রেক হয় ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । খেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে ঘেঁরুণ হয়, মনিবন্ধে সেরূপ বেদনা; প্রতিদিনই হাত অগাধ হয় । বামদা থাকিলে বাম কুঁচকিতে হৃদ্যবিধানের জায় বাতনা; পায়ের স্থানে স্থানে কড়া (Corns) পড়ে; দিনের বেলা পায়ের ডিম পর্য্যন্ত অগাধ হয়; পায়ের নিম্ন ভাগে টিবিয়া (Tibia) নামক হাড়ের নিকটবর্তী অংশে খিল ধরা; চলিবার সময় পায়ের ডিমে কসিয়া ধরার জায় অত্যন্ত কষ্টভূত ।

চর্ম্ম । মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্ৰণ এবং গালে লাল দাগ পড়া; শরী-

য়ের স্থানে স্থানে বিসর্পের জ্বর (Erysipelatous) ক্ষীতি এবং উহাকে আলায়ুক্ত বেদনা (আস) ।

নিদ্রা । পূর্বাঙ্কে নিদ্রাবেশ এবং হাঁহিতোলা ; ঘুমেরঘোরে নানা প্রকারের কান্ননিক বিষয়ে স্বপ্ন দেখা ।

ব্যবহার । গ্রন্থির বিবুদ্ধি, কঠিনতা এবং ক্ষত ; কিরাস্ ককটরোগ (Scirrhus Cancer) ; বিসর্প (Erysipelas) ; অজীর্ণ ; বায়ুনল প্রদাহ ; দন্তশূল ইত্যাদি অস্থখে ক্যুর্কো আনিমেলিস্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । দুর্বলতা এবং ক্ষুধার অভাব ; মাধায় গোলমলে বোধ ; বলক্ষয় ; রাত্রিতে অত্যন্ত দুর্গন্ধবুক্ত দুর্বলকারক স্বপ্ন (সাইলিসি) বাহা লাগিয়া বিছানার কাপড় বা গায়ের কাপড়ে হরিজ্ঞা-বর্ণের দাগ পড়ে ; গণ্ডমালা ধাতু ; প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যাব সময়, ঠাণ্ডা লাগিলে, বহির্বায়ুতে অস্থখেব বুদ্ধি ইত্যাদি কার্কো আনিমেলিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । ডাক্তার গারোস (Dr. Guereux) বলেন যে, রক্তঃস্রাবের সময় এবং উহার পর অলসবোধ এবং গা মাটি মাটি করা এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । গ্রন্থির উপর কার্কো আনিমেলিসের কার্য্য অনেকটা কোনায়াস্ এবং হাইড্রাষ্টিসের জ্ঞায় । এতদ্বিন্ন অস্ত্রান্ত বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক, ক্যাকেরিয়া কার্কোনিকা, কার্কো বেজিটেবিলিস্ এবং নাক্স-বমিকার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আর্সিনিক, ক্যান্কার, নাক্স-বমিক, সূরা ।

ডাইলুশন বিচার । ডাক্তার ড্রুরি (Dr. Drury) মতে স্ট্রীলো-কের সন্তান প্রসবের পর দুর্গন্ধবুক্ত ক্লেদ (Fetid Lochia) নিঃসরণে, ১২ হইতে ৩০ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । রাত্রিতে দুর্গন্ধবুক্ত স্বপ্নের পক্ষেও ডাক্তার আলেনের (Dr. Allen) মতে উক্ত দুই ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । ১২ হইতে ৩০ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

গ্লোনয়েন্,—গ্লোন (GLONOINE,—GLON.)

কোন এক বিষক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধানয় হইতে আদত গ্লোনয়েন্ ক্রয় করিয়া উহার ১ ভাগ, ২ ভাগ আব্‌সোলিউট আকোহলে (Absolute Alcohol) মিশাইয়া ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এরূপ ২য়, ৩য় এবং ততোধিক ডাইলুশনও আব্‌সোলিউট আকোহলে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মেডুলা অবলংগেটা (Medulla Oblongata), নিউমোগ্যাস্ট্রিক নার্ভ (Pneumogastric nerve) এবং রক্তবহানালীর কার্যের শাসনকারী নার্ভস (Vasomotor nerves) উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দ্রুপ মস্তিকে প্রবল রক্তাধিক্য এবং স্থম্পন্দন হয়। অনেক সময় সূর্য্যাস্রোতে (Sunstroke) যে প্রকার হয়, সূর্য্যের উত্তাপ লাগিয়া মস্তিক আক্রান্ত হওয়ার সেরূপ লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে, অথচ জ্বর এবং প্রদাহ ইত্যাদি যে প্রকার লক্ষণ বেলাডোনা এবং একোনাইট দ্বারা বিঘাঙ্ক হইলে প্রকাশ পায়, সেরূপ লক্ষণাদি প্রকাশ পায় না। মস্তিকে পূর্ববোধ এবং উহাতে দন্দপানি উৎপাদন করা এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। পড়িয়া বাইরা অচেতন হওয়া এবং পর্যায়ক্রমে স্থম্পন্দন ও মস্তিকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; মনে এলো মেলো ভাব (ব্যাণ্ট, জেল্‌স, কস-থাস্‌); রোগী বলিতে পারে না সে কোথায় ছিল; জানা পথ বা সজ্ঞাবোধ অজ্ঞানা বলিয়া অহত্ব হয়; বাড়িতে বাওয়ার রাস্তা অত্যন্ত লম্বা বলিয়া অহত্ব হয়; সড়কের কোন পার্শ্বে বাস করে রোগী যেন তাহা ভুলিয়া যায়।

মস্তক। মাথাঘোরা, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে বা মাথা নাড়িলে যাবার বুদ্ধি হয় (ব্রাই); বহির্বার্ত্তে মাথাঘোরার বুদ্ধি; মাথা অত্যন্ত বড় বলিয়া অহত্ব হয় (আর্জেন্ট-নাইট্রিক্‌, বোবিষ্টা, সিডিসিক্‌-

জিজিবার) ; মাথার পূর্ববোধ ; মাথার মধ্যে স্পষ্ট দণ্ডপানি (বেল) ; মাথার দণ্ডপানি, কিন্তু বেদনা থাকে না ; মাথার বেন রক্ত উঠিতেছে একরূপ অশুভ হই (বেল) ; নাক, চক্ষুর উপরিভাগ এবং কানের পশ্চাৎ-ভাগে কসিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা ও তৎপর গলার মধ্যে আঁটিয়া ধরার জ্বাৰ অশুভ হই ; মাথার হাড় যেন স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট এবং মস্তিষ্ক যেন মাথার হাড় ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে চাহে একরূপ অশুভ হই (সিমি-সিফ) ; জংপিণ্ডের অভ্যন্তর প্রবল দণ্ডপানি এবং সমুদয় শরীরের লাকানি (দণ্ডপানি) স্পষ্ট অশুভ হই ; সমুদয় মাথার টাটানি ; রোগী মাথা ঝাকিতে ভয় খায়, কারণ সে মনে করে মাথা ঝাকিলে তাহার মাথা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে ; মাথার দণ্ডপানি ; কপালে দণ্ডপানি ; কপালের পার্শ্বে দণ্ডপানি ; মাথার উপরিভাগে দণ্ডপানি ; মাথার পশ্চাৎভাগে দণ্ডপানি, নড়া চড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয় (ব্রাই) এবং স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে, শরন করিয়া থাকিলে এবং চাপিয়া ধরিলে যাহার উপশম হয় (বেল) ; মস্তিষ্কের মধ্যে যেন কেহ কেহ শব্দ হয়, রোগী একরূপ অশুভক করে ; নাড়ীর প্রত্যেকবার স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন মাথার ধাক্কা লাগে ; মাথার বা মস্তিষ্কে চেঁচি খেলার জ্বাৰ আন্দোলন বা আন্দোলন (চায়না) ; কপালের দুই পার্শ্বস্থিত ধমনির দণ্ডপানি এবং স্ফীতি ও উত্তাপে হাত বুলাইলে উহা তার বা স্ততার জ্বাৰ অশুভ হই (বেল) ; মাথার পশ্চাৎ-ভাগে প্রথম বেদনা বাহা চক্ষু এবং কপালের দুই পার্শ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ; জ্বীলোকের রক্তস্রাবের সময় মাথাধরা এবং মাথার দণ্ডপানি করা, অথবা রক্তস্রাবের পরিস্রবর্ত্তে মাথা ধরা এবং মাথা দণ্ডপানি করা (চায়না) ; মাথা ঝাকিলে মাথা ধরার বৃদ্ধি ; নড়াচড়াতে মাথাধরার বৃদ্ধি (ব্রাই) ; সূর্য্যের উত্তাপে মাথা ধরার বৃদ্ধি (বেল, নেট্রাম্-কার্ক) ; বহির্বাণ্ডে এবং চাপিয়া ধরিলে মাথা ধরার উপশম ।

চক্ষু । চক্ষুর সম্মুখে আগুনের শিখা এবং কপার জ্বাৰ দেখিতে পাওয়া যায় (বেল, সাইক্লয়েন) ; নাড়ীর প্রত্যেক বার স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে যেন চক্ষুস্পর্শস্থ বস্তুগুলি নাচে ; চক্ষু চাপিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা, যাহার দ্বন্দ্ব বনে হয় যেন চক্ষু উহার কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িবে ; চক্ষু

লালবর্ণ, কোটিরের বহির্দিকে বহির্গত এবং পাগলের ভ্রার ভাববিশিষ্ট (বেল্, হায়োস) ; চক্ষুর ভ্রারা বিস্তৃত এবং উপরের দিকে উল্টান বা ঘুরান (বেল্) ।

কর্ণ । বধিরতা, মনে হয় যেন কান বন্ধ হইয়া রহিয়াছে (কোনা-রাম) ; কানে টন্ টন্ শব্দ হয় এবং হুংপিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দন শব্দ যেন কানে শুনা যায় ।

মুখমণ্ডল । গরবের সময়, সূর্য্যাস্ত (Sunstroke) এবং মস্তিকে রক্তাবরোধের সময় মুখমণ্ডল লিট্টা ; মুখমণ্ডল জ্বরজ, টল্টলে এবং উচ্চ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ বাহা বারবার হয় এবং বারবার যায় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । সমুদয় দীতেই দগ্ধপিত্তা বেদনা । গলার মধ্য এবং কোমল ভালুকার চুনকানি ; গলার মধ্য ক্ষীত হইতেছে এরূপ অনুভূত হয় ।

পাকস্থলী । মস্তিকে রক্তাধিক্য, রক্তাবরোধ এবং সূর্য্যাস্তের (Sunstroke) আক্রমণ কালীন বমনোবেগ বা বমন ; পাকস্থলীতে অবসন্ন-বোধ এবং উহাতে দগ্ধপানি ।

জ্ঞানেন্দ্রিয় । ত্রীলোকের রজঃস্রাব না হইয়া উহার পরিবর্তে মস্তিকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; মুখমণ্ডল লিট্টা বা ফিফা ; উচ্চ বরে অনুভবের বৃদ্ধি ; মুচ্ছা এবং মাথার দগ্ধপানি ; শেষ রজঃরোধ হওয়ার সময়, মাথার দমকা উচ্ছাস্তব, চাপাবোধ, বমনোবেগ, জ্ঞান বহিত হওয়া, মাথাধরা এবং পারের পাতার ক্ষীতি ; মুখমণ্ডলের পেশীর যুগীরোগেজ্জ ভ্রার আক্ষেপ ; অচেতনতা ; মুখমণ্ডল উচ্ছল লালবর্ণ, ক্ষীত এবং টল্টলে ; নাড়ী পূর্ণ এবং কঠিন, যুর পরিমাণে অধিক এবং আল্‌বুমেন্ (Albumen) বিশিষ্ট ।

শ্বাসযন্ত্র । দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণের অত্যন্ত ইচ্ছা ; বৃক্ক আঁটা এবং কষ্টানুভব ।

হুংপিণ্ড এবং নাড়ী । হুংপিণ্ডের প্রবল দগ্ধপানি এবং সমুদয় শরীরের স্পষ্ট দগ্ধপানি বা স্পন্দন ; হুংপিণ্ডের স্পষ্ট প্রবল স্পন্দন (স্পাইজেল) ; নাড়ী অত্যন্ত ক্ষতগামী এবং পর্য্যায়ক্রমে উঠে এবং পড়ে ;

স্বর্ঘ্যাঘাতে নাড়ী অত্যন্ত দুর্বল এবং মৃদু ; হৃৎপিণ্ডের কঠকর স্পন্দন এবং তদ্রূপ হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত কষ্টানুভব ; হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত প্রথর বেদনা ; শয়নাবস্থায় হৃৎপ্রদেশে বিভ্রালের গগার শব্দের জ্ঞান ঘড়, ঘড়, শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী অসম (Intermittent) হওয়া ।

গ্রীবা । গ্রীবায় চতুর্দিকে আঁটাবোধ ; গ্রীবা হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত উষ্ণানুভব ; সমুদয় মেরুদণ্ডে বেদনা ।

হৃদয় । সমুদয় শরীর উষ্ণ ; গায় দমকা উষ্ণানুভব ; উষ্ণতা যেন শরীরের নিম্নদিক হইতে উর্দ্ধদিকে চেউয়ের জায় উঠে বা বিস্তৃত হয় ; প্রচুর বর্ষা বাহা মুখমণ্ডল এবং বুকেই অধিক প্রকাশ পায় ।

ব্যবহার । স্বর্ঘ্যের উত্তাপ গায় লাগা জনিত অসুখ (বেল, নেট্রাম্-কার্ক) ; মানসিক উত্তেজনা, ভয় ইত্যাদি জনিত অসুখ ; কোন প্রকারের আঘাত প্রাপ্ত হওয়া জনিত অসুখ ; স্বর্ঘ্যাঘাত ; মৃতবৎ মূর্ছা ; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ; মাথাধরা ; মস্তিষ্কের শোথ ; তৃণীর জ্বর আকোপ ; জীলোকের রক্তঃস্রাব রক্ত হওয়ার দরূপ মাথাধরা ইত্যাদি অসুখে গ্লোনয়েন্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলক্ষয় (আর্স্, ব্রাই, চারনা, কস) ; সমুদয় শরীরে বেদনাহীন দগ্ধপানি (আণ্টি-ফ্রুড্, পাল্‌স্, সাইলিসি, সিপিয়া, লিক্) ; সামান্য কারণেই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ; নড়া চড়া, মদ্যপান, আক্রান্ত অঙ্গ নাড়িলে, ঝাকিলে বা উহাতে হাত বুলাইলে অসুখের বৃদ্ধি ও রক্তিতে এবং বহির্জীৱনে অসুখের উপশম ইত্যাদি গ্লোনয়েন্‌র কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । মস্তিষ্কের উপর গ্লোনয়েন্‌র কার্য্য অনেকটা আমিল্‌ নাইটেট্‌ এবং হামামেলিসের জায় । এতদ্ভিন্ন ইহার কার্য্যের সঙ্গে একোনাইট্‌, বেলানডোনা, ব্রোমিন্‌, ব্রাইওনিয়া, ককিয়া, নেট্রাম্-কার্ক্‌, নাজ্‌-বমিকা এবং ট্রায়োনিরায়ের কার্য্যেরও সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । একোনাইট্‌, ক্যান্‌ফার, ককিয়া, নাজ্‌-বমিকা ।

ডাইনুশন বিচার । ৩,৬ এবং ১২ দশমিক ক্রমই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার হিউজ্‌ (Dr. Hughes) বলেন যে, এই ঔষধের ১ম

এবং ২য় দশমিক ডাইলুশনও ব্যবহার করা বাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা দ্বারা রোগের লক্ষণাদির বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা থাকে ।

হেলিবোরাস্ নাইজার,—হেলিবোর

(HELLEBORUS NIGER,—HELLEBOR)

ইউরোপের মধ্য প্রদেশের নিম্ন পর্বতাদিতে এই গাছ জন্মে । বাগানাদিতেও ইহার চাষ হইয়া থাকে । ইহার কাঁচা টাটকা মূল বা শিকড় যথা নিয়মে প্রেক্স্পিরিটে তিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । মূত্রকোষ এবং স্নায়ক বিস্তার (Serous membranes) উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ মস্তিষ্ক, বক্ষ, অস্ত্র বেষ্ট বিস্তার এবং কৌষিক বিস্তারিত শোথের স্তায় দূষিত জলীয় পদার্থের সঞ্চায় হয় । পরিণাক কার্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদি প্রবলরূপে আক্রান্ত হইয়া উহা প্রদাহ-যুক্ত হইতে পারে । পাকস্থলী এবং অরই এই প্রকার প্রদাহ দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে । নিউমোগ্যাস্ট্রিক নার্ভ (Pneumogastric nerve) আক্রান্ত হওয়ার দরুণ নিবাস প্রবাসের ব্যাঘাত জন্মে এবং হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয় । মস্তিষ্ক ও কলিকতা স্নায়ুর উপর কার্যাবশতঃ মস্তিষ্কের এবং সার্কানিক পক্ষাঘাত হইতে পারে । মস্তিষ্কের শোথে যখন মস্তিষ্ক সিরাম (Serum) নামক কেণবৎ পদার্থের সঞ্চায় আরম্ভ হয়, তখন এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । নিম্নরূপ ভাবে বোকার স্তায় অবসর হইয়া থাকা; স্পর্শ জ্ঞান রহিততা (ওপিয়াম); অত্যন্ত চিন্তা এবং মনের উবেগ; স্তম্ভহার (Melancholia) এবং তদরূপ সর্বদা নিম্নরূপ ভাবে থাকা (ইগ্নেন্স); সর্বদা বাড়ীতে থাকার ইচ্ছা (ক্যাপ্স); কোন কার্য করিতে হইলে অনেককণ পূর্ব হইতে বিশেষরূপ চিন্তা না করিয়া দ্বৈধী কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না অথবা পেশীগুলি আপন কার্য করে না ।

মস্তক । মাথার ডিম্বা ও তারি বোধ ; মাথার গভীরতম অংশে উচ্চাভূতব ; মোহকাইয়া পড়িলে বা খেঁতলিয়া গেলে যে রূপ হয়, মাথার সেরূপ টাটানি (কুপ্রমি), বিশেষতঃ মাথার পশ্চাৎভাগে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অবসন্নতা, মাথা হেট করিয়া উপড় হইলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; মাথার পশ্চাৎভাগে বেদনা ; অবসন্নতা ; মাথার উচ্চ এবং তারিবোধ (ওপিয়াম) ; বালিশের মধ্যে মাথা খুসিয়া দেওয়া (এপিস) ; দিবা রাত্রি মাথা চালা বা ঘুরাণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কৌখানি বা কৌকানি ; শরীর ঠাণ্ডা ; মস্তিষ্কের শোধ ; আরক্ত অরের পর মস্তিষ্কের শোধ ।

চক্ষু । চক্ষে প্রদাহ থাকে সঙ্গেও চক্ষে আলোক লাগে বা আলোক নহে হয় না ; চক্ষুর তারা বিস্তৃত (এইলাস্, বেল, হারোস্, ট্রামন্) ; চক্ষে আলোকজ্ঞান থাকে না (সিকুটা, ওপিয়াম্, হারোস্) ; চক্ষুর গোলক উপরের দিকে উন্টান ; টেরাচক্ষু ।

কর্ণ । কানের মধ্যে সোঁ সোঁ, টন্ টন্ শব্দ হওয়া ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা, শোথের জ্বাৰ ফীত, টঙ্গ-টলে ও বিকৃত ।

নাসিকা । ঘ্রাণ থাকিলে বা ঘ্রমের দক্ষণ জ্বল পড়িলে বেরূপ হয়, নাগারক্ক সেরূপ শুক এবং মরলাযুক্ত বলিয়া অগ্রভূত হয় ; রোগী বায়বার নাক রগড়ার ।

মুখগহ্বর । জিহ্বা অত্যন্ত শুক, অবশ বা অসাড় এবং ফীত ; মুখে ঘা (বোরাজ্, মার্ক্, হিপ্-গাল্ফ) ; নিম্ন মাড়ি নিম্নদিকে জুলিয়া পড়ে (মিউর-আস্) ; সর্কদা চর্কণ করার জ্বাৰ মাড়ির সঞ্চালন ; সর্কদা দাঁতে দাঁতে কামড়ান (সিকুটা) ; মুখগহ্বর এবং তালুকা শুক ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গিলিবার অস্ত্র মুখ সঞ্চালনের সময় তালুকার চাঁটিয়া ফেলার জ্বাৰ বা কর্তনবৎ বেদনা বা বাতনা ।

পাকস্থলী এবং উদর । বমনোদ্বেষ্ট এবং বমন (মার্কি-টার্ট, ইপিকাক্) ; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন ; সবুজের আভাযুক্ত কাল্পে পদার্থ বমন ; পাকস্থলীর মধ্যে পূর্ণাবাধ এবং উহার ফীতি ও বিস্তৃতি ; রোগী অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত শীতল জল পান করে, চামচা কামড়ার

কিন্তু সে অচেতনাবস্থায় থাকে । উদরের অত্যন্ত ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি (ক্যাম) ; অল্প জলে পরিপূর্ণ থাকিলে ঘেৰুপ হয়, উদরে সেরুপ গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হয় (ক্রোটন) ; পেট কামড়ানি বা পেটে চিন্‌চিনে বেদনা (বেল্, কলোস) ; অত্যন্ত দুর্বলতা, মুখাকৃতি বসিয়া যায়, মুখমণ্ডল শিটা, ঠাণ্ডা এবং চট্‌চটিয়া আঠা বর্ষ দ্বারা আবৃত ও নাড়ী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম ।

মল । কেবল পরিষ্কার চট্‌চটিয়া আঠা বর্ষহীন প্রেয়া তেব (কল্‌চ, রাস্‌টল), মল সাদা চট্‌চটিয়া আঠা ; বারম্বার কষ্টদায়ক বাহের বেগ এবং কোথপাড়া ।

মূত্রযন্ত্র । বারম্বার প্রেয়াবের বেগ এবং অতি অল্পপরিমাণে মূত্র ত্যাগ (একন্, এপিস্, ক্যাম্, কলোস্, ডিজিট্) ; মূত্র পরিমাণে অল্প এবং কাল্‌চে (কল্‌চ), শুঁড়ান কাকির স্তায়, পরিমাণে অধিক ; মূত্রাধার অত্যন্ত ক্ষীত এবং বিস্তৃত হয় ; মূত্রাধারের পৈশীক অংশের জড়তার দরুণ মূত্রাবরোধ ।

শ্বাসযন্ত্র । বুকে সমুচিত বা অঁটা বোধ, বাহার দরুণ রোগী নিশ্বাস প্রেয়াসে অত্যন্ত কষ্টানুভব করে ও তাহার শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয়, সে হা করিয়া নিশ্বাস প্রেয়াসের প্রেয়াস পায় এবং সে বিছানার হেলান দিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; বক্ষশোধ (আস্) ।

নাড়ী । নাড়ী দ্রুতগামী, ক্ষুদ্র এবং কম্পমান ; নাড়ী বৃহৎগতি বিশিষ্ট (ডিজিট) ; স্তব্ধের শোধে নাড়ী অসম (Intermittent) ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । কঁচকি বা উদর সন্ধিতে সূচীবিধানের স্তায় অল্প ভুত হয় ; পায়ের শোধের স্তায় ক্ষীতি ।

নিদ্রা । অজ্ঞানবৎ নিদ্রা এবং এই অবস্থায় বারম্বার চীৎকার করিয়া কঁদিয়া বা লাকাইয়া উঠা ।

জ্বর । সমুদয় শরীরে শীত বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত এবং পায়ের পাঁজা শীতল (ক্যাম্‌ফার) ; শীত এবং কম্প ; গা কঁটা দেওয়া বা রোমা-কিত হওয়া ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং সন্ধিতে বেদনা ; গায় আগা বৃদ্ধ উষ্ণতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরিক শীতবোধ ও জ্বলাদি পানে অনিচ্ছা ; রোগী একবারে অধিক পরিমাণে জ্বলাদি পান করিতে পারে না ; সন্ধ্যায়

সময় বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে শীতবোধ ; ঘৰ্ম ; চট্‌চটয়া ঘৰ্ম ; শেষ স্নাত্তিতে ঘৰ্ম, বাহার লক্ষণ শরীরের সজ্ঞাপের কোনও পরিবর্তন হয় না ।

বাবহার । শোথ এবং শোথ সম্বলিত বা শোথ জনিত অস্থি ; মস্তিষ্ক, বক্ষ এবং উদরের শোথ ; হঠাৎ ক্ষীতি ; সার্ভাসিক শোথ ; আরক্ত জ্বর, মূত্রকোষ প্রদাহ এবং সবিরাম বা পাল্লা জরের পর শোথ ; তন্দ্রাব্যম্ব (Melancholia) ; জ্ঞানশূন্য হওয়া ; বাস্তবীতে থাকা বা বাস্তবতার প্রবল ইচ্ছা (Nostalgia) ; স্বায়মূল ; আক্কেপ (Convulsions) ; মৃগীরোগ ; মূত্রকোষ প্রদাহ ; রক্তাক্ততা ইত্যাদি অন্তর্থে হেলিবোরাস্ বাবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । পেগীর আক্কেপিক স্পন্দন (আগারিকান্, সিকুটা, কুপ্রাম্) ; বিছানা হইতে গড়াইয়া পড়া (মিউয়-আস্) ; আক্কেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যস্ত শীত বোধ ; যে সকল জীলোক শিশুকে স্তনদ্বারা পান করায়, তাহাদিগের আক্কেপ ; অত্যন্ত দুর্বলতা (আস্, ফেরাম্, ফস্) ; হাত পা শুটাইয়া চীৎভাবে শব্দ করিয়া থাকা ; হঠাৎ শোথের দ্বারা ক্ষীতি ; দুর্বল গুণমালা ধাতুবিষিষ্ট শিশু বা বালক, বালিকা-গণের অন্তর্ধ ; শিশুগণের দাঁত উঠার সময় অন্তর্ধ (মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে) ইত্যাদি হেলিবোরাসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । হেলিবোরাসের কার্য্যের সঙ্গে এপিস্, আপোসিনাম্, ক্যাস্‌হারিস্ এবং ক্যালী ব্রোমেটামের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক, বেলাডোনা, কুপ্রাম্, ডিজিটালিস্, হায়োলায়েমাস্, লাইকোপডিয়াম্, পাল্‌গেটিল, বার্কিউরিয়াম্, ফল্‌ফরাস্, রাস্-টক্স্, ট্রাইমেথিয়াম্ এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাস্‌ফার, চায়না ।

ডাইলুশন বিচার । ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আবার কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের মূল আয়োক ৫ । ১০ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন ।

ক্যালী ব্রোমেটাম্,—ব্রোমাইড্ অব্ পোটাশিয়াম্,—

ক্যালী-ব্রোম্

(KALI BROMATUM, -BROMIDE OF POTASH, -KALI-BROM.)

কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত ব্রোমাইড্ অব্ পোটাশ্ ক্রয় করিয়া উহার ১ গ্রেইণ ৯ ফোঁটা চূরান জলে মিশ্রিত করিয়া ইহার ১ম দশমিক ডাইলুশন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ২য় এবং ততো-ধিক দশমিক ক্রমের আরোক বধা নিয়মে রেকটিকাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহার প্রকৃত নির্দিষ্ট ক্রিয়া এ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে সম্ভবতঃ স্নায়বিক মণ্ডলীর উপর ইহার কার্য থাকা বশতঃ প্রধানতঃ ইহা দ্বারা কসেরিকা মজ্জার ঐ অংশই আক্রান্ত হইয়া থাকে যাহা গৌণ (থাক্কা) (Reflex impulses) প্রেরণ এবং প্রেরণ করে ও বাহ্যিক দরুণ স্নায়ুর কেন্দ্রস্থানে গৌণ উত্তেজনার স্থান হয়, তৎপর ইহা এফারেন্ট স্নায়ুর (Efferent nerves) অগ্রভাগের উপরেষ অংশে কার্য প্রকাশ করিয়া পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে এবং অবশেষে ইহা বৃহৎ মস্তিষ্ক (Cerebrum) আক্রমণ করে, বাহ্যিক দরুণ চক্ষুর তারি বিস্তৃত হয়, নোনা হওয়ার স্থায় হয়, মানসিক দুর্বলতা হয়, ক্রম (Hauileinatinos) ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সোজা সোজী হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত হয় এবং রক্তবহা নালীর গতি শাসনকারী স্নায়ু (Vaso-motor nerves) স্তম্ভিত আকোণ উৎপন্ন করিয়া ইহা রক্তবহা নালী সমূহের সংকোচন এবং তৎপর উহার বিস্তৃতি উৎপাদন করে। এই প্রকারে ইহা প্রধানতঃ মস্তক এবং সমুদয় শরীরের রক্ত সঞ্চালন শক্তিকে অবসন্ন করে, বাহ্যিক দরুণ রক্তের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায় এবং উহার স্নায়বিক কার্য সম্বন্ধীয় পক্ষাঘাত হওয়ার দরুণ শরীরের ঐ সমুদয় বস্ত্র এবং অংশেরই পক্ষাঘাত হইয়া থাকে, রক্ত বহা নালীর পরবর্তী বিস্তৃতির দরুণ উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া থাকে, বাহ্যিক দরুণ অবসন্ন স্নায়ুর কেন্দ্র অতিরিক্ত

পরিমাণে বিকৃত হইয়া উহার কার্য অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া বস্ম-
দির অতিরিক্ত চৈতন্য এবং আক্ষেপ (Convulsions) উৎপন্ন হইয়া থাকে ।
চর্মের উপর ইহার এক বিশেষ প্রকৃতির কার্য দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা
দ্বারা শরীরের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল, গ্রীবা, কব্জ ইত্যাদিতে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বা কোঁকর জায় ফুসুড়ী এবং আলায়ুক্ত ক্ষত প্রকাশ পায় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । গর্ভাবস্থায় সাত্বিতে ভয় উৎপাদক বা ভয়ানক আকৃতি বা
মূর্ত্তি দেখা ; শিশুগণ যেন ভয়ানক আকৃতি দেখিয়া ঘুম হইতে চীৎকার
করিয়া কাদিয়া উঠিয়া অচেতনাবস্থায় থাকে এবং সে তাহার নিকটবর্তী কাহা-
কেও চিনিতে পারে না ও তৎপর টেরা চক্ষে ভাংকায় ; প্রলাপ উচ্চ
এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম দেখা ; রোগী মনে করে যেন কোন ব্যক্তি
তাহাকে বিষ খাওয়াইবার অভিপ্রায়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে
(হারোস) এবং দৈবর যেন তাহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রক্ৰিয়
করিয়া বসিয়াছেন ; রোগী (গ্রীলোক) মনে করে যেন তাহার সম্মুখের
মূর্ত্তা হইয়াছে ; মদোন্মত্ততা ; মুখমণ্ডল আরক্ত ও টল্ টলে ; ভয়ানক ভ্রম
দেখা (বেল) ; শুকনাবার (Melanochlia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম দেখা ;
রোগী আপনায় মনের ভাব অপরকে বুঝাইয়া বলিতে পারে না ; স্মরণ
শক্তির হ্রাস বা বিনাশ ; কথা বলিতে বলিতে রোগী কখন কখন ২।১ টি
শব্দ ভুলিয়া বা ছাড়িয়া যায় ; মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক বাকবোধ ।

মস্তক । মস্তিষ্কের উত্তেজনা ; মুখমণ্ডল আরক্ত ও টল্ টলে, চক্ষুর
তারা বিস্তৃত, চক্ষু বসিয়া যায় ; মাথাঘুরাণ ; রোগী কখন কখন আগিয়া
চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠে ; হাত পায়ের পাতাদি শীতল ; শিশুগণের
ওলাউঠা ; মস্তিষ্কে প্রবল রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; মস্তিষ্কে কোন প্রকার
দ্রবিত পদার্থের সঞ্চারের পূর্বেই মস্তিষ্কের প্রদাহ (একন্, বেল) ।

চক্ষু । চক্ষে ঝাপসা দেখা ; চক্ষুর তারা বিস্তৃত ; টেরাচক্ষু
(হারোস) ; চক্ষু স্থির দৃষ্টি বা ভয় খাওয়ার ভাব বিশিষ্ট ; চক্ষু বসিয়া যায় ;
চক্ষুর জ্যোতি থাকে না ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল নিটা বা ফিকা অথবা মদ খাইয়া মেনা হইলে বেকরণ হয়, মুখমণ্ডল সেকরণ দেখার এবং এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম দেখা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা লালবর্ণ, শুষ্ক ও বর্ধিত ; জিহ্বা প্রথমতঃ লালবর্ণ ও তৎপর শুষ্ক এবং কটাবর্ণ ; জিহ্বার পার্শ্ব এবং তলা সাদা ; কথা বলিতে কষ্টবোধ ; জিহ্বার কার্য্যের বৈলক্ষণ্য (জেলন্স) ; তোত্‌লার দ্বার কথা বলা ; মুখে বা নিশ্বাসে প্রাণসে হুর্গন্ধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা সাদা । মুখগহ্বর, গলাগ্নি মধ্য এবং আঁহার বহা-
গলনালীর অগ্রভাগের হুই পার্শ্বস্থিত স্থানে অসাড়বোধ (অনেকদিন মদ্য পান করিলে বেকরণ ঘটয়া থাকে) ।

পাকস্থলী । অত্যন্ত পিপাসা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখগহ্বরের শুষ্কতা ; গা বমী বমী করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা ; বাতস্বার কাঁঠবমী এবং বমন ।

মল । জলবৎ তরলভেদ ; শিশুগণের ওলাউঠা, বিশেষতঃ উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের উত্তেজনা এবং চরম বা পতনাবস্থার (Collapse) লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া ; জীলোক এবং হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত রোগীগণের অস্ত্রে অতিরিক্ত পরিমাণ দূষিত বায়ুর সঞ্চার হেতু শূণ্ণ বেদনা (অসাকিটিভা) ।

মূত্রযন্ত্র । বহুমূত্র এবং মূত্রে অতিরিক্ত পরিমাণ লব্ধকা থাকা ; অতিরিক্ত পরিমাণে মূত্রত্যাগ এবং মূত্রে অধিক পরিমাণ ফস্ফেট্‌স্ (Phosphates) নামক পদার্থ থাকা ; মল ত্যাগের পূর্বেই মূত্র আপনা আপনি গড়াইয়া পড়া ; মূত্র ধারণে অশক্তি ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের ক্রীসংবাসের ইচ্ছা কমিয়া যায় এবং কোন কোন রোগীর প্রজ্ঞাভঙ্গ হয় (আগ্নান্স) ; ধাতু নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবসন্নতা, সর্বদা মনের জড়তা বা কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অশক্তি, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, পা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া চলা ; অত্যন্ত হুর্মলতা (কন্স-আস) । জীলোকের শেষ রক্তবোধ হওয়ার সময় মুখমণ্ডল আরক্ত ও টলটলে হয় ও উহাতে কষ্টকর গরমবোধ এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিকা বা রক্তাবরোধ (সালুনেরিয়া) ; পুরুষ সহবাসের ইচ্ছা প্রবল হইয়া পরিতুষ্ট না হওয়ার দরুণ ডিম্বকোষে সায়ুশুলের দ্বায় বেদনা ; স্নায়বিকতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে

মন ও শরীরের অশান্তি (নিরিসিক্); ডিম্বকোষ এবং জরায়ুর উত্তেজনায় বরুণ যোনি ইত্যাদির চুলকানি (ক্যাণেল্ড্); জরায়ু স্থানান্তরিত হইলে এবং জরায়ুতে গৈলিক আবে (Tumour) হইলে এই ঔষধ দ্বারা আরাম হয়, একরূপ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় ।

ঋসমুদ্র । থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ক কাশি, ২০ বর্ষা অন্তর যাহা রোগীকে একবার আক্রমণ করে; ঋসকষ্ট এবং তৎপর উদরস্থ আহার প্রব্যাধি বা শ্লেষ্মা বমন; স্নাত্তিতে এবং শয়ন করিয়া থাকিলে কাশির বৃদ্ধি; ছপিং কফের (Hooping Cough) জ্বর কাশি ।

হুংপিণ্ড এবং নাড়ী । হুংপিণ্ডের শক্তির যেন হ্রাস হয়; হুংপিণ্ডের শব্দ অত্যন্ত হ্রাস এবং উহা অতি গোপে গোপে শুনা যায়; হুংপিণ্ড আন্তে আন্তে স্পন্দন করে, কাঁপে বা ধড়্‌ধড়্‌ করে । নাড়ী প্রথমতঃ ক্রতগামী এবং তৎপর উহা মৃদু গতি বিশিষ্ট হয়; নাড়ী ক্রতগতি বিশিষ্ট, ক্ষুদ্র এবং হ্রস্ব ।

নিদ্রা । নিদ্রাশূন্যতা, বিশেষতঃ যে সকল রোগীর শরীরে রক্তের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়; অথবা যে সকল স্নায়বিক রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, অথবা সর্বদা খিট্‌ খিট্‌ করে বা উত্তেজিত অবস্থার থাকে, তাহা-বিগের নিদ্রাশূন্যতা (ককিয়া) ।

চর্ম্ম । যাহারা স্থূলকার্য্য বিশিষ্ট এবং যুবা, সর্বদা অপরিষ্কার থাকে, তাহাদিগের মুখমণ্ডল, বক্ষ এবং বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের জ্বর ফুসুড়ী (কার্কো-অনিমেল্); শরীরের স্থানে স্থানে বড়, কষ্টদায়ক ফোঁসার জ্বর ফুসুড়ী যাহা সহজে সারে না; ব্রণ; ফোঁসার জ্বর ফুসুড়ী বিশিষ্ট ক্ষত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ (হিপ্‌-পাল্‌ ক্) ।

ব্যবহার । মদোন্মত্ততা; সন্তান প্রসবের পর উন্মত্ততা (Puerperal Mania); শুভবাস্ (Melancholia); নিদ্রাশূন্যতা; মৃগীরোগ এবং মৃগী-রোগের লক্ষণাক্রান্ত রোগ সমূহ; স্নায়বিক উত্তেজনা এবং মস্তিষ্কের আবরণক ষ্টিলীর উত্তেজনা ও উহাতে রক্তাবিক্য বা রক্তাবরোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্য্যের অবসন্নতা বা বৈলক্ষণ্য, থাকিয়া থাকিয়া যাহার উদ্বেগ হয়; হিষ্টি-রিয়া; শরীরের স্থানে স্থানে অসাড়বোধ; পক্ষাঘাত; শিরঃস্ফীড়া; ধম্-

উষ্ণ ; শুষ্ক করণ ; শ্বসনজনক ; শ্বাসদ্বার বিবৃদ্ধি ; ডিম্বকোষের শোথ বা শোথ জনিত অস্থখ ; মাতালদিগের অজীর্ণরোগ ; শিশুগণের ওলাউঠা ; বহুমূত্র ; গুহ্বার বা মূত্রাধারের সঙ্কেচক যন্ত্রের পক্ষাঘাত ; পুরুষাদি বা যোনি ইত্যাদির চুলকানি ; স্ত্রীলোকের পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা ; স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষের স্রাবশূণ্যের ভাব বেদনা ; হৃপিংকক্ ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রণের ভাব ফুসুড়ী ; কোম্বার ভাব ফুসুড়ী ; ক্ষত ইত্যাদি অস্থখে ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়াম ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । স্নায়বিক ধাতু ; স্নায়বিক হ্রস্বলতা, যাহা অনেক সময় পক্ষাঘাতেও পরিণত হইয়া থাকে ; চলিবার সময় পা কাঁপা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাতালের ভাব হেলিয়া টলিয়া চলা ; যে সকল পেশী দ্বারা পা প্রসারণ করা যায়, সে সকল পেশীর হ্রস্বলতা ; শরীরের সম্ভাব্যের হ্রাস এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ের পাঁজাদি শীতল হওয়া ; হাত এবং হাতের পাঁজা বরফের ভাব শীতল ; যন্ত্রকের উত্তেজনা ; শিশুগণের ওলাউঠা ; সন্ধ্যার সময় অস্থখাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । ইহা হুলকার বা মাংস বিশিষ্ট রোগী, বিশেষতঃ হুলকার বিশিষ্ট বালক বালিকাগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আর্দ্রা গ্রিসিয়া, একোনাইট, হায়োসায়নে-মাস, জেল্‌সিনিয়াস, বেলাডোনা, ক্যান্‌ফার, নাক্স, বমিকা, জিক্সম্ ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সঙ্গে ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়ামের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । আদত ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসের ১ গ্রেইণ হইতে ৫ গ্রেইণ পর্য্যন্ত অনেক চিকিৎসক ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । লেখক স্বয়ং ১ গ্রেইণ হইতে ২ গ্রেইণ সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন । কিন্তু একবার একটী হিষ্টেরিয়া রোগাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার ইহার ১ মাত্রায় ১০ গ্রেইণ ব্যবহার করিয়া তিনি আশু বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু উহার পশ্চাৎকাল বড় ভাল দাঁড়ায় নাই । এই বিষয়টী যেন পাঠক মহাশয় মনের স্মরণ থাকে । যদি এই ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়, তবে ইহাও স্বয়ং রাখা কর্তব্য যে, ক্রমে মাত্রা না বাড়াইলে এই ঔষধ দ্বারা স্নায়বিক

পাওয়ার আঁশা ছরাশা বলিলেও অভ্যক্তি হয় না। কোন কোন চিকিৎসক ১ম দশমিক ক্রমের আরোকও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কালী কার্বোনিকাম্,—কার্বোনেট্ অব্ পোটাস্,—কালী-কার্ব্

(KALI CARBONICUM,—CARBONATE OF POTASH,—KALI-CARB.)

কোন এক বিষত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে আদত কার্বোনেট্ অব্ পোটাস্ ক্রয় করিয়া যথানিয়মে চূরান জলে (Dis-tilled Water) ইহার প্রথম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা নিয়মে ইহার সঙ্গে সুগার অব্ মিক্ মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৫ ভাগ চূরান জলে ৫ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্ মিশাইয়া যথানিয়মে উহা দ্বারা ২য় দশমিক বা ১ম শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রফ্ স্পিরিট্, ৪র্থ দশমিক ক্রমের আরোক ২০° ডিগ্রী ওবার প্রফ্ স্পিরিট্ এবং ৫ম ও ততোধিক ক্রমের আরোক রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। শ্বাস যন্ত্রের মৈয়িক ঝিল্লী, পরিপাক যন্ত্র এবং জ্বীলোকের জরায়ু ও ডিম্বকোষের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল। ইহা উক্ত যন্ত্র গুলিকে এত অধিক উত্তেজিত করে, যে উহার দরুণ মনে হয় যেন উহার প্রদাহ অতি নিকটবর্তী অথবা প্রদাহ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার প্রভাবে আক্রান্ত ঝিল্লী গুলি অত্যন্ত শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তদরুণ আক্রান্ত ঝিল্লীতে স্থচী বিধানের স্ফায় অত্যন্ত তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। এই প্রকা-রের স্থচী বিধানের স্ফায় বেদনা উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি প্রধান বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন। সহজেই ভীত হওয়া বা ভয় পাওয়া (নাইটি-আদ); মর্করা রাগ করা বা চটিয়া থাকা বা খিট্ খিট্ করা (বাই, ক্যাম্, নাক্স-বম্) ;

মনের উদ্বিগ্ন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভয় (একন্, ভেল্‌স্, ওশিয়ার) ; সর্কীর্ষা-
খিট্‌, খিট্‌ ও চিড্‌, চিড্‌ করা (ব্রাই, ক্যাম্‌, সিনা, হিপ্‌-সাল্‌ক্‌) ।

মস্তক । ভাড়াভাড়া মাথা বা শরীর ঘুরাইলে মাথাঘোর (কোনা-
রাম্‌) ; মাথার মধ্যে যেন কোন একটি চল্‌, চলে পদার্থ রহিয়াছে এরূপ
অনবরত অহতুত হয় এবং যাহা কপালের দিকে যেন মোচড়াইয়া বা ঝুলিয়া
পড়িতেছে এরূপ অহতুত হয় ; মাথার চাপিয়া ধরার জ্বায় বেদনা ; কপালে
চাপিয়া বা কসিয়া ধরার জ্বায় বেদনা বাহা চক্ষু এবং নাকের গোড়া অবধি
যেন বিস্তৃত হয় ; কপালের দুই পার্শ্বে স্থলী বিধানের জ্বায় বেদনা, মাথা হেট
করিয়া উপড় হইলে, মাথা নাড়িলে, চক্ষু ঘুরাইলে অথবা মাড়ি সকালনে
বাহার ঝুঙ্কি হয় এবং মাথা খাড়া করিয়া রাখিলে এবং উক্ত প্রয়োগে বাহার
উপশম হয় ; গাড়ীতে চাপিয়া বেড়াইলে মাথাধরা (ককিউগাস্‌) ; মাথার
তক্ষণোৎসাহ এবং মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া (ল্যাক্‌, নাইট্রিক্‌-আস্‌,
সিগিরা, কস্‌) ।

চক্ষু । চক্রে আলোবোধ এবং উহাতে স্থলীবিধানের জ্বায় অহতুত
হওয়া ; চক্ষুর পাতা এবং জ্বর মধ্যবর্তী স্থানের একটি থলিয়ার জ্বায় ক্ষীতি ;
(উপরের পাতার উক্ত প্রকারের ক্ষীতিতে এপিস্‌ ব্যবহার্য্য) ; চক্ষুর পাতা
ক্ষীত এবং প্রস্ফাবিত ; চক্ষুর পাতার পাতার লাগিয়া যাওয়া, বিশেষতঃ
প্রাতঃকালে (লাইকোপ্‌, মার্ক্‌, পাল্‌স্‌, সাল্‌ক্‌) ; পড়িবার সময় চক্রে
বেদনা (কটা) ; চক্ষুর বহির্দর্শনের কোণে টাটানি এবং আলোবোধ বেদনা ;
চক্রে আলোক সহ হয় না ; চক্ষুবিয়া জল পড়া (একন্, বেল্‌, মার্ক্‌, সাল্‌ক্‌) ;
দৃষ্টিহীনতা, চক্ষুর সম্মুখে যেন কুরাশার জ্বায় বেধার (ক্যাম্‌, সাইক্লোমেন্‌,
মার্ক্‌, পাল্‌স্‌, সাল্‌ক্‌) ; চক্ষুর সম্মুখে আগুনের কথা এবং চিহ্ন যেন জ্বালে
(বেল্‌, সাইক্লোমেন্‌, মার্ক্‌, কস্‌, সাল্‌ক্‌) ।

নাসিকা । নাসিকা ক্ষীত এবং লালবর্ণ (বেল্‌, নাইট্রিক্‌-আস্‌,
ব্রাইটল্‌) ; নাসারন্ধ্রে ক্ষত এবং উহাতে চুম্বী পড়া (মার্ক্‌, নাইট্রিক্‌-আস্‌,
ক্যালী-বাই, সিগিরা) ; নাসারন্ধ্রে রক্ত হওয়া (আমন্-কার্ক্‌, নাস্‌-বন্‌) ;
হারবার মাক্‌ দিয়া রক্ত পড়া (একন্, বেল্‌, ব্রাই) ।

কর্ণ । কর্ণের মধ্যে স্থলীবিধানের জ্বায় বাতনা (কোনারাম্‌, গ্রীক্‌,

নাইট্রিক্‌ আম্), কণ্ঠস্থিত গ্রন্থির প্রবাহ এবং ক্ষীতি (মার্ক্‌-বিন্‌গায়োড্‌); কানের মধ্যে সোঁ সোঁ, সাঁই সাঁই এবং কেড়্‌ কেড়্‌ শব্দ হওয়া (বারান্‌, চারনা; গ্রাক্‌) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিঠা এবং কণ্ঠ; মুখমণ্ডল ক্ষীত এবং টল্‌ টলে; গালে ছিঁড়িয়া ফেলা বা হুটীবিধানের জ্ঞায় বেদনা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে । কেবল খাওয়ার সময়ই দাঁতে বেদনা; দাঁতের গোড়ায় দণ্ডপানি, কোন প্রকারের ঠাণ্ডা বা উষ্ণ জিনিশের স্পর্শনেও বাহার বৃদ্ধি হয়; দাঁতের গোড়ায় ছুরিবিধান বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্ঞায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলের হাড়ে বেদনা; মুখে অনবরত লাগ উঠা; জিহ্বার অগ্রভাগে অনবরত আলা বা টাটানি (ক্যাক্‌-কার্ক্‌, ক্যার্কো-বেজ্‌); মুখগহ্বর এবং জিহ্বার বেদনা এবং উহা আলাবুদ্ধ বা কষ্টকর ফোকার জ্ঞায় ফুতুড়ী দ্বারা আবৃত (নেট্রাম্‌-মিউর; মিউর-আন্‌; লাইকোপ্‌); মুখে পচা এবং চট্‌চটিয়া স্বাদ (আণিকা, মার্ক্‌, নাজ্‌-বম্‌); গলার মধ্যে পক্ষাৎভাবে অত্যন্ত চট্‌চটিয়া আঠার স্ফোর (হাইড্রাট্‌, ক্যালী বাই); মাছের কাঁটা ফুটিয়া লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, আহাৰবহা গলনালীর ঠিক উপরিভাগের দুইপার্শ্বে সেরূপ হুটী-বিধানের জ্ঞায় বেদনা (হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌); ঠাণ্ডা লাগিলে গলার মধ্যে উষ্ণ প্রকারের বেদনামুভব; গলার মধ্যে হুড়্‌ হুড়্‌ কল বা উহার মধ্যে কোন প্রাণী দ্বারা দিয়া চলিয়া যাইতেছে এরূপ অনুভূত হওয়া, বাহ্যিক দণ্ডন কাশি এবং গলা খেকুরের উল্লেখ হয়; গিলিতে কষ্টামুভব; আহাৰ জ্বালাদি আহাৰ বহা গলনালী দিয়া অত্যন্ত আন্তে আন্তে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাঠবম্বী ও বমনের উল্লেখ হয়; গ্রীবার গ্রন্থির ক্ষীতি ।

পাকস্থলী এবং উদর । টক উল্গার উঠা (আলাম্‌, ক্যার্কো-বেজ্‌, নাজ্‌-বম্‌, কন্‌, সাল্‌ফ্‌); উদরস্থ আহাৰ জ্বালাদি এবং জল বমন; আহাৰের পর বমনোদ্বেষ; কোন প্রকারের মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা হইলেই বমনোদ্বেষ; গর্ভাবস্থায় বমনোদ্বেষ (নাজ্‌-মক্‌, পাল্‌-ম্‌, সিপিয়া); পাকস্থলী যেন জল দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে অনবরত এরূপ অনুভূত হয়; পাকস্থলীর মধ্যে ক্ষীত এবং বিস্তৃত করিয়া ধরার জ্ঞায় অনুভূত

হয়; স্পর্শনেও পাকস্থলী বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটার (হায়োস্‌, নেট্রাম্‌-কার্ক); পাকস্থলীর মধ্যে প্রবল দগ্ধপানী এবং কঠিনবৎ বেদনা (বেল); আহারের পর পাকস্থলীতে চাপা এবং ভারিবোধ (ব্রাই, নাক্স-বম্‌, পালম্‌); যকৃত প্রদেশে উষ্ণ, জ্বালাযুক্ত বা স্থচী বিধানের জ্বার বেদনা (একন্‌, আম্‌, ব্রাই, চায়না, মার্ক্‌, নাক্স-বম্‌, পিপেরা); উদরের সমুদয় অংশেই কঠিনবৎ প্রবল বেদনা (কলোস্‌); সামান্য জ্বালাদি উদরস্থ হইলেই উদরে পূর্ণ ও উষ্ণবোধ এবং উদর ক্ষীত ও বিস্তৃত হয় (চায়না, লাইকোপ্‌, নাক্স-বম্‌); অস্ত্রের মধ্য দিয়া শীতল তরল পদার্থ বহিয়া গেলে বেক্রপ হয়, উদরে সেক্রপ অহত্বত হয়; তলপেটে স্থচীবিধানের জ্বার অহত্বত হয়; শুষ্কতার দিয়া অধিক পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্ক এবং শুষ্কতারে বৃহৎ আকারের, বেদনায়ুক্ত বা কষ্টদায়ক অর্শের বলী (মিউর-আম্‌) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বলী গুলিতে স্থচী বিধানের জ্বার বা জ্বালাযুক্ত বেদনা; মলত্যাগের সময় শুষ্কস্থিত বলী গুলি শুষ্ক দ্বারের বাহির হইয়া পড়ে; মলত্যাগের সময় অধিক পরিমাণে রক্ত পড়া; শুষ্কতারে স্থচীবিধানের জ্বার বেদনা, টাটানি (সালফ্‌) এবং জ্বালাহত্বব; মলত্যাগের সময় কৌথপাড়া এবং কৌথপাড়িলেও মল নির্গত হয় না (আমন্‌-মিউর, কোনাগাম্‌, নাক্স-বম্‌); মনে হয় যেন শুষ্কের এমুন শক্তি নাই যদ্বারা ইহা মল বাহির করিয়া দিতে পারে; মল কোমল, রক্ত মিশ্রিত এবং পরিমাণে অত্যন্ত অল্প; ভেড়ার মলের জ্বার মলত্যাগ (আলাম্‌, মাইবাম্‌, ওপিয়াম্‌, পিপেরা); মল অতি কষ্টে নির্গত হয় ।

মূত্রবস্ত্র । বারম্বার প্রস্রাব করা, বিশেষতঃ রাত্রিতে (আম্‌, কন্‌-আম্‌, কোনাগাম্‌, ডিজিট্‌) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রবস্ত্রে অত্যন্ত চাপা ও কষ্টবোধ বা বাতনা এবং অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ; মূত্রত্যাগের সময় মূত্রনাগীতে জ্বালাহত্বব ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের হয় স্রী সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, নতুবা উক্ত ইচ্ছা একবারেই থাকে না; স্রঙ্গে ধাক্কা নিঃসরণ, বা স্রী সহবাসের পর অত্যন্ত দুর্লগ বোধ (আগারিকাণ্‌, ক্যাক্‌-কার্ক্‌, চায়না, কন্‌-আম্‌,

টাকিস) ; জীলোকের নিম্নমিত সময়ের অনেক পূর্বে অনেক বিন ব্যাপিরা এবং অতিরিক্ত খরিশাণে রজঃস্রাব (বেল, ক্যাক্-কার্ক, নাক্স-বন্, কস, সাবাইনা) ; রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শোথের জলের সঞ্চয়ের লক্ষ্যাদি প্রকাশ পাওয়া ; রজঃস্রাবের সময় এবং উহার পূর্বে ও পরে বোনি এবং উহার নিকটবর্তী স্থানে অত্যন্ত টাটানি ; রজঃস্রাবের সময় পেটে কঠিনবৎ প্রবল বেদনা ; কোমরের পশ্চাৎভাগে কনকনানি (সিমিসিক, পাল্‌স) ; বোনি ইত্যাদিতে চুলকানি বিশিষ্ট আয়বাতের জ্বর কুজুড়ী (ডাক) ; হরিজ্রাবর্ণের কতকারক খেতপ্রদর নিঃসরণ (আস্) ; পৃষ্ঠদেশে বেদনা ; তবে ছিঁড়িয়া ফেলা বা স্থচীবিধানের জ্বর বেদনা (ব্রাই) ।

শ্বাস যন্ত্র । খাওয়ার সময় বুকে বেন বাধ বাধ বোধ হয় ; প্রাতঃ-কালে শ্বাসকষ্ট বা নিশ্বাস প্রসঙ্গ ঘন ঘন ; সম্পূর্ণ ব্রশভঙ্গ বা ব্রশশূলতা (কার্কো-বেল, কটিকাম্, হিপ-সাল্‌ক, কস) ; শেষরাত্রি ওটা হইতে ৪টা পর্যন্ত কাশির বুকি (আমন্-কার্ক, ডুসিরা) ; সন্ধ্যার সময় বা প্রথম রাত্রিতে শয়ন করার পর কাশি ; থাকিয়া থাকিয়া কাশি, গলার মধ্যে হুত্-হুত্‌ক দরুণ বাহার উল্লেখ হয় ; আকস্মিক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাঠি-বনি বা বমন ; গলার মধ্যে শুকবোধের দরুণ কাঁপড় হওয়া বা শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হওয়া ; কাশিতে কাশিতে গলাদিয়া পুঁয়সংযুক্ত স্লেয়া নির্গমন (চারনা, ডাক, লাইকোপ, কস, সাইলিসি) ; গলা দিয়া কুত্-কুত্‌ ডেলা ডেলা গোলায় জ্বর স্লেয়া নির্গমন ; তাড়াতাড়ি চলিলে বুকের মধ্যে হর্ষল বোধ ; চলিবার সময় প্রসঙ্গে বুকের মধ্যদিয়া আঁটাধোঁধ ; সন্ধ্যার সময় বা প্রথম রাত্রিতে শয়ন করার পর বুক কঠিনবৎ বেদনা ; নিশ্বাসে বুকের মধ্যে স্থচীবিধানের জ্বর বেদনা (ব্রাই, কস) ; কথা বলিলে, শ্বাস প্রসঙ্গে, কোন প্রকারের ভারি জ্বা উঠাইলে বুকের মধ্যে বেদনা এবং টাটানি (বাস্টজ) ; বুক চাপা বোধ ।

হৃৎপিণ্ড । বারবার প্রবল হৃৎস্পন্দন (একন্, আস্, স্পাইজেল, সাল্‌ক) ; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অসম (Intermittent) (ডিজিট, নেট্রাম্-বিউর) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (বাস্টজ, ইগ্‌নেস, ল্যাক) ; চলিবার সময় পৃষ্ঠদেশে কনকনানি, বাহার

দক্ষণ রোগীর মনে হয় যেন সে আর চলিতে না পারিয়া শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হইবে; জীলোকের সন্তান প্রসবের পর, গর্ভপ্রাবের পর বা জরারু হইতে অতিরিক্ত রক্তক্ষয়ের পর, পৃষ্ঠদেশে কনকনানি; তাদিয়া গেলে বেকুণ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেকুণ বেদনা (বেল, নেট্রাম-মিউর, নাক্স-বম্); প্রাতঃকালে নিশ্বাস প্রশ্বাসে ডাইন কঙ্কে স্থচীবিধান বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা; কোমরের পশ্চাৎভাগে কসিয়া ধরা জ্বর বেদনা; কোমরের পশ্চাৎ ভাগে কঠিন চাপারোধ; কোমরের শৈলী গুলিতে ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । সন্ধ্যার সময়, শয়ন করিয়া থাকিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অমুখবোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভারিবোধ, বাহ্যিক দক্ষণ রোগী পায়ের পাতা তুলিতে পারে না; হাত পা যেন অসাড় হইয়া যায়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা; কোন পদার্থের উপর বলিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনার উদ্বেক হয় । উভয় বাহুই দুর্বল হয় এবং উহাতে কোন শক্তি থাকে না; বায়ু কঙ্কের সন্ধিতে ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা; বোগলের গ্রন্থির ফীতি; উভয় কনুইয়ের সন্ধিতে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা; বায়ু বাহুর উপরিভাগে থাকিয়া থাকিয়া চিড়িক মারার জ্বর বাতনা; হাত এবং হাতের আঙ্গুলে অসাড়বোধ; বোগলে বর্ষ । চলিবার সময় পায়ের আঙ্গুলের মাথার অত্যন্ত বেদনামূলক; রক্তিতে ডাইন উরু এবং পায়ের ডিমে আকোপ বা খিলখরা; হাঁটু, পা এবং পায়ের পাতার ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা ।

নিদ্রা । নিদ্রাবেশ এবং বারবার হাঁইতোলা (নাক্স-মফ্); থাকার সময় যেন ঘুম পায়; আহারের পর ঘুম পায় (নাক্স-বম্); অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল হয় না; কপ দোষ; ঘুমেরদ্বারা কণা বলা; শব্দ রাত্রি ১২ টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া বাইরা রক্তিতে আর ঘুম হয় না ।

ব্যবহার । কুফুসের অন্তঃ; কুফুস-প্রদাহ; কুফুস-আবরণ বিলী প্রদাহ; বক্ষাকান; হাঁপানি কানি; বায়ুনল প্রদাহ; হৃদি কক্ষ কানি; শোথ জনিত বা শোথ সম্বন্ধিত অস্থি, বিশেষতঃ হৃদ বরসে; মার্সী-সিক শোথ; উদরী; বক্ষশোথ; রক্তজটা; বক্ষার; অঙ্গার্ণ; বক্ষের রক্ত-

দিক্য বা রক্তাবরোধ ; অৰ্ণরোগ ; রক্তঃরোধ বা পৌণে প্রথম রক্তঃপ্রাব ; পক্ষাঘাত ; বাতরোগ ইত্যাদি অন্তর্থে ক্যালী কার্বোনিলাম ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । -বারম্বার ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া পড়া ; সহজেই বা সামান্য কারণেই সর্দিলাগা (ক্যাঙ্ক-কার্ক, নেট্রাম্-মিউর, কন্স, সাইলিসি) ; পেশী স্পন্দন (আগারিকাম্, ইগ্‌নেস, আয়োড, ট্রায়ম্) ; অক্লান্ত হানে কসিয়া ধরা বা হুটী বিধানের ভার বেদনা ; স্থপিত্ত অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় এবং তদক্ষণ নাড়ীও দুর্গন্ধ হয় ; রসকর অনিত্ত জ্বর বা হেকটিক্ ফিবার (Hectic Fever) ; সমুদয় শরীরেই খালি খালি বোধ, বাহার দক্ষণ মনে হয় যেন শরীরে কোন প্রকারের কঠিন বা ঘন পদার্থ নাই ; শেষ রাত্রি ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত, বিশ্রামে এবং শরীরে ঠাণ্ডা লাগিলে অন্তর্গতের বৃদ্ধি, এবং দিনের বেলা চলিয়া বেড়াইলে, উষ্ণ প্রয়োগে বা গরমে এবং গরম কাঁচাগে অন্তর্গতের উপশম ইত্যাদি এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । বৃদ্ধ বয়স, স্থলকার বিশিষ্ট এবং চর্কিয়ুক্ত ও চলন্তলে পেশী বিশিষ্ট শরীর, কাল চুল ; জীবনী শক্তির হ্রাস, বারন্ত, পূঁষাদি নিঃসরণের পর, বিশেষতঃ রক্তাক্ত ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ।

সম্মুখণ বিশিষ্ট ঔষধ । নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্ এবং ট্রায়নের কার্যের সঙ্গে ক্যালী কার্বোনিলামের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আর্সিনিক, একোনাইট, বেলা-ড্রোনা, ব্রাইওনিয়া, কার্বো-বেজিটেবিবিস, ক্যামোমিলা, চারনা, কোনা-রাস, জেন্‌সিমিয়াম্, ক্যালী ব্রাইজমিকাম্, ওপিয়াম্, অ্যাকেসিস, লাই-কোপতিয়াম্, মার্কিউরিয়াম্, নাইট্রিক্ অ্যাসিড, নাক্স-বমিকা, কক্ষরাস, পাল্‌সেটিল, রাস্টক্স, ট্রায়োনীয়াম্, সিপিরা এবং গাল্‌ফায়ের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিবেদক ঔষধ । ক্যাক্সার, ককিয়া ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য় এবং ৩য় ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ফুফুসের স্ফোটক রোগের (Pulmonary Tuberculosis) ১ম ও ২য় ক্রম বিশেষ উপকারী । কোন কোন চিকিৎসক ৬, ১২ এবং ৩০ ক্রমও ব্যবহৃত করিয়া থাকেন ।

কালী আয়োডেটাম্,-কালী হাইড্রিডিকাম্,-আয়ো- ডাইড্ অব্ পোটাস্,-কালী-আয়োড্

(KALI IODATUM,-KALI HYDRIODICUM,-IODIDE OF
POTASH,-KALI IOD.)

কোন এক বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধাগর হইতে আয়োডাইড্, অর্, পোটাসিয়াম্ ক্রয় করিয়া যথানিয়মে ডাইনুট্, আল্ কোহলে ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ২য় এবং ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে রেক্টকাইড্, স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথানিয়মে স্থানীয় অব্ মিকে মিশাইয়া ইহার ড্র'ডাও প্রস্তুত হইতে পারে।

সাধারণ ক্রিয়া। শরীরের দৈনন্দিক ক্রিয়া এবং গ্রন্থির উপর ইহার কার্য অতি প্রবল এবং অনেকটা পারার (Mercury) জায়। অতএব পারা শরীরের যে সকল অংশ বা তরঙ্গ পদার্থ ধ্বংস করে, আয়োডাইড্ অব্ পোটাসেও সে সকল অংশ এবং তরঙ্গ পদার্থ ধ্বংস করিয়া থাকে। লিম্ফেটিক্ গ্রন্থির উপর ইহার কার্য আয়োডিনের জায় এবং তদ্রূপ উক্ত অংশের বিবৃদ্ধি এবং উহার কার্যের ক্ষমতার বিনাশ হয়। ইহা অস্থি আবরক কঠিন পর্দা (Periosteum) পূরু করে। অতএব পরস্পর ব্যাধির জনিত অস্থি আবরক কঠিন পর্দার মধ্যে যে প্রকার আব (Tumour) হয়, তাহাতে ইহা বিশেষ উপকারী। পারার (Mercury) অপব্যবহার এবং পরস্পর ব্যাধির জনিত রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। বিষম্যভাব এবং মনের উদ্বিগ্ন (ইগ্নেস্, নেট্রা-মিউর, পাল্‌স্)।

মস্তক। মাথা উপরিভাগে বেগনা, বাহ্যিক দৃশ্য মনে হয় বেন মাথা কাটিয়া ছিন্ন হইবে (ব্রাই, চারনা, নেট্রা-মিউর, সিনিয়া, লাই-সিসি); অর্, অঁটিয়া রাবিলে বেগুন হয়, মাথার দুই পার্শ্বে স্ফেদন বেগনা বা বাতনা (মার্ক্, লাইটিক্-আস্); বাম চক্ষুর উপরিভাগে ছিঁড়িয়া কেনা বা

হঠাৎ হৃদী বিধানের ভায় বেদনা বা ব্যাভা; চুলকাইবার সময় মনে হয় যেন মাথার ক্ষত হইয়াছে (মার্ক) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা, বর্ণহীন; মুখমণ্ডল এবং জিহবার ক্ষীতি, বিশেষতঃ পারার (Mercury) অপব্যবহারের পর ।

চক্ষু । চক্ষু বসিয়া যায়, উহা নীলবর্ণ রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং উহার স্থানে স্থানে আবের (Tumour) ভায় ক্ষীতি (আজেক্টি-নাইটিক); চক্ষুর বোজক বিল্লীতে থলিয়ার ভায় জনপূর্ণ ক্ষীতি (Chemosis); চক্ষে জালায়ুভব; চক্ষে পূর্ব সংযুক্ত প্লেয়ার ভায় পদার্থের সঞ্চার; চক্ষুর পাতার শোথের ভায় ক্ষীতি বা শোথ (এপিস্, ক্যালী-কার্ক, রাস্টক্স); চক্ষুর সম্মুখে কুয়াশা থাকিলে বেক্রপ হয়, চক্ষে স্কেরূপ বাপ্পা বা কম দেখা (ক্যালী-কার্ক, ল্যাক্, মার্ক, পাল্‌স্); গবমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত চক্ষুর আইরিস নামক অংশের প্রদাহ (Syphilitic or mercurial Iritis); চক্ষু সর্কদাই জনপূর্ণ এবং তদ্রূপ সর্কদাই চক্ষে বাপ্পা দেখা; চক্ষুর পাতার প্রান্ত অত্যন্ত জালবর্ণ এবং অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত; রাত্রিতে বেদনা বহুপাদির বৃদ্ধি; চক্ষুর আইরিস নামক অংশের প্রদাহ সম্বলিত চক্ষুর কোরয়েড্, ক্লির প্রদাহ (Irido-Choroiditis), বিশেষতঃ উক্ত রোগ গরমীর ব্যারাম জনিত হইলে; করিয়াতে (Cornea) ফোকার ভায় ফুসুড়ী; আলোকে কোন কষ্ট ব্যাভনা থাকে না অথবা চক্ষু লাল হয় না ।

নাসিকা । তরুণ সর্কী এবং চক্ষু, নাসিকা, গলার স্বাধ্য এবং তাদুকা জালবর্ণ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়া (সিপা, ইউফ্রেন); প্রবল হাঁচি এবং নাক দিয়া উগ্র ক্ষতকারক জলের ভায় প্লেয়া নির্গমন (সিপা, মার্ক-কর); নাসারন্ধ্রে অত্যন্ত চট্‌চটিয়া আঠা প্লেয়ার সঞ্চার (ক্যালী-ব্রাই); নাক দিয়া সবুজের আভায়ুক্ত কাল অথবা হরিদ্রাবর্ণের, দুর্গন্ধযুক্ত বমন উৎপাদক পদার্থ অথবা সবুজের আভায়ুক্ত পচা রক্ত নিঃসরণ; নাকের গোড়ায় পূর্ণ এবং আঁটাবোধ (একন্, ক্যালী-ব্রাই); নাক এবং কপালের হাড়ে হপ্‌হপিয়া ও জালায়ুক্ত বেদনা এবং আক্রান্ত স্থানের ক্ষীতি; নাকের হাড়ে চর্কনবৎ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত স্থানে ছুরি দিয়া কাটা এবং ছিঁড় করার ভায় বেদনা বাহা কপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বার অগ্রভাগে জালাযুক্ত বেদনা (ক্যাক্স-কার্ক্স, কার্কসো-আনিমেল, ক্যালী-কার্ক্স); জিহ্বার অগ্রভাগে ফোকার জ্বর কুসুড়ী (নেট্রাম-মিউর); মুখগহ্বরে শুকাহুতব (আস্, ব্রাই, নাক্স-মফ, পালস); দাঁতের মাড়ী, বিশেষতঃ ক্রয় প্রাপ্ত দাঁতের গোড়ার ক্ষীতি; মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ (অর্গিকা, হিপার-সাল্‌ফ্, আয়োড, নাইট্রিক-আস্); মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠা (আয়োড, মার্ক্, নাইট্রিক-আস্, আইরিস); ইন্ডাস্ট্রিয় নিম্নস্থিত লাল নিঃসারক গ্রন্থির ক্ষীতি এবং পাকিয়া উহাতে শূঁষ উৎপন্ন হওয়া (হিপ-সাল্‌ফ্, সাইলিনিস)। গলার মধ্যে চুল-কানি এবং উহাতে শুকাহুতব; গ্রীবা দেশস্থিত থাইরয়েড্-গ্রন্থি (Thyroid-gland) ক্ষীতি এবং উহাতে টাটানি; আলজিহ্বা ক্ষীত এবং লম্বা হওয়া; গলার মধ্যের স্নায়িক ঝিল্লীর শোথ।

পাকস্থলী এবং উদর। অত্যন্ত পিপাসা (একন্, আস্, ব্রাই, বেল); বমনোদ্বেষণ এবং বমন (ইপিকাক্, আন্টি-টার্ট্, লোবিলিয়া); প্রবল বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠা। হঠাৎ অত্যন্ত পেট ফাঁপিয়া উঠা, বাহার দ্রুপ মনে হয় বেন পেট কাটিয়া বাইবে এবং শুষ্কতার দিয়া দ্বিতীয় বায়ু নিঃসরণ হইলেই যাহা কসিয়া যায় (কার্কসো-বেজ্)।

মল। মল কঠিন, পরিমাণে অল্প এবং শুষ্কতার দিয়া অতি কষ্টে নির্গত হয়; ফিকা সবুজ এবং হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ তরল ভেদ।

জননেদ্রিয়। পুরুষদের অত্যন্ত ক্ষীতি এবং প্রদাহ। জীলোকের রজঃস্রাবের সময় বারম্বার প্রস্রাবের ইচ্ছা; তরল, জলের জ্বাস, উগ্র এবং ক্ষতকারক খেত প্রদর নিঃসরণ; ত্বন সঙ্কুচিত বা ছোট হওয়া (আয়োড)।

শ্বাসযন্ত্র। ছাল উঠিয়া গেলে বেজ্ঞ হইয়া, বায়ুনের উপরিত্রাগে সেরূপ বেদনা বা বাতনা; অত্যন্ত গভীর শব্দ বিশিষ্ট কাশি এবং গলা দিয়া সাদাটিয়া ও সবুজের আভাযুক্ত স্লেমা নির্গমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ হিঁড়িয়াফেলার জ্বর বেদনা বাহা বক্ষাহির নিম্নাংশ হইতে আরম্ভ হয়; বৃক্ খুচী বিধানের জ্বর বাতনা, বক্ষাহির মধ্য দিয়া অথবা বৃকের গভীর অংশ দিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত বাহা বিস্তৃত হয় (ক্যালী-কার্ক্স); চলিবার সময় বৃক্

উক্ত প্রকারের বাতনা ; বক্ষাকাশ এবং তদন্থ গলাদিয়া পূর্ব সংযুক্ত স্নেহা-
নির্গমন ; রাক্তিতে বর্ণ এবং তরল ভেদ হওয়া ; ফুস্কুসের শোথ এবং উহার
সঙ্গে সঙ্গে ফুস্কুস প্রদাহ ; মূত্রকোষের ব্রাইটস্ ডিজিঙ্ হেতু ফুস্কুসের শোথ
এবং গলা দিয়া সাবান গোলায় জায়, সবুজ স্নেহা নির্গমন ।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎস্পন্দন, চলিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

পৃষ্ঠদেশ । জু অঁটিয়া রাখিলে বেক্রপ হয়, কোমরের পশ্চাৎভাগে
সেক্রপ বেদনা ; চলিয়া বেড়ানোর পর কোমরে উক্ত প্রকারের বেদনা ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছিঁড়িয়া কেলা, ছুরি বিধান বা চর্কণ-
ব্যং বেদনা ; বেদনা অস্থির আবরক কঠিন পর্দা (Periosteum) আক্রমণ
করে ; রাক্তিতে বেদনার বৃদ্ধি ; পারায় অপব্যবহার অথবা গরমীর ব্যারাম
জনিত বেদনা ; বৃহৎ সন্ধিবাত ; ক্ষুদ্র সন্ধিবাত বা গাউট্ (Gout) ।

চর্ম । মুখমণ্ডলে দাঁড়ের জায় চুলকানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী ; সমুদয়
শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ অথবা কোঁকার জায় ফুস্কুড়ী, মুখমণ্ডল, বক্ষ, পৃষ্ঠদেশ
এবং বকেই যাহা অধিক হয় ।

নিদ্রা । অস্থির নিদ্রা বা ভাল ঘুম না হওয়া ; নিদ্রাশূন্যতা ।

ব্যবহার । পারায় (Mercury) অপব্যবহার, গরমীর ব্যারাম এবং
গণ্ডমালা ধাতু জনিত অস্থ্য ; গৌণ গরমীর ব্যারাম (Secondary Syphi-
lis), বিশেষতঃ পারায় অপব্যবহারের পর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডমালা
জনিত অস্থ্য ; বাগী ; গরমীর বা, বাহার প্রাপ্ত উচ্চ এবং বাহা হইতে পাতলা,
ক্ষতকারক অথবা দধির জায় ক্রেন নির্গত হয় ; গভীর ক্ষত, বাহার বেদনাদি
রাক্তিতে বৃদ্ধি হয় ; গ্রন্থির অস্থ্য ; অস্থির অস্থ্য ; পুরাতন আকারের বৃহৎ
সন্ধিবাত ; সাইনোব্রিয়াল্ ক্লিরীয়া প্রদাহ (Synovitis) ; গায় গোলাপী রক্তের
ফুস্কুড়ী ; গায় দাঁড়ের জায় গোলাকারের ফুস্কুড়ী ; রূপীয়া (Rupia) রোগ ; মুখ
ইত্যাদিতে ক্ষত এবং উহা হইতে রক্ত নির্গমন ; বক্ষাকাশ ; ফুস্কুসের শোথ
ইত্যাদি অস্থ্যে আয়োডাইড্ অব্ পোটাসিয়াম্ ব্যবহার্য্য ।

নিদেশ্য প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত সার্বাস্ত্রিক হ্রাসলতা ; পেণী
অগ্রভাগের স্পন্দন অথবা পেণী বা উহার অগ্রভাগের সঙ্কোচন (হাইমোন্স্,
ট্রামন্স্) ; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি বা উহার হ্রাস বা সঙ্কোচন ; শরীরের নানা অংশে

শোধের দ্বারা জলীয় পদার্থের স্ফার (এপিস্, আপোসাইনাম্, আন্) ; অস্থির ক্ষীতি (আসফিটিজ, হিপ্-সাল্ফ) ; রক্তিতে, ঠাণ্ডা বাতাসে, বিশ্রামে অস্থির বৃদ্ধি এবং নড়া চড়াতে অস্থির উপশম ইত্যাদি এই ঔষধের কতকগুলি প্রধান প্রাকৃতিক লক্ষণ। পারার (Mercury) অপব্যবহারের পর এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। অরাম্, ইউকেসিয়া, ক্যালী-বাইক্রমিকাম্, হিপার সাল্ফিউরিস্, আরোডিন্, মার্কাস্, মেজিরিয়াম্।

প্রতিষেধক ঔষধ। হিপার সাল্ফিউরিস্।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য় এবং ৩য় ক্রম সচরাচর ব্যবহার্য। অনেক সময় লেখক আদত আরোডাইড্, অব্ পোটাশিয়াম্ ১২ বা ৩ গ্রেইণ মাত্রায়ও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ক্রিয়াজোটাম্,-ক্রিয়োজোট্,-ক্রিয়াজ্

(KREASOTUM,-KREASOTE,-KREAS.)

কোন এক বিস্তৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত ক্রিয়াজোট্ ক্রয় করিয়া উহার মিশ্র আরোক রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত করিতে হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। লিম্ফেটিক্ মণ্ডলী (Lymphatic System), পরিপাক বন্ত্র এবং জীজনেনেন্সিয়ের লৈঙ্গিক ঋনীর উপর ইহার ক্রিয়া বিশেষ প্রবল, বাহ্যিক লক্ষণ উক্ত বন্ত্রাদির লৈঙ্গিক অস্থি হইয়া উহা পরিষ্কার উপক্রম হয়, উহাতে ক্ষত হয় এবং তৎপর আক্রান্ত অংশের ক্ষয় সংসাধিত হইয়া থাকে। আক্রান্ত স্থানে উগ্র ক্ষতকারক নিঃসরণ উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অরণ শক্তির দুর্বলতা বা হ্রাস (আগারিকাশ্, আত্ৰা, আনাকার্ড্, লেডাম্, মার্ক্, মাজ্-মফ্, নেটাম্-মিউর, ফস্-আস)।

মস্তক। মাথাধারা; অতিরিক্ত মন্য পানের পর ঘেরূপ হয়, মাথাধা
সেরূপ চিমাঝোধ (নান্স-বম); মাথার, বিশেষতঃ কপালে দগ্ধ ক্রিয়া বেদনা।

চক্ষু। একখানি মিহি কাপড়ের মধ্য দিয়া ভাকাইলে ঘেরূপ হয়,
চক্ষে সেরূপ কাপ্সা দেখা (কষ্ট, ক্রোকাশ, হায়োস, পিটোন্, কস, পাল্‌স,
রাস্টন্); চক্ষে উষ্ণ এবং জাগ্রতব; চক্ষু দিয়া জল পড়া (একন্, আস্,
মার্ক-কর); চক্ষু দিয়া যে-জল পড়ে তাহা লবণের জলের জ্বার উগ্র এবং
জালা উৎপাদক; চক্ষুর পটভার প্রান্ত স্বীত (পাল্‌স, টাকিস)।

কর্ণ। কানের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া; রক্ত-প্রাবের সময় এবং
উহার পূর্বে কানে গুণ্ গুণ, ভন্ ভন্ শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে
কম শুনা।

নাসিকা। নাকের মধ্যে দুর্গন্ধ (ক্যাক্-কার্ক); বারবার হাঁচি
দেওয়া, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে; শুক বা তরল সর্দি এবং উহার সঙ্গে
সঙ্গে অত্যন্ত হাঁচির উদ্রেক; বৃদ্ধ ব্যক্তিরিগের পুরাতন সর্দি।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা, নীলের আভাযুক্ত, স্বীত
এবং টগ্ টগে; মুখমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে দম্কা উৎপাদন এবং উহার সঙ্গে
সঙ্গে গালের স্থানে স্থানে চক্রাকারের লালচিহ্ন (সাজুনেরিয়া, সাল্‌ক্); মুখ
বগুণে জালাযুক্ত বেদনা, চলিলে বা অন্ত কোন প্রকারের শারীরিক পরি-
শ্রমে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং অল্প পার্শ্ব শয়ন করিলে বাহার উপশম হয়।

মুখগহ্বর। জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত (আণ্ডি-কুড্, ব্রাই, নান্স-বম,
পাল্‌স, সাল্‌ক্); দাঁতের গোড়ার কসিয়া ধরার জ্বার বেদনা (মার্ক);
দাঁতের গোড়া দিয়া সহজেই রক্ত পড়া; মাড়ি তলতলে এবং ক্ষতযুক্ত
(মার্ক, নাইটিক্-আস্, কস্); মুখে অত্যন্ত গড়া দুর্গন্ধ (আণিকা, আহোজ্,
নাইটিক্-আস্, নান্স-বম)।

পাকস্থলী এবং উদর। মুখে, বিশেষতঃ গলার মধ্যে তিক্ত স্বাদ
বিশিষ্ট জল উঠা, অথবা উদরস্থ আহার প্রব্যাদি বমন (কস্, বিরেট্-আস্);
পাকস্থলীর কোন এক নির্দিষ্ট স্থানের কঠিনতা এবং উহাতে বেদনা। অতি-
রিক্ত পরিমাণে খাইলে ঘেরূপ হয়, উদরে সেরূপ পূর্ণবোধ (জাইকোপ্);
উদরের দুই পার্শ্ব কসিয়া ধরার জ্বার আঁটাবোধ (একন্); রোগী কোন-

য়ের কাগড় কসিরা পরিতে পারে না (ক্যাঙ্ক-কার্ক, কার্কো-বেজ্, গ্রাক্); উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত হয় (আন্টি-ক্লড্, ব্রাই, ক্যান্); উদরে প্রসব বেদনার ভ্রাস খুল বেদনা ।

মল । কোষ্ঠবদ্ধ; মল কঠিন বাহ্য অতি কষ্টে এবং কোণ পাড়ার পর নির্গত হয় (ব্রাই, নাক্স-বম্, সাগ্-ক) ।

মূত্রযন্ত্র । বারবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা (একন্, এপিস্, ক্যাঙ্); ভাড়াভাড়া মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ (মার্ক্); মূত্র হর্গন্ধযুক্ত (বেজ্-আস্, ক্যাঙ্-কার্ক, সাগ্-ক, আস্, নাইট্রিক্-আস্); রক্তহীন মূত্রত্যাগ (ইগ্রেস্, ফস্, আস্); মূত্রে লাগ্চে তলানি পড়ে (বেজ্, লাইকোপ্, কার্কো-বেজ্, সিপিরা, গ্রাক্) ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের নিরমিত সময়ের অনেক পূর্বে অতি-রিক্ত পরিমাণে এবং অনেকদিন ধরিয়া রক্ত-প্রাধ (ক্যান্-কার্ক); হরিদ্রা বর্ণের খেত প্রদর নিঃসরণ বাহ্য লাগিয়া কাগড়াদিতে হরিদ্রাবর্ণ দাগ পড়ে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্বলতা (কার্কো-আনিয়েল্); সাদা খেত প্রদর নিঃসরণ; প্রস্রাবের সময় যোনির মধ্যে জালাহুতব; যোনির মধ্যে এবং যোনি এবং উরুর মধ্যবর্তী স্থানে জালাহুতব, বা জালা ও বেদনা এবং উক্ত স্থানে জালাহুত বেদনা; যোনির লেবিয়া (Labia) নামক স্থানে অত্যন্ত চুলকানি; যোনিদ্বারে অত্যন্ত চুলকানি (ক্যাঙ্, কোনারাম্), বাহ্য দক্ষণ উক্ত অংশ চুলকাইতে বা কষিতে ইচ্ছা যায়; যোনির বহির্দেশ ক্ষীত, উক্ত এবং কঠিন হয় ও উহা টাটার; যোনির লেবিয়া নামক অংশের মধ্যবর্তী স্থানে টাটানি (সিপিরা); গর্ভাবস্থার বমনোদ্বোগ, মুখে জল উঠা; সন্তান প্রসবের পর যোনিদ্বার দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতকারক ক্রেন (Lochia) নিঃসরণ; শুভ্র সঙ্কুচিত বা ছোট হইয়া যাওয়া (আরোড্, ক্যানী-আরোড্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুনের স্থানে স্থানে ভেগার ভ্রাস বেদনাযুক্ত ক্ষীতি অস্থিত হওয়া ।

শ্বাসযন্ত্র । গলার মধ্যে টাচিয়া ফেলার ভ্রাস বা থসু থসে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ (মেজিরিয়াম্, নাক্স-বম্); শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন (একন্, আস্, ফস্); আক্কেপিক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বোগ

ইচ্ছা (আণ্টি-টাৰ্চ); থাকিয়া থাকিয়া তৰল কাশি, বকাহিৰ পশ্চাৎভাগে কোন প্রাণী হামা দিয়া বাইভেছে একপ অনুভূত হওয়ার দৰূণ বাহ্যিক উদ্বেক হয়; বুকেৰ মধ্যে জ্বালাবুজব (আৰ্শ, নাক্স-বম); বুকে, হৃৎপিণ্ডেৰ ঠিক উপৰি প্ৰদেশে হুচীবিধানের জ্বাৰ বেদনা (লিলিয়াম্, ক্যালী-কাৰ্ৰ); বারম্বাৰ গলাদিয়া স্নেহাৰ সঙ্গে রক্ত উঠা; বুকে প্ৰবল বেদনা; শেৰ বেলায় জ্বৰ এবং প্ৰাতঃকালে বা শেষ ৰাত্ৰিতে ঘৰ্ম ।

গ্ৰীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্ৰীবাদেশস্থ গ্রন্থিৰ ক্ষীণি (ব্যৱাইটা, ক্যাক্-কাৰ্ৰ, মাৰ্ক, হিপ্-নাল্, আৰোড্); কোমৰেৰ পশ্চাৎদেশে প্ৰবল বেদনাৰ জ্বাৰ বেদনা (মিমিসিক্, পাল্-স্) ।

অঙ্গ প্ৰত্যঙ্গ । মোচড়াইয়া পড়িলে বেৰূপ হয়, অঙ্গ প্ৰত্যঙ্গে সেকৰূপ বেদনা (আৰ্ণিকা); বাম হস্তেৰ বৃদ্ধাস্থনীতে মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁত্-লিয়া যাওয়ার জ্বাৰ বেদনা ।

চৰ্ম্ম । সমুদয় শৰীৰে চুলকানি, শেৰবেলা বা সন্ধ্যাৰ সময় বাহ্যিক বৃদ্ধি হয়; সমুদয় শৰীৰে ফোকাৰ জ্বাৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ফুৰুড়ী (ক্ৰোটন, আইৰিস) ।

নিদ্ৰা । ঘুমাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা এবং উঠাৰ সঙ্গে সঙ্গে বারম্বাৰ হাঁইতোলা; নিদ্ৰা শূন্যতা; কোন দৃষ্টত: কাৰণ ব্যতীতও বারম্বাৰ এপাশ ওপাশ কৰিয়া ছট্-ফট্ কৰা ।

ব্যবহার । গণ্ডমালা জনিত অস্থখ; পচাবুক্ত কত; কোন অংশ পচিয়া যাইয়া উহা হইতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পুঁৰ পড়া; কৰ্কটরোগ (Cancer); সৰ্দি বা শ্লেষ্মিক রোগ; দাঁত উঠিবার সময় অস্থখ; দাঁত পোকাৰ বয়ান (Caries) দৰূণ দন্তশূল; গৰ্ভাবস্থায় বমন বা বমনোৰোগ; অজীৰ্ণ বা পেটেৰ অস্থখ; জ্বৰাশু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্ৰাব; খেত প্ৰদৰ; শৰীৰ চুলকানি; বহুমূত্ৰ ইত্যাদি রোগে ক্রিয়াজোট্ ব্যবহাৰ্য্য ।

বিশেষ প্ৰাকৃতিক লক্ষণ । সান্নাতিৰ্হৰলতা এবং বলক্ষয়; প্ৰাতে নিয়মিত সময়ের পূৰ্বে ঘুম ভাঙিলে শৰীৰ অবসন্ন হয়; সকল প্ৰকা-
রেৰ রক্তস্ৰাব; সামান্য ণ বা ক্ষত হইলেও উহা হইতে অতিরিক্ত রক্ত
স্ৰাব হয় (ফস); শৰীৰেৰ স্থানে স্থানে অবশবোধ এবং স্পৰ্শজ্ঞান থাকে
না; শীত শীত শৰীৰ শীৰ্ণ হয়; শ্লেষ্মিক ঝিল্লীৰ উপৰিভাগে ছান উঠিয়া

বাওয়া বা কত হওয়া (হাইড্রাটস)। প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাতে, বহির্কায়দে, পরীর ঠাণ্ডা হইলে, গার ঠাণ্ডা লাগিলে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, ঠাণ্ডা জ্বাখাইলে, অথবা বিশ্রামে অস্থির হুঁকি এবং উষ্ণ প্রয়োগে বা উত্তাপে বা নড়া চড়াতে অস্থির উপশম ইত্যাদি ক্রিয়াজোটার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। বৃদ্ধ জীলোক, লম্বা ক্রবাক বিশিষ্ট রোগী গণের চিকিৎসার ক্রিয়াজোট হারা বিশেষ উপকার দর্শে।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। কার্কে। বেজিটেবিলিস্, কার্কে। আনি-মেলিস্, মার্কিউরিয়াম্ এবং-পিট্টোলিয়ারের কার্কে।র সঙ্গে ক্রিয়াজোটার কার্কে।র বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে আণ্টিমোনিয়াম্ টার্ট্, আর্সিনিক্, কার্কে।লিক্ আসিড্, ক্যাল্কেরিয়া কার্কে।, গ্রাফাইটস্, হিগার সাল্ফিউরিস্, ইপিকাকিউএনা, আয়োডিন্, নাইট্রিক্ আসিড্, কফরাস্, সাল্ফারের কার্কে।র সঙ্গেও ইহার কার্কে।র সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট, আর্সিনিক্, চারনা, ইপিকাকিউএনা, নাক্স-বমিকা।

ডাইলুশন বিচার। বমন, বমনোধগ এবং জরায়ু হইতে রক্ত-স্রাব বা শ্বেত প্রদরে ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাঃ ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। টেষ্টের (Teste) মতে দস্তশূলে ১২ ক্রম এবং শিশুগণের দাঁত উঠার সময়ের অস্থি ২৪ ক্রম বিশেষ উপকারী। আমরাও টেষ্টের মতে ১২ এবং ২৪ ক্রম ব্যবহার করিয়া উক্ত দুই প্রকার অস্থি বিশেষ ফল পাইয়া থাকি। শিশু-গণের পিতা মাতার পরমীর ব্যারামের দক্ষণ পরমীর ব্যারাম বা অল্প কোন অস্থি হইলে ১২ বা ৩০ ক্রম বিশেষ উপকারী। বহুমূত্রে ৩ ডাঃ উপকারী।

লেডাম্ পেলাস্ট্রি,-লেডাম্

(LEDUM PALUSTRE,-LED.)

ইউরোপের উত্তরাংশ, ফ্রান্স্, আসিয়া এবং আমেরিকাতে এই গাছ জন্মে। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাল এবং পাতা যথা নিম্নে রেকটিকাইড্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। শরীরের স্নায়ু (Serous), অণ্ডাশাল এবং স্নায়িক কিল্লী, অস্থির আবরণ কঠিন পর্দা (Periosteum) এবং চর্মে উৎপন্ন ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দ্বারা আক্রান্ত অংশে প্রবাহ জনিত সন্ধি বাতের দ্বারা লক্ষ্যাদি প্রকাশ পায়, উহাতে দূষিত পদার্থের সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হয় এবং উহাতে মন পদার্থের সঞ্চয় হয়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্বদা আপন অবস্থার অসন্তুষ্ট; বিষমতা; চিড়, চিড়, খিট্, খিট্ করা (ব্রাই, নাক্স-বন্)।

মস্তক। নেমা করিলে বেক্রপ হয়, সেরূপ মাথাঘোরা (নাক্স-মক্, ককিউলাস), বিশেষতঃ বহির্কায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে (আগারিকান, ক্যাক্-কার্ক, গ্লোনয়েন্, সিপিরা, সাল্ফ্); অবসন্নকারক শিরঃপীড়া; অভ্যন্তরীণ দগ্ধপিরা শিরঃপীড়া (বেল্, গ্লোনয়েন্)।

চক্ষু। চক্ষু আলোক সহ্য না হওয়া; চক্ষুর তারা বিকৃত (বেল্); চক্ষুদিয়া অঙ্গা উৎপাদক, ক্ষতকারক জল পড়া (আস্, ইউক্রেস্)।

কর্ণ। ঝড় তুফান বা সজোরে বাতাস বহিলে বেক্রপ হয়, কানে সেরূপ সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া (জেল্‌স্); কানে কম শুনা।

মুখমণ্ডল। মাতালদের বেক্রপ হয়, মুখমণ্ডল এবং কপালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রণের দ্বারা সেরূপ কুঁকড়ী; কপালে ভ্রণ (হিপ্-সাল্‌ক্)।

গলার মধ্য। গলার মধ্যে হ্রস্ব কূটানের দ্বারা বেদনা বা টাটানি।

পাকস্থলী। মুখ দিয়া জল উঠা (নেট্রাম্-কার্ক, নাক্স-বন্, পাল্‌স্); রাত্রিতে সামান্য পরিমাণে আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ হইলেও পেটে চাপা বা ভারিবেশ (চায়না, লাইকোপ্)।

হৃৎপিণ্ড। বক্ষাহির বায়ু প্রান্তের মধ্যদিকে ঠেলিয়া বা চাপিয়া ধরার দ্বারা অস্বস্ত হয়; হৃৎস্পন্দন; রক্তপ্রবাহ হেতু হৃৎস্পন্দন।

শ্বাসযন্ত্র। কাশি, বাহ্য আরম্ভ হওয়ার পূর্বে শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয় (আস্); গভীর শরবিষ্ঠিত থুণ্ থুণ্ কাশি এবং গলাদিয়া শ্বাস সংযুক্ত হওয়া অথবা উচ্চল লালবর্ণ ও ফোণযুক্ত রক্ত নির্গমন; ধূকেশ

মধ্যে আঁটাযোথ (আর্ম, সোবিলিয়া), নড়া চড়া এবং চলিয়া বেড়াইলে ঘাহার বৃদ্ধি হয়; খাসরোথ, ঘাহার দক্ষণ অত্যন্ত কষ্ট অমুভূত হয়; যুকে এবং বাহির উপরিভাগে জল বা পান বসন্তের জায় ফুকুড়ী।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে পৃষ্ঠদেশ এবং কোমর অত্যন্ত শক্ত হয়, বা বেদনায়ুক্ত হওয়ার দক্ষণ উহা নোয়ান যায় না (বার্বেরিস্, রাস্টক্স)।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । সন্ধিতে কঠিন পদার্থের সঞ্চার হেতু কঠিন আবেশের জায় অমুভূত হয় (কার্ক-কার্ক, ফস-আম্, মার্ক); হাঁটু এবং মণিরন্ধে চাপিয়া ধরার জায় বেদনা; ক্ষুদ্র সন্ধিবাত (আক্টিয়া-স্পিক্, কলোকিনাম্); বাতরোগ নিরাক হইতে আরম্ভ হইয়া উদ্ধাঙ্গে বিস্তৃত হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হয় এবং উহাতে স্পর্শজ্ঞান থাকে না। হাতের সন্ধি গুলিতে ছিঁড়িয়া ফেলার জায় বাতের বেদনা (ব্রাই, পাল্‌স্, রাস্টক্স, স্পাইজেল্); বৃদ্ধ বয়সে ঘেঁষাপ হয়, নাড়িলে অথবা কোন বস্তুর ধরিতে গেলে সেরূপ হাত কাঁপে; হাতের বৃদ্ধানুলীয়া প্রথম সন্ধিতে ছিদ্র করার জায় বেদনা; চাপিলে আঙ্গুলের হাড়ের আবরণ কঠিন পর্কা (Periosteum) বেদনায়ুক্ত হয়। চলিবার সময় হাঁটুর সন্ধির ক্ষীতি এবং চলিবার সময় উহাতে কসিয়া বা ঘাটিয়া ধরার জায় বেদনা (ব্রাই); চলিবার সময় হাঁটুর সন্ধি বহুক্ষণতাপ এবং কাঁপনি; হাঁটুর সন্ধিতে ছিঁড়িয়া ফেলার জায় বেদনা বা টাটানি; পা পিছলাইয়া বাইলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে ঘেঁষাপ হয়, পায়ের পাতার সন্ধিতে সেরূপ বেদনা, নড়া চড়াতে ঘাহার বৃদ্ধি হয় (আর্নিকা, ব্রাই), পায়ের পাতা হইতে হাঁটুর সন্ধি পর্য্যন্ত ক্ষীত হয় (আর্ম, ভিজিট্); পায়ের পাতার ভারি এবং ক্রান্তিবোধ ও উহা শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না; মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে ঘেঁষাপ হয়, চলিবার সময় পায়ের পাতার তলার সেরূপ বেদনা; পায়ের বৃদ্ধানুলীয়া মাথা অত্যন্ত ক্ষীত, কোমল এবং চলিবার সময় অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয়।

চর্ম্ম । সমুদয় শরীর, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল এবং কপালে মাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের জায় ফুকুড়ী; গায় অত্যন্ত চুলকানি বিশিষ্ট এবং ক্ষতকারক

ফুফুড়ী, চুলকাঁইলে এবং বিছানার উকতাতে বাহার বুদ্ধি হয় (বার্ক); গায় ফুফুড়ী বাহা পোকাধ কামড়াইলে বেরুণ হয়, সেরুণ শূণ্য এবং আশা করে (আন্টি-কুড্, এন্টিস্, আর্নিকা) ।

নিদ্রা । নিদ্রাশূন্যতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বিছানার বাহরবার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করা; ঘুমেরঘোরে নানা বিষয়ে স্বপ্নদেখা এবং স্বপ্নে নানা দিকে যাওয়া ।

জ্বর । শীতবোধ; শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপের অভাব (সিপিরা, সাইলিসি); অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত এবং পায়ের পাতার আগায়ুক্ত উষ্ণাশুভর, বাহার দরুণ উত্তাপ একবারে অসহ্য হইয়া পড়ে (সাল্‌ফ্); সামান্ত শরীরিক পরিশ্রমেই ঘর্ম হয়; (আম্‌স্, ক্যাল্‌ক-কার্ক্, হিপ্-সাল্‌ফ্, কন্‌স্, সিপিরা, সাইলিসি); ঘর্ম কপালৈই অধিক হয়; হাত এবং পায়ের পাতার উষ্ণ ঘর্ম হওয়া; ঘুমেরঘোরে ঘর্ম এবং সমুদ্র শরীরে চুলকানির দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া; রাত্রিতে ঘর্ম হওয়া এবং উহার সঙ্গে গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেওয়ার ইচ্ছা ।

ব্যবহার । কীট, বিশেষতঃ মশার কামড়ের দরুণ অস্থখ; অস্ত্র দ্বারা কাটা ঘা; মদ্যপান জনিত অস্থখ; সকল প্রকার বাত এবং সন্ধি বাত জনিত অস্থখ; ত্রণ; রক্তত্রণ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রণ; গায় দাঁদের জ্বাঘ এবং অন্তান্ত প্রকারের পুরাতন আকারের ফুফুড়ী; শোথ ইত্যাদি রোগে লেডাম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । মারিলে বা খেংলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে বেরুণ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেরুণ বেদনা; বেদনাদি এক স্থান হইতে অন্তস্থানে হঠাৎ সরিয়া পড়ে (বেজ্-আন্‌, ক্যালী-বাই); আক্রান্ত অঙ্গ বা স্থান অত্যন্ত শীর্ণ হয় (প্রোফ্); আক্রান্ত স্থানে শোথের জ্বাঘ ক্ষীতি (এন্টিস্, আন্‌স্, রাস্-টক্); চলিবার সময় পা যথাস্থানে না পড়িলে মাথার ঝাকি লাগিয়া যেন সন্তিকের কার্য্যাবরোধ হয়। উত্তাপ, বিশেষতঃ বিছানার উত্তাপ, নড়া চড়া, রাত্রিতে এবং মদ্যপানে অস্থখের বুদ্ধি ইত্যাদি লেডামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । লেডামের কার্য্যের সঙ্গে রাস্-টক্,

আধিকা, ক্রোটন, পালসেটিনা এবং কটোর কার্যের অনেক সাদৃশ্য আছে।
এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আর্সিনিক, বেল্যাডোনা,
ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ক, চায়না, লাইকোপডিয়াস, মার্কিউরিয়াস্-
করোসাইরাস্, সিপিগা এবং সাল্কারের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্ফার ।

ডাইলুশন বিচার । টেষ্টের (Taste) মতে ৬ষ্ঠ এবং ১২ ক্রম ব্যব-
হারে বিশেষ উপকার দর্শে। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ৩০ এবং
২০০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। বাহ্যিক
প্রয়োগে ইহার মূল আরোক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফাইসটিগ্‌মা,-ক্যালেরবার বিন্,-ফাইসক্ট্

(PHYSOSTIGMA,-CALABAR BEAN,-PHYSOST.)

ক্যালেরবার বিনের বিচি যথানিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে ভিজাইয়া
মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । কসেটিকা মর্জ্জা দিয়া ফাইসটিগ্‌মা সার্বজনিকপক্ষা-
ঘাত উৎপাদন করিয়া আক্রান্ত অংশের জ্ঞান উৎপাদক শক্তি রহিত করে
এবং শ্বাস বস্ত্রের পক্ষাঘাত এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যের উত্তেজনার সহায়কারী
গ্যাংগ্লিয়ার (Ganglia) পক্ষাঘাত হেতু হৃৎপিণ্ডের কার্যের হ্রাসের দ্রুণ মৃত্যু
হয় এবং এমতাবস্থায় মৃত্যু পর্যন্ত সকল রোগীরই স্পর্শজ্ঞান এবং চেতনা
শক্তিতে কোন প্রকারের বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা প্রথমতঃ দ্রুত
দ্রুত রক্তবাহা নালীর সংকোচন ও তৎপরে উহার বিস্তৃতি উৎপাদন করে
এবং আত্যন্তরিক প্রয়োগে চক্ষুর তারা সংকুচিত হয়। ইহা চক্ষুর দূরবর্তী
এবং নিকটবর্তী বস্তু দেখিবার শক্তি হ্রাস করে। শ্বায়ুর গতি উৎপাদক
শক্তির পক্ষাঘাতের দ্রুণ স্থানিক উত্তেজনা হেতু পেশী স্পন্দন উৎপন্ন
হয়। উক্ত কারণে অনিচ্ছা পূর্বক পেশী সঞ্চালনের সহায়কারী পেশী গুলি
ধ্বংসকারের হ্রাস অবস্থা প্রাপ্ত হয়, বাহার দ্রুণ মৃত্যুসাধন, পাকস্থলী এবং অন্ত্র

হইতে মূত্র, উদরস্থ আহার জব্যাদি এবং মল বারবার নির্গত হয় এবং অঙ্গ জড়িত হইয়া একটি গাঁইটের (Knot) ভায় আকার ধারণ করে। ইহা সকল প্রকার নিঃসর্গের, বিশেষতঃ চক্ষের জল এবং লালের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ইহা চক্ষের দূরের বস্তু দেখিবার শক্তির অনেক হ্রাস করে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ :

মন । অসাধারণ মানসিক বা চিন্তা চাকলা (চায়না, কফিয়া); কোন বিষয়ে চিন্তা করায় অশক্তি; কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট না হওয়া (জেলন্স); মনে হয় যেন সমুদয় গোলমেলে হইয়া রহিয়াছে; রোগী মনে করে যেন তাহার ঘরে অনেক জিনিশ রহিয়াছে বাহা সে বারবার গণিতে থাকে।

মস্তক । মাথার গোলমেলে বোধ এবং মাথা বিম্ব বিম্ব করা; মাথার ভারি এবং চিমা বোধ; মাথাধরা এবং মাথার চিমা এবং ভারি বোধ; দুই চকুর উপরিভাগেই অসহ্য বেদনা (চায়না, চিনিলাম-সাল্ফ.); কপালে উন্নয়নক বেদনা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে (ক্যালী-বাই, নেট্রাম্ মিউর, নাক্স-বম্); কপালে এবং কপালের দুই পার্শ্বে ও কর্ণের পশ্চাৎ ভাগে যেন রক্ত সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (বেল্ স্পোনয়েন্); কপালের দুই পার্শ্বে খোঁচাবিধার ভায় প্রবল বেদনা; টেম্পোরেল্ (Temporal) এবং ক্যারোটিড্ (Carotid) ধমনিতে দপ্ দপানি (বেল); মাথার ঠিক উপরিভাগে এবং কপালের দুই পার্শ্বে অত্যন্ত কষ্টদায়ক চাপাবোধ; মাথার উপরিভাগের চাপাবোধ মাথার পশ্চাৎ ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বাহ্যর দরুণ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়।

চক্ষু । প্রথমতঃ ডাইন এবং তৎপর বাম চক্ষু প্রদাহযুক্ত হয়; চক্ষুর খেতাংশ লালবর্ণ, শুষ্ক এবং ক্ষীণ; চক্ষুর গোলক বেদনায়ুক্ত হয় এবং উহাতে জ্বালা অনুভূত হয়; চক্ষুর পাতা যেন জ্বালা করে; চক্ষে খোঁচা বিধা, কসিয়া ধরা বা মোচড়াইয়া পড়ার ভায় বেদনা; চক্ষু টাটায় এবং চক্ষু এক পাশ হইতে অত্র পাশে ঘুরাইলে অত্যন্ত বেদনার উদ্বেক হয় (ব্রাই, স্পাইঙ্গেল); চক্ষু অত্যন্ত দুর্বল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিবা জল পড়া; চক্ষে ঝাপসা বা কুশাশার ভায় দেখা (কষ্ট, কন্স, মার্ক);

চক্ষুর সম্মুখে বেন কাল দাগ ভাসে (পাল্‌স্); চক্ষে বেন একবারে নানা ঔকারের মিশ্রিত পদার্থ দেখার এবং তৎপর চক্ষুর উদ্বিগ্নতাগে ও চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে ঘুসুঘুসে বেদনা; চক্ষুর সম্মুখে কাল এবং সাদা দাগ বেন ভাসে; চক্ষুর কোটরের পশ্চাত্তাগে কনকনানি বাহা মাথার পশ্চাত্তাগে মস্তক পর্যন্তও বিস্তৃত হয় এবং বাহা পুস্তকাঙ্কি পাঠ করিলে বৃদ্ধি হয় ও বাহার দরুণ বমনোদ্বেগ হয়; চক্ষুর পাতার স্পন্দন (আগারিকান্); চক্ষুর তারার সঙ্কোচন (ওপিয়ন্, বার্ক-কর, কন্, ফাইটোল্); চক্ষে আলোক-মন্ডল হয় না (একন্, বেল্, লান্‌ক্); চক্ষে ঝাপ্সা দেখা; দূরের বস্তু দেখিতে অশক্তি (Myopia); দৃষ্টি অস্বাভাবিক রূপে তীক্ষ্ণ; এক বস্তু দুইটির জায় দেখায়; চক্ষে গোলমলে বোধ এবং কুরাশার মধ্য দিয়া তাকাইলে ঘেরুপ হয়, চক্ষে সরুপ ঝাপ্সা দেখায় ।

কর্ণ । কানে খোঁচা বিধার জ্বর প্রবল বেদনা; কানের মধ্যে হিস্-হিস্, বজ্‌বজ্ এবং টন্‌টন্ শব্দ হওয়া ।

নাসিকা । তরল সর্দী এবং তদরুপ নাক দিয়া জলের জ্বর তরল শ্লেষ্মা নির্গমন ও ঝাঁচি দেওয়া; নাসারন্ধ্রের মধ্যে জ্বালা, চিড়িক মারা, চুলকানি এবং কুট্‌কুট্‌ করা; নাসারন্ধ্র রক্ত এবং উষ্ণ; নাসিকার স্পন্দন এবং নাসারন্ধ্রের অনিচ্ছা পূর্বক বিস্ফুতি ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা; মুখমণ্ডল লাগবর্ণ এবং উহাতে উচ্চাশ্রুভব (কেরাম্); মুখমণ্ডলের ডাইন পার্শ্বে শ্রাবুশুলের জ্বর বেদনা; মুখ মণ্ডলের ডাইন পার্শ্বের সঙ্কোচন ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষত, টাটানি এবং উহাতে থসুথসে বোধ; জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা এবং চিড়িকমারা, বাহার দরুণ মনে হয় যেন জিহ্বা পুড়িয়া গিয়াছে (আইরিস্); জিহ্বা পুরু লেপযুক্ত, বিশেষতঃ উহার গোড়া; জিহ্বা এবং ওষ্ঠে অবশ বোধ এবং কুট্‌কুটানি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা এবং ওষ্ঠে অনবরত তিজাইয়া মাথার ইচ্ছা; মুখে বিষাদ; মুখে প্রচুর পরিমাণে জল উঠা; মুখে গাঢ় এবং চট্‌চটিয়া আঠা থুথ্‌ উঠা; কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্টাশ্রুভব (কেষ্ট, কোনায়াস্, জেল্‌স্, হায়োস্); গিলিবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত কথা

বলিবার শক্তি থাকে না। গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি, বাহার দক্ষণ গিলিতে কষ্টানুভূত হয়; টন্সিল (Tonsils) এবং কোমল ভাদুক কালচে লালবর্ণ; গলার মধ্যে আঁগা এবং টাটিয়া ফেলার ভায় অহুত হয়; আলজিরা লম্বা হয়; আহাৰ বহানালীর ঠিক উপরিভাগের দুই পার্শ্বে হরিজা কেন্দ্র বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত; গলার মধ্যে বেদনা বাহার গিলিবার সময় বাম কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (ফাইটোল); মিয়দিক হইতে গলার মধ্যে ঘেন একটি গোলার ভায় পদার্থ তৈলিয়া উঠিতেছে একরূপ অহুত হয় (আসাকিটিডা, লাইকোপ); হরাহির নিয়ন্ত্রিত লাল নিঃসারক গ্রাহির ক্ষীতি এবং উহাতে বেদনা।

পাকস্থলী এবং উদর। ক্ষুধা থাকে না; আহাৰে অরুচি; ভাস্যাদি এবং ঠাণ্ডা জলাদি পানে অরুচি; বাদশূল উল্লার উঠা, বমনো-ধ্বং এবং বমন; পাকস্থলীতে কাঁটা বিধানের ন্যায় প্রবল বেদনা; উদরস্থ আহাৰ জ্বায়াদি হজম না হইলে বেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ ভাববোধ; পেট কামড়ানি; পেটে খালি এবং দুর্বল বোধ; অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা এবং তদ্রূপ শরীর কম্পন; পাকস্থলী প্রদেশে টাটানি; উদরের দুই পার্শ্বে ছুরি বিধানের ভায় বেদনা; গ্ৰীহা প্রদেশে কঠিন বোধ এবং টাটানি; উদরের বাম পার্শ্বে স্থলী বিধানের ন্যায় অহুত হয়; উদর অত্যন্ত ক্ষীত, বিস্তৃত এবং উহাতে অত্যন্ত কল্কল, গড়গড় শব্দ হয় ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্বার দিয়া অধিক পরিমাণে দুবিভ বায়ু নিঃসরণ (আলোজ, লাইকোপ); উদরে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা, বাহার দক্ষণ মনে হয় ঘেন উদারায় হইবে (আলোজ); তলপেটে কর্তনবৎ প্রবল বেদনা; কঁচুকিতে যুসুসে বেদনা।

মল এবং মলদ্বার। গুহ্বের স্ফোটক ঘর (Sphincter Ani) ক্ষীত এবং শক্ত হয়; মলত্যাগের সময় অত্যন্ত কষ্টানুভব; গুহ্বার দিয়া গুহ্ব বাহির হইয়া পড়ে এবং তদ্রূপ গুহ্বক্ষীত ও অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয়; অর্শরোগ এবং গুহ্বদ্বারে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত বলী, কৌথপাড়া, গুহ্বদ্বারে অত্যন্ত জ্বালানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরায়; প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত কৌথপাড়া (মার্ক-কর); প্রচুর পরিমাণে কোমল জলবৎ তরল, হরিজার

আত্মায়ুক্ত, পিত্তযুক্ত কটাবর্ণের এবং আল্ কাভরার ভ্রায় কাল মলভাগ ;
অধিক পরিমাণে কালচে হর্গন্ধযুক্ত মলভাগ ; কোষ্ঠবদ্ধ ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রকোষে মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁতলিয়া বাওয়ার
ভ্রায় বেদনা ; মূত্রাধার যেন স্ফীত এবং বিস্তৃত হইয়াছে এরূপ অস্বভূত হয় ;
বারম্বার অধিক পরিমাণে মূত্রভাগ (কন্-আন্স) ; মূত্র হরিদ্রাবর্ণ, লালবর্ণ
এবং উগ্রগন্ধযুক্ত ; মূত্র পরিষ্কার ; মূত্র ঘোলাটিয়া ।

জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীলোকের খেঁতপ্রদর ; ভ্রায় হইতে অতিরিক্ত
পরিমাণে রক্তস্রাব ; তলপেটে প্রবল বেদনা, বাহার দরুণ যেন ■■■ যেন
রক্তস্রাব আরম্ভ হইবে ।

শ্বাসযন্ত্র । গলার মধ্যে হুড়-হুড়ীর দরুণ কাশি ; শ্বাস প্রবাস
কষ্টকর এবং দীর্ঘ ; হাঁইতোলা ; বৃকে সূচী বিধানের ভ্রায় যাতনা ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে ঘুণ্-ঘুশে বেদনা এবং কঠা-
হ্রস্ব (ডিলিট) ; হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন (একন্, ক্যাক্ট) ; হৃৎপিণ্ডের
অত্যন্ত প্রবল শব্দ বিশিষ্ট অনিয়মিতরূপে দগ্ধপানি (ডিলিট) ; নাড়ীর
অবস্থা সকল সময়ে এক প্রকার থাকে না ; নাড়ী ক্রতগামী, ক্ষুদ্র, মৃদুগতি
বিশিষ্ট ও হ্রস্ব এবং অসম (Intermittent) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় শক্ত হয় বা উহা ন্যূনমান বার না ;
ঘাড়ের বাতের বেদনার ভ্রায় বেদনা ; পৃষ্ঠদেশ অত্যন্ত হ্রস্ব, বাহার দরুণ
রোগী সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না ; পৃষ্ঠদেশে ঘুণ্-ঘুশে বেদনা ;
নাথার পশ্চাৎদেশ হইতে হানা দেওয়ার ভ্রায় অবশবোধ আরম্ভ হইয়া
সেবকগণে বিস্তৃত হয় ; ডাইন স্ক্যাস্থির নিম্নপ্রদেশে বেদনা (চেলিডন্) ;
কোমর প্রদেশে ভ্রায়বোধ এবং ঘুণ্-ঘুশে বেদনা ; বায় কুঁচকী বা উকর,
সন্ধিতে ভ্রায়বোধ এবং ঘুণ্-ঘুশে বেদনা যাহা পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ;
শুষ্ক হারের ঠিক উপরিভাগে বেদনা, নড়া চড়াতে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । অনেককণ চলিয়া বেড়াইলে ঘেঁষণ হয়, অঙ্গ
প্রত্যঙ্গে সেকণ স্ফাতিবোধ (ক্যাক্-কার্ক, চায়না) ; সমুদয় অঙ্গ একত্র
গন্ধাঘাতের ভ্রায় অবশ এবং অসাড়বোধ (একন্) ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দারুণত্বের
ভ্রায় বেদনা ; খেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে ঘেঁষণ হয়, সমুদয়

সন্ধিতে সেরূপ শক্তিবোধ এবং উহা সঞ্চালনের সময় উহাতে বেদনামুভব ; চলিবার সময় পা টলে বা কাঁপে ; চলিবার সময় যেন হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়ে, চক্ষু বুজিয়া চলিবার সময়ই উহা অধিক অমুভূত হয় ।

নিদ্রা । ঘুমের অনিবার্য ইচ্ছা ; অজ্ঞানের দ্বার ঘুমান (ওপিয়াম) ; অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল না হওয়া এবং ঘুমেরবোরে স্বপ্ন দেখা ।

জ্বর । পৃষ্ঠদেশে যেন হামা দিয়া লীত চলিয়া বাইতেছে এরূপ অমুভূত হয় ; হাত এবং পায়ের পাতা ঠাণ্ডা (সাইলিসি, রিগেট্-আব) ; শরীরের বর্ষ ঠাণ্ডা এবং চট্‌টটিয়া আঠা ; মাথা এবং মুখমণ্ডলে উষ্ণামুভব ও উহা লালবর্ণ এবং উষ্ণ ; হাতে শুষ্ক এবং জালাযুক্ত উষ্ণামুভব ; সামান্ত কারণেই বর্ষ হয় ; সমুদয় শরীরে শিশিরের দ্বার বিন্দু বিন্দু ঠাণ্ডা বর্ষ হয় ; জননেত্রিয়ের চতুর্দিকবর্তী স্থানে উগ্র গন্ধযুক্ত বর্ষ হয় ।

ব্যবহার । পক্ষাঘাত ; ধুইকার ; কোরিয়া (Chorea) ; লোকাটো-টার আটাক্সী (Locomotor Ataxy) ; পাগলদিগের সার্বজনিক পক্ষাঘাত এবং ক্রমাগত পেশীকম্প ; দূরের বস্তু দেখিতে অশক্তি (Myopia) ; নিকটের বস্তু দেখিতে অশক্তি ; চক্ষুর পাতায় আক্ষেপ এবং তদ্রূপ উহার স্পন্দন ; চক্ষু গোলকের বিবৃদ্ধি এবং উহার সঙ্গে কর্ণিয়া বাহির হইয়া পড়া ও দৃষ্টি-হীনতা (Staphyloma) ; গ্লকোমা (Glaucoma) ; চক্ষুর আইরিস্ (Iris) বাহির হইয়া পড়া বা স্থান ভ্রষ্ট হওয়া ; কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea) ; কর্ণিয়াতে ক্ষত ; কেরাটাইটিস্ (Keratitis) ইত্যাদি অন্তর্গত ফাইসটিগ্য়া ব্যবহার্য্য ।

-বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত ক্লান্তি এবং প্রান্তিবোধ এবং দুর্বলতা (আস্, চায়না) ; অঙ্গাদির আক্ষেপিক স্পন্দন (আগারিকান্স্, সিকুটা, ট্রায়মন্) ; সমুদয় শরীরের প্রবল কম্পন (আণ্টি-টার্ট) ; পেশীর অত্যন্ত বলকম্প ; ঠাণ্ডা কলের অত্যন্ত তর, বাহার দ্রুত স্নান করিতে ইচ্ছা যায় না ; ঠাণ্ডা লাগিলে ঘেঁরু হয়, সমুদয় শরীরে সেরূপ টাটানি এবং শক্তিবোধ ; শরীরের স্থানে স্থানে প্রবল বেদনা ; প্রাণকালে, অঙ্গ চালনা, শরীরের স্থানে স্থানে প্রবল বেদনা ; বহির্বাৎসর্য্য এবং শয়ন করিয়া থাকিলে, চক্ষু বুজিলে, হৃৎকরিয়া থাকিলে, উষ্ণ বস্তুতে স্পর্শ করিলে, ইত্যাদি

অস্থির উপশম ইত্যাদি এই ঔষধের কতকগুলি বিশেষ ঔষুতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । জৈল্‌সিনিয়াম্, ব্যারাইটা, আসিটিকা, মাকেরিয়া, বাবোরাস্তি, আটোপিয়া, ওপিয়াম্ এবং ট্র্যামোনিয়ামের কার্যের সঙ্গে ফাইসটিগ্‌মার কার্যের অনেক সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । লেখক স্বয়ং এই ঔষধ অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই । অতএব কোন ক্রম কোন রোগে কিরূপ উপকারী তিনি সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না । চক্ষের পাতার স্পন্দনে কেবল একটা রোগীর চিকিৎসায় প্রথমতঃ ৩য় এবং তৎপরে ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন ।

ইউরেনিয়াম্ নাইট্রিকাম্,-নাইট্রেট্ অব্ ইউরেনিয়াম্,-ইউরেন-নাইট্

(URANIUM NITRICUM,-NITRATE OF URANIUM,-URAN.-NITR.)

কোন এক বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত নাইট্রেট্ অব্ ইউরেনিয়াম্ ক্রয় করিয়া বথানিয়মে চূরান জলে (Distilled Water) মিশাইয়া ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয় । ২য় দশমিক ক্রমের আরোক বথানিয়মে ডাইলুট্ আল কোহলে এবং ততোধিক ক্রমের আরোক সেকুটিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে । বথানিয়মে স্নায়ু অব্যবস্থার সহিত মিশাইয়া ইহাও গুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মূত্রকোষের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দ্রুত উক্ত যন্ত্রের পচন এবং ধ্বংস দেখিতে পাওয়া যায়, বাহার দ্রুত অধিক পরিমাণে মূত্রের সকার হয় এবং মূত্রে আল্‌বুমেন (Albumen) ও শর্করার (Sugar) সকার হয় । ইহা মূত্রের পরিমাণ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) বৃদ্ধি করিয়া উহার উগ্রতা বা ক্ষতকারক গুণ উৎপাদন

করে । এই কারণে মূত্রের সঙ্গে প্রায়ঃ স্রাব পদার্থ নির্গত হয় এবং মূত্র
ধারণে অশক্তি হয় । বহুমূত্র এবং মূত্রকোষের আইট্‌স ডিজিজ্‌ নামক রোগে
ইহা বিশেষ উপকারী । ডাক্তার হিউজ্‌ (Dr. Hughes) বলেন যে, যে
প্রকার বহুমূত্র অক্লীর্ণ জনিত হয়, কেবল তাহাতেই এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।
বহুমূত্র যদি দ্বারবিক মণ্ডলীর অসুখের দরুণ উৎপন্ন হয়, তবে তাহাতে
কফরিক্‌ আনিড্‌ বিশেষ উপকারী । যেপ্রকার বহুমূত্রে রোগী অতি লীজ
লীজ রক্ত বা শীর্ণ হয় এবং ভোগী অভ্যস্ত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাহার উদরী
বা সার্কারিক শোথ হয়, তাহার পক্ষে ইউরেনিয়াম্‌ নাইট্রিকাম্‌ বিশেষ
উপকারী । আর্সিনিক্‌, মার্কিউরিয়াম্‌ কবোসাইবাস্‌, আর্জেন্টাম্‌ নাইট্রি-
কাম্‌, ফফরাস্‌, ফফরিক্‌ আনিড্‌ ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সঙ্গে এই
ঔষধের কার্যের অনেক সাদৃশ্য আছে । লেখক এই ঔষধের ১ম দশমিক
ক্রমের আরোক ২১০ ফোঁটা মাত্রায় সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন ।
কোন কোন চিকিৎসক আদত নাইট্রেট্‌ অব্‌ ইউরেনিয়াম্‌, ১ গ্রেইণ
মাত্রায় চুয়ান জলে নিশাইয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ।

এথুজা সায়েনপিয়াম্‌,-এথুজা

(ÆTHUSA CYNAPIUM,-ÆTHUSA-C.)

ইউরোপের প্রায় সমুদয় স্থানেই এই গাছ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে ।
এই গাছের কাঁচা সমুদয় অংশই যথানিয়মে এক্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া দুই
আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা এক ভয়ানক মস্তিষ্ক অবসন্নকারক বিষ
বিশেষ । ইহা প্রথমতঃ মস্তিষ্কের জ্ঞান উৎপাদনের সহায়কারী
অংশকে আক্রমণ করে এবং মস্তিষ্ক দিয়া বহুত আক্রমণ করিয়া
উহার কার্যের বৈলক্ষ্য্য উৎপাদন করে, যাহার দরুণ বহুতের নিঃসরণ
উৎপাদনের ব্যাঘাত করে এবং তৎফল পিত জনিত নানা প্রকারের অসুখ
হইয়া থাকে । যে প্রকার অসুখে, বিশেষতঃ শিশু এবং ছোট বাগক

বালিকাগণের, হৃৎ সঙ্ঘ না হয় এবং হৃৎ উদরস্থ হওয়া মাত্রই গলা দিয়া উঠিয়া পড়ে, সে প্রকার অস্থি এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । কোন বিষয়ে চিন্তা করাতে অশক্তি ; মনে গোলমালে বোধ (জেল্‌স্, ব্যাপ্ট্, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, কন্‌-আন্‌) ; মনের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং অস্থিরতা (একন্‌, মার্ক্‌, আস্‌, রাস্‌-টক্স্) এবং তৎপর মাথা ও উদরে অত্যন্ত বেদনা ; চিড়্‌ চিড়্‌, থিট্‌ থিট্‌ করা ; সর্বদা চটী ভাব (ব্রাই, ক্যাম্‌, নাক্স-বম্) ; প্রলাপ, সর্বদা প্রলাপের অবস্থায় বিভ্রাণ কুর্কুর ইত্যাদি দেখা ; ঘরের জানালা দিয়া লাকাইয়া পড়ার চেষ্টা করা ।

মস্তক । মাথায় গোলমালে বোধ ; মস্তক যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় ; মাথাবোঁরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘূমের ভাব বা হুঁকা ; মাথা সোজা ভাবে রাখিতে অশক্তি ; মাথার পশ্চাৎভাগ এবং ঘাড়ের অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা ; মনে হয় যেন মাথার পার্শ্ব কোন একটা কঠিন পদার্থের উপর লাগিয়া রহিয়াছে (মার্ক্‌) ।

চক্ষু । চক্ষুর তারি বিস্তৃত (এইলাছ্, বেল্‌, হায়োস্, ওপিয়াম্, ষ্ট্রামন্‌) ; চক্ষে অত্যন্ত তারিবাধ ; চক্ষু যেন উজ্জ্বল এবং বহির্দিকে আকৃষ্ট (বেল্‌, হায়োস্, ষ্ট্রামন্‌) ; গগুমালী জনিত চক্ষু প্রদাহ ; চক্ষুর পাতায় প্রদাহযুক্ত এবং রাজিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা (আলাম্‌, ক্যাক্‌-কার্ক্‌, লাইকোপ্‌, মার্ক্‌, পাল্‌স্, সাইলিস্, সাল্‌ক্‌) ; চক্ষুর পাতায় উপাধি এবং চক্ষুর যোজক স্কেলের মধ্যবর্তী মিবেমিয়ান্‌ নামক গ্রন্থির (Meibomian Glands) ক্ষীতি ।

মুখমণ্ডল । নাসারন্ধ্রের মধ্যবর্তী উপাধির জার অংশে কসিয়া ধরার জার যাতনা, যাহা ওষ্ঠের কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যাহার দক্ষণ মুখমণ্ডল উদ্বিগ্ন বা যাতনার চিহ্নযুক্ত বলিয়া দেখায় ।

মুখগহ্বর । জিহ্বা আর্দ্র ; মুখে বিরক্তি জনক তিক্তবাদ ; মুখ-গহ্বর এবং গলার মধ্যে ক্ষত ।

পাকস্থলী এবং উদর । পেটে হৃৎ সঙ্ঘ হয় না ; হৃৎ উদরস্থ

হইতে না হইতেই গলাদিয়া ঠেলিয়া উঠিয়া পড়ে এবং তৎপর দ্রুতগতির দ্রুণ বেন ঘুম পায় ; হৃৎপোষ্য শিশুর হৃৎ সঙ্ক হইয়া না ; প্রবল বমন হারা উদরস্থ হৃৎ দধির জ্বার (আইরিস্) বা পনিরের জ্বার পদার্থের আকারে উঠিয়া পড়ে ; পাকস্থলীতে এত প্রবল সঙ্কোচনের উদ্বেগ হয়, যে উহার দ্রুণ বমনের ব্যাধাত জন্মে ; উদরোজ্জ্ব প্রদেশে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ, উদরে (আস্থ্রা) এবং নিম্নাঙ্গে ঠাণ্ডাবোধ ; উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত (মার্ক্, চায়না) ; শূল বেদনা এবং তৎপর বমন, মাথাধোরা এবং দ্রুতগতি ।

মল । উদরাময় ; মল উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ (চেলিডন্), অথবা সবুজের আভাযুক্ত জলবৎ তরল এবং চট্‌চটিয়া আঠা ও মলত্যাগের সময় অত্যন্ত কৌথপাড়া (মার্ক্) ; অনিবার্য কোষ্ঠবদ্ধ ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বাস প্রাথমী অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং ঘন ঘন ; বৃক্কের বাম পার্শ্বে স্ফীতিবিশিষ্ট জ্বার বেদনা বা বাতনা ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন ; নাড়ী পূর্ণ এবং ক্রতগামী ; নাড়ী কঠিন, ক্ষুদ্র এবং ক্রতগামী ; নাড়ী অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট এবং প্রায় অহতুত হয় না ।

ত্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । মাথার পশ্চাত্তাগ এবং ঘাড়ের অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা, যাহা মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

নিদ্রা । বমনের পর রোগীর (শিশু) নিদ্রাবেশ (আক্টি-টার্ট্) ; দান্তের পর রোগীর নিদ্রার ভাব (নাক্স-মক্) ; ঘুমাইয়া পড়ার পর চক্ষু খুঁয়াণ বা চক্ষুর সামান্য আক্ষেপ ।

ব্যবহার । পিত্তাধিক্য এবং বিকারের অবস্থা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ার প্রাকৃতিক লক্ষণ ; পেটের অস্বস্তি ; ত্রীয় কালীর উদরাময় ইত্যাদি ; শিশুগণের দাঁত উঠার সময় আক্ষেপ এবং অস্বস্তি অস্বথে এথুজা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । যুগীর জ্বার আক্ষেপ ; মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ; চক্ষু নিম্নদিকে উল্টান ; চক্ষুর ভাঙ্গা বিস্তৃত, স্থিরভাবে বিশিষ্ট এবং অচল ; মুখে ফোণা উঠা ; দাঁত লাগা ; নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিন এবং ক্রতগামী ; অত্যন্ত দ্রুতগতি, শিশু, বালক বালিকাগণ দাঁড়াইতে পারে না এবং মাথা

সোজা করিয়া রাখিতে পায় না; প্রাতঃকালে, রাত্রিতে, আহারের পর, বলা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে, স্নান করিলে এবং পতীর নিষাদ টানিলে অঙ্গের ব্যক্তি এবং বহির্বিদ্যুতে, নিজের পর, পশ্চাত্তিকে বাকিলে, নড়াচড়াতে অঙ্গের উপর ইত্যাদি এখুয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ। গ্রীষ্মকালের অঙ্গের এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। বিবাক্ত কবার গুণ সম্বন্ধে এখুয়ার ক্রিয়া অনেকটা সিকুটা বিরোগা এবং ইনাছি কোকেটায় ক্রিয়ার স্থায়। রোগ আরাম করার পক্ষে এখুয়ার কার্য অনেকটা সিষ্টাম, বোবিষ্টা, ক্রিমোটিন এবং মাল্কারের কার্যের স্থায়। এতদ্বির কোন কোন বিবর্তের ইহার কার্যের সঙ্গে আন্টিমোনিয়াম্, টাটারিকাম্, ক্যাডেরিয়া, কার্বোনিকা, কুপ্রাম্, নাক্স, মফাটার কার্যের সাধু আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। বমনের জন্য বিনিগার (Vinegar), অথবা সাইট্রিক-অসিড্ (Citric acid)। যত পরিমাণ বিনিগার বা সাইট্রিক অসিড্ উহাতে তত পরিমাণ জল মিশাইয়া সেব্য। পায়ের পাতার রাইয়ের পলস্তরা (Mustard-plaster) এবং বর্ষণ। প্রদাহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে একোসাইট্ ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। ঐ ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক ১, ৩, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আগ্নাস্ ক্যাস্টাস্,-আগ্নাস্

(AGNUS CASTUS,-AGN.-CAST.)

ভূমধ্য সাগরের তীরে এবং গ্রীষ্মদেশে এই গাছ জন্মে; বাগিচায় হান এবং পাখরের নিয়ম প্রদেপে এই গাছ জন্মে। পাকা ফল তাজা থাকিতে, বা জল দিনের শুকনা ফল দ্বারা ২০° ডিগ্রী ওয়ার প্রক্. স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । জননেত্রির উপর ইহার কার্য্য অতি অবশ্য । ইহা জননেত্রিকে উদ্বেজিত না করিয়াই অবসন্ন করিয়া ফেলে এবং ক্ষয়ক্ষয় পুরুষের ধ্বংস ও জীলোকের বক্ষাও উৎপাদন করে । এই ক্ষয় পুরুষ কালে পুরুষের জীসহবাসের ইচ্ছা এবং জীলোকের পুরুষ সহবাসের ইচ্ছা নিবারণ করার জন্য এই ঔষধ বাণ্যরান হইত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অত্যন্ত উন্মাদনকতা ; রোগী কোন বিষয় শরণার্থিতে পারে না (আনাকাৰ্ড, ক্রিয়াজ, মার্ক, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-মফ, কন্স-আল) ; হতাশ এবং বিমর্ষতা ; মানসিক অবসন্নতা ; মৃত্যু নিকটবর্তী বলিয়া ভর (একন, আস, সিমিসিক্) ।

মস্তক । মাথায় ছিঁড়িয়া ফেলার ভায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কপাল এবং কর্ণের পক্ষাংভাগে চাপাবোধ, নড়াচড়াতে বাহা বৃদ্ধি পায় ।

কর্ণ । কানের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হয় ।

মুখমণ্ডল । বকের মধ্যে কত কারক চুলকানি ; ডাইন নিরবাতীত নিম্নভাগে ছিঁড়িয়া ফেলার ভায় ভয়ানক বেদনা বা বাতনা ।

জননেত্রিয় । পুরুষের জীসহবাসের ইচ্ছার হ্রাস বা একবারে বিনাশ হয় (পাল্ফ) ; পুরুষাদি এত শিথিল হয় যে জী সহবাসের ইচ্ছা সঙ্গেও পুরুষাদি খাড়া হয় না (আগারিকান্, কোনারাম) ; অণ্ডকোষ ঠাণ্ডা, ক্ষীণ, কঠিন এবং বেদনায়ুক্ত হয় (একন, কোনারাম) ; পুরুষাদি ছোট এবং নরম বা শিথিল হয় (আর্জেন্ট-নাইট্রাস) ; পুরুষাদি কখন কখন সামান্য খাড়া হয় বটে, কিন্তু জী সহবাসের ইচ্ছা একবারেই থাকে না ; ধ্বংস ও উপর সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন আকারের প্রেমের রোগ (পাল্ফ) ; মূত্রনালী দিয়া চরিত্রাবর্ণের ক্রন্দ নিঃসরণ (হাইড্রাই, পাল্ফ) ; পুরাতন আকারের প্রেমের রোগ, কিন্তু উপর সঙ্গে সঙ্গে জী সহবাসের ইচ্ছা থাকে না বা পুরুষাদি খাড়া হয় না ; মল ত্যাগের সময় কোঁথ পাড়িলে বাত্ৰ নিঃসরণ (সাইলিস) । জীলোকের স্বচ্ছ ষেতপ্রদর নিঃসরণ (আলগাম) ; যোনি দ্বারাদি অত্যন্ত শিথিল হয় ; শুনে অতি সামান্য পরিমাণ হৃদ্য থাকে, অথবা হৃদ্য একবারেই থাকে না (একন, পাল্ফ) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । বোগল এবং বাহ্য উপরিভাগে অত্যন্ত চাপাবোধ, চাপিলে বা স্পর্শনে বাহ্যের বৃদ্ধি হয় । ডাইন পায়ের পাতার ভাঙ্গি বোধ ; পায়ের অঙ্গুলের মাথার ছিঁড়িয়া ফেলার ভাঙ্গি বোধনা, চলিয়া বেড়াইলে বাহ্যের বৃদ্ধি হয় ।

জ্বর । আভ্যন্তরিক শীতবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরের কাঁপনি ; চর্ম উষ্ণ ।

চর্ম । গা চুলকানি, চুলকাইলে বাহ্য সহজেই নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু শীতই চুলকানি পুনরায় আরম্ভ হয় ।

ব্যবহার । স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসে অত্যাচার হেতু অকালে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার দরুণ মনের মালিন্য বা তন্দ্রাবাহু (Melancholia) ; সকল বিষয়েই বৈরাগ্য ; উদ্মনকতা ; আপনায় উপর ঘৃণা ; সার্বজনিক দুর্ভাগতা এবং বারম্বার ধাতু নিঃসরণ ; শ্বস্বত্ব, বন্ধ্যাত্ব, স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসে অশক্তি ; প্রমেহরোগ ; পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ ; অণুকোষের কঠিনতা, যেত প্রদর, গোঁগে রক্তঃস্রাব আরম্ভ হওয়া বা রক্তঃরোধ ; অরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তঃস্রাব ; সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার না হওয়া ; বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি অস্থখে আগ্নাস্ কাষ্টাস্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । লিম্ফেটিক্ ধাতু (Lymphatic temperament) ; বারম্বার প্রমেহ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নানা প্রকারের অস্থখ হওয়া এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সম্বন্ধে বিশিষ্ট ঔষধ । জননেজিয়ার উপর এই ঔষধের কার্য্যের সঙ্গে ক্যান্সার, ক্যালী ব্রোমেটাম্, হুফর লুটিয়াম্ এবং কফরিক্ আসিডের কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আগারিকাম্, লাইকোপডিয়াম্, কফরাস্, পাল্‌সেটিল্য, সেলেনিয়াম্ এবং সাল্‌কারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্সার, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্ ।

ডাইলুশন বিচার । ইহার ৬ষ্ঠ ক্রমের আরো কই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আবার কোন কোন চিকিৎসকের মতে এই ঔষধের ১ম, ৩য়, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহারেও বিশেষ উপকার দর্শে ।

আমোনিয়াম কার্বোনিকাম,-কার্বোনেট্ অন্ আমোনিয়া,-আমন্-কার্ব্

(AMMONIUM CARBONICUM,-CARBONATE OF AMMONIA-
SMELLING SALTS,- AMMON. CARB.)

কোন এক বিষত হোমিওপ্যাথিক ঔষধান্ন হইতে আদত কার্বোনেট্ অন্ আমোনিয়া ক্রয় করিয়া বথানিরমে সুগার অন্ মিষ্টের সহিত মিশাইয়া গুঁড়া প্রস্তুতের ব্যবস্থা কার্য্যাকোপিরার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ঔষধ শীঘ্র শীঘ্র উড়িয়া যায় বলিয়া ইহার গুঁড়া প্রস্তুত না করিয়া বথা নিরমে চূরান জলের সহিত মিশাইয়া (১ গ্রেইন আমোনিয়া এবং ৯ কোঁটা চূরান জল) ইহার প্রথম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতে বথা নিরমে ডাইলুট্ অন্ কোহল মিশাইয়া ২য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় ও ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক বথা নিরমে রেকটিকাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। রক্তের উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। ইহা রক্তকে তরল করে এবং রক্তকণা বিনাশ করিয়া রক্তকে পচায়, বাহ্যিক দূষণ রক্তপ্রাব এবং অত্যন্ত অবসন্নতা উৎপন্ন হয়। পাংগ্লিয়োনিক্ স্নায়ু মণ্ডল (Ganglionic System of Nerves) দ্বারা (মস্তিষ্ক আক্রমণ না করিয়া) হৃৎপিণ্ড এবং ধমনি সন্মূহের কার্য্যের কিঞ্চিৎ চাক্ষু্য বৃদ্ধি করে এবং শরীরের প্রায় সমুদয় ঘন্ত্রেরই কার্য্যের চাক্ষু্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পাকস্থলী, অন্ত্র এবং শ্বাস যন্ত্রের শৈল্পিক ক্রিয়ীতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয় ও উহা অত্যন্ত প্রবলরূপে প্রদাহযুক্ত হয়। এই কার্য্যটি আমোনিয়ার একটা প্রবল স্থানিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

অন্ন। সমুদয় বিষয়ে অমনোবোধিতা এবং হুট্ নিদ্রার ভাব; মানসিক অবসন্নতার ভাবপ্রকাশ করা; সর্বদা ভ্রম বা কাল্প কৰ্ম্ম ভুলিয়া যাওয়া নিদ্রিতে এবং কথা বলিতে সর্বদা ভুল করা।

মস্তক । মধ্যাহ্নে আহারের পর কপালে ভারিবোধ এবং দপ্-
দপানি ; কপালে এবং মাথার উপরিভাগে অত্যন্ত কষ্টদায়ক পূর্ণবোধ,
বাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা কাটিয়া বাইবে (একন্, ব্রাই, নেট্রাম্-
মিউর) ; মাথায় পাতলাবোধ ; রাজিতে এবং ঘুম ভাঙ্গিলে মস্তিকে রক্তাধিক্য
বা রক্তাবরোধ ; মুখমণ্ডলে উষ্ণানুভব ; কপালে দপ্-দপানি, চিড়িক মারা
এবং চাপা বোধ, বাহার দরুণ মনে হয় যেন কপাল কাটিয়া বাইবে । এই
বেদনা আহারের পর, বহির্কায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি পায় ; প্রচাপনে
এবং উষ্ণ ঘরে উহার উপশম হয় ; মাথার অত্যন্ত চুলকানি ।

কর্ণ । কানে বজ্-বজ্ শব্দ হওয়া ।

নাসিকা । প্রাতঃকালে হাত মুখ ধোয়ার সময় নাক দিয়া রক্ত
পড়ে (একন্, বেগ্, ব্রাই) ; নাক দিয়া উগ্র ক্ষতকারক তরল পদার্থ
নির্গত হয় (আরাগিয়া, আর্স্, এরাস্, সিপা)-; নাক দিয়া জ্বালা উৎপাদক
জল পড়ে ; নাক বন্ধ হয়, বিশেষতঃ রাজিতে, বাহার দরুণ রোগী মুখ
দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িতে বাধা হয় (মেট্রাম্, আর্স্, নাক্স-বম্) ; মাথা
হেট্ করিয়া উপুড় হইলে নাক দিয়া রক্ত বহিয়া পড়ে ।

মুখমণ্ডল । মানসিক পরিশ্রম করার সময় মুখমণ্ডলে উষ্ণানুভব ;
মধ্যাহ্নে আহারের সময় এবং উহার পর মুখমণ্ডলে উষ্ণানুভব ।

অুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । সন্ধ্যার সময় বা প্রথম রাজিতে
বিছানার শয়ন করিলে (জীলোকের) দস্তশূল ; দাঁতে দাঁতে কামড়াইলে
দাঁতে বেদনার উদ্রেক হয় ; দাঁত যেন লম্বা হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় ;
(কার্কো-আনিমেল্, নাইট্রিক্-আস্, বার্ক্) ; জিহ্বার কোকার ভ্রার
কুতুড়ী ; মুখে অধিক পরিমাণে লালের সঞ্চার, বাহার দরুণ রোগী কমন
করিতে বাধা হয় ; সমুদ্র আহার দ্রব্যেই টক্ এবং ধাতুর স্বাদ । মদ্যপানে
যে রূপ হয়, গলার মধ্যে আহার বহা গলনালী পর্য্যন্ত জ্বালানুভব ; গলার মধ্যে
চাঁচিয়া ফেলার ভ্রার এবং খশ্-খশে বোধ (কার্কো-বেজ্, কষ্ট্, কস্, পালস্,
কমেজ্) ; ডাইন টম্‌সিল্ (Tonsil) ক্ষীত হইলে যে রূপ হয়, গিলবার
সময় গলার মধ্যে সেরূপ বেদনানুভব ; গলার মধ্যে দ্রব্-দ্রব্ ক্ষত ; টন-
সিলে পচায়ুক্ত ক্ষত (এইলাছ্, ব্যাপ্ট্, মিউর-আস্) ; ডিপ্-ধিরিয়া

(Diphtheria) ; নাক বন্ধ হইয়া থাকে, বাহার দক্ষণ রোগী (শিশু) কাঁপড় হওয়ার উপক্রম হইয়া ঘুম হইতে হঠাৎ চমকিয়া কাঁদিয়া উঠে ।

পাকস্থলী এবং উদর । আহারের পর এবং রাত্রিতে পাকস্থলীতে চাপাবোধ ; চাপিলে পাকস্থলীতে বেদনামুভব ; অত্যন্ত ক্ষুধা এবং আহার দ্রব্যে রুচি থাকে বটে, কিন্তু সামান্য আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ হইলেই যেন ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় ; কাঠ উদগার বা অসম্পূর্ণ উদগার উঠা ; পাকস্থলীতে পূর্ণবোধ ; পাকস্থলীর কম্পন ; পাকস্থলীতে উষ্ণমুভব, বাহ্য অস্ত্রের মধ্য দিয়া বিস্তৃত হয় । সন্ধ্যার সময় বাম কুঁচু ক্রিতে হাতের পাঞ্জার জ্বার স্থিতিস্থাপক স্থিতি ; বাম কুঁচু ক্রি প্রদেশে মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁতলিয়া যাওয়ার জ্বার বেদনা, বাহার দক্ষণ বাম পার্শ্বে পয়ন-করিতে কষ্টমুভূত হয় ; চলিলে কুঁচুর স্থিতি এবং বেদনাদি চলিয়া যায় ।

মল এবং মলদ্বার । গুহদ্বারে অর্শের বলী ; গুহ দ্বারে চুলকানি ; তরল ভেস এবং দান্তের পূর্বে ও উহার পর উদরে কর্তনবৎ বেদনা ; দান্তের সময় এবং উহার পর গুহদ্বার দিয়া রক্তগড়া ; মল একবার গুহদ্বার হইতে বাহির হইয়া পুনরায় গুহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং তৎপর কোদল মল নির্গত হয় ।

মূত্রযন্ত্র । প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত কৌণপাড়া ; বুকের অবস্থায় অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্বক মূত্রত্যাগ ।

জননেদ্রিয় । জ্বীলোকের বোনির স্থিতি এবং উহাতে চুলকানি ও জ্বালামুভব (অস্, ক্যাঙ্, জিরাঙ্, মার্ক্, সাল্ফ্) ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং অতিরিক্ত পরিমাণ রক্তস্রাব (অ্যালোজ্, ক্যাঙ্-কার্ক্, নাক্স-বম্) ; রক্তস্রাব আরম্ভ হওয়ার সময় ওলাউঠার প্রায় সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পায় ; কাল্চে চাপ চাপ, থানা থানা, রক্তস্রাব (ক্রোকাশ্, সাই-রেমেন্, ইপ্নেন্স, প্রাটিনা), উগ্র ক্ষতকারক রক্তস্রাব, বাহ্য লাগিয়া উক্-দেশে ক্ষত হয় (সাল্ফ্) ; সমুদয় শরীরেই ক্রান্তি বোধ (কার্বো আনিমেস্, ককিউল্) ; উক্দেশেই ক্রান্তি অধিক অমুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারবার হাঁইতোলা, দন্তশূল, কোমরের পশ্চাৎদেশে বেদনা এবং শীতবোধ ।

শ্বাসযন্ত্র । অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, বিশেষতঃ নিদ্রাহীন হইতে উক্

স্থানে উঠিতে (একন্, আর্স্, ক্যাক্ট্, ক্যাক্-কার্ক্) ; কোন রোগের জেগ কাশীন বাগরোধ হওয়ার উপক্রম হওয়া ; গলার মধ্যে গুলার কণা প্রবিষ্ট হইলে ঘেরূপ হয়, রাজিতে সেরূপ শুককানি ; প্রতিদিন শেষ রাজি ৩ বা ৪টার সময় প্রবল কাশি (ড্রিসিরা, ক্যালী-ক্লোরিট্) ; বায়ুনের উপরি ভাগে উত্তেজনা হেতু হাঁপানির জ্বর অল্পকাল স্থায়ী কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের কষ্টদায়ক আক্কেপিক সঙ্কোচন ; কাশি এবং গলা দিয়া রক্তমিশ্রিত স্লেমা নির্গমন ; বুকের মধ্যে ভারি বোধ ; ন্যাখা হেট করিয়া উপুড় হইলে বুকের ডাইন পার্শ্বে স্থলী বিধানের জ্বর বেদনা বা যাতনা ।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শব্দ শুনা যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের এত উত্তেজ হয়, যে উহার দ্রুত রোগী মনে করে যেন সে শীঘ্রই মরিবে ; শীতল বর্ষ ; রোগী কথা বলিতে পারে না ; নিশ্বাস প্রবল উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট এবং অত্যন্ত কষ্টকর ও হাতের কম্পন ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । ডাইন বাহুতে ঝিল ধরা, বাহার দ্রুত হাত পৃষ্ঠদেশ পানে আকৃষ্ট হয় ; ডাইন বাহুতে ভারি বোধ এবং উহার শক্তিহীনতা ; হাতের আঙ্গুলের প্রদাহ, আঙ্গুল হাড়া (Whitlow) ; পায়ের অহিরতা ; পায়ের পাতা, বিশেষতঃ বিছানার শয়ন করিলে, ঠাণ্ডা হয় ; পায়ের বুড়ান্গুলী লালবর্ণ, ক্ষীত এবং বেদনায়ুক্ত হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় বা প্রথম রাজিতে বিছানার শয়ন করিলে এবং পায়ের পাতা ক্ষীত ।

চর্ম্ম । শরীরের প্রবল চুলকানি, কিন্তু চুলকাইলে গায় কোড়ার জাতি জালাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকাশ পায় ; শরীরের উর্দ্ধাংশ আরক্ত রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্বর লালবর্ণ (বেল) ; গায় মরাচোর বা মরা মাল উঠে ।

নিদ্রা । ঘুমের ঘোরে বারবার সজোরে চমকিয়া উঠা এবং তৎপরে অত্যন্ত ভয় (একন্, আর্স্, বেগ্, জাই, হারোস্) ; প্রতি রাজিতেই বোবার ঘরা (Night-mare) ; অত্যন্ত ঘুমের ভাব এবং রক্ত যেন অত্যন্ত গরম হইয়া যায় ।

জ্বর । অপরূহ বা সন্ধ্যার সময় শীতবোধ ; প্রতিদিন প্রাতঃকালে বর্ষ ।

ব্যবহার । সাংঘাতিক আরক্ত-জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ ; গলার মধ্যে কাল্‌চে লালবর্ণ বা পচাযুক্ত কত ; কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থির প্রদাহ ;

গলায় বহির্দেহ ক্ষীত ; নিবাস প্রাণনে গৌ, গৌ, বড়, বড় শক হওয়া ; অসাড় ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যস্ত প্রবল বমন ; শরীর লালবর্ণ এবং গায় হামের দ্বারা লালবর্ণ বা অসম্পূর্ণ বিকর্ণ প্রাপ্ত কুসুড়ী ; মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হওয়ার আশঙ্কা ; বৃদ্ধবয়সে বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পায় ; সার্বজনিক দুর্বলতা এবং সমুদয় শরীরে বেদনা ; কত পচিবীর উপক্রম হয় ; সর্দী ; এম্ফিসিমা (Emphysema) ; বায়ুনল প্রবাহ (Bronchitis) ; হ্রীপানি কাশি ; বক্ষশোথ ; কংগ্রায়েন্স বা কংগ্রেসন (Angina Pectoris) ; হিষ্টিরিয়া জনিত অস্থখ ; প্রচুর রক্তঃস্রাব ; কষ্টকর রক্তঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation) ; শ্বেত প্রসব ; মুখে বা ; আঙ্গুলহাড়া (Whitlow) ; মস্তিষ্কের কোমলতা ; কীটাদির কামড়ের দরুন অস্থখ ইত্যাদিতে আমোনিয়াম্ কার্বোমিকাম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সমুদয় দিবস ক্লান্তি এবং প্রাতিবোধ ; বহির্কায় একবারেই সহ হয় না (ককিউলাস্, সিগিরা, সাইলিসি) ; শরীরের ডাইন পার্শ্ব বাম পার্শ্ব অপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হয় ; স্নান করা বা বহির্কায় হতে বাহির হওয়াতে অনিচ্ছা ; আক্রান্ত অংশ পচিবীর উপক্রম হওয়া ; প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে, আহারের সময় এবং রাত্রিতে, আহারের সময় এবং উহার পর ; নিয়ন্ত্রণ হইতে উচ্চ স্থানে উঠিতে, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, বহির্কায় হতে, কক্ষ বৃত্তিতে, বিশ্রামে অস্থখের বৃদ্ধি (ডাক্, রোডডেগুন, রাস্টল্) এবং উচ্চ, শুষ্ক বাতাসে, ঘরের মধ্যে এবং প্রচাপনে অস্থখের উৎপন্ন ইত্যাদি এই ঔষধের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । দুর্বল চোপ্সা শরীর এবং স্নায়বিক বাত্ৰ বিশিষ্ট ক্রম জীলোক, গণ্ডমালা বাত্ৰবিশিষ্ট শিশু বা বালক বালিকা, বৃদ্ধ বয়সের লোক এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । এই ঔষধের কার্যের সঙ্গে এপিস্, আণিকা, আমোনিয়াম্ মিউরিয়াটিকাম্, বেলাডোনা, ক্যান্ডার, ক্যানী ক্লোরোটাম্, ল্যাকেসিস্, কার্বো বেজিটেবিলিস্, হিপার মাল্‌কিউরিস্, ফফরাস্ এ বং পাল্‌নেটিলার কার্যের সাদৃশ্য আছে

ପ୍ରତିଷେଧକ ଔଷଧ । ଆମ୍ବିକା, କ୍ୟାନ୍ଦାର, ହିମାର ମାଲ୍‌ଫିଉରିନ୍‌।
ଅଧିକ ମାତ୍ରାର ବିଷାକ୍ତ ହইଲେ ବେଜିଟେବେଲ୍‌ ଆସିଡ୍‌ସ୍‌ (Vegetable acids).
ରେଝିର ତୈଳ (Castor oil), ଲିସିର ତୈଳ (Linseed Oil), ବାମାନ୍ଦେର ତୈଳ
(Almond Oil) ଏବଂ ଜଳମାହିରେର ତୈଳ (Olive oil) ବ୍ୟବହାର ।

ଡାଇଲୁସନ ବିଚାର । ୧ମ, ୩ମ, ୪ର୍ଥ କ୍ରମର ସଚରାଚର ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ
ହইରା ଥାକେ । ଆବାର କୌନ କୌନ ଟିକିଂସକ ୧୨ ଏବଂ ୩୦ ଡାଇଲୁସନ
ବ୍ୟବହାର କରିବା ଥାକେନ ।

ଆମୋନିୟାମ୍‌ ମିଉରିଆଟିକାମ୍‌, -ଆମୋନିକ୍‌ କ୍ଲୋରାଇଡ୍‌, ଆମନ୍‌-ମିଉର

(AMMONIUM MURIATICUM, -AMMONIC CHLORIDE-AMMON.-MUR.)

କୌନ ଏକ ବିଷକ୍ତ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ ଔଷଧାଳୟ ହইତେ ଆଦତ ଆମୋନିୟାମ୍‌
ମିଉରିଆଟିକାମ୍‌ କ୍ରମ କରା ଉଚିତ । ইহার କ୍ରମ ହই ଏକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହইରା
ଥାକେ । ବର୍ଷା, — ଶୁଢ଼ା ଏବଂ ଆରୋକ । ବର୍ଷା ନିୟମେ ଅଗାର ଅବ୍‌ ମିକ୍ସେର
ମର୍ଦ୍ଦେ ମିନାହିରା ୧ମ ଦର୍ଶନିକ ଏବଂ ତତ୍ତୋଧିକ କ୍ରମେର ଶୁଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହইରା
ଥାକେ । ବର୍ଷା ନିୟମେ ଚ୍ୟୁନିନ ଜଳେ ମିନାହିରା ইহার ୧ମ ଦର୍ଶନିକ କ୍ରମେର ଆରୋକ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହইରା ଥାକେ । ୨ମ ଏବଂ ତତ୍ତୋଧିକ କ୍ରମେର ଆରୋକ ବର୍ଷାନିୟମେ ,ରକ୍ତି-
ଫାଇଡ୍‌ ମ୍ଲିରିଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହইରା ଥାକେ ।

ସାଧାରଣ କ୍ରିୟା । ইହା ରକ୍ତେର ଦୁନ ପଦାର୍ଥେର ହ୍ରାସ ଏବଂ ଶାହିର
ନି:ସରଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ବାହାର ଦର୍ଶନ ରକ୍ତେର ଫାହିରିମ୍‌ ନାମକ ପଦାର୍ଥ ଶୋଷିତ
କର । ইହା ইউରିଆର (Urea) ବହିର୍ଗମନ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ମୈମ୍ବିକ ବିଲ୍‌ମ୍ବୀର ଉପର
ইহার কার্য অতি প্রবল । ইহা মୈମ୍ବିক বিଲ୍‌ম୍ବୀর নি:সରଣ অত্যন্ত বୃଦ୍ଧি କରେ ।

ସାଧାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଲକ୍ଷଣ ।

ସ୍ତନ । ମର୍ଦ୍ଦନା ବିପଦେର ଆଶଙ୍କା କରା ଏବଂ ବିମର୍ଷତାବେ ଥାକା ;
କାନ୍ଦିବାର ইচ্ଛା ।

মস্তক । মাথাঘোরা এবং মাথার পূর্ববোধ, বাহার দরুণ মাথার ভারিবোধ হয় ।

চক্ষু । চক্ষুর সম্মুখে যেন কোন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এরূপ অস্বভূত হয়, বাহার দরুণ স্পষ্ট দেখিবার ব্যাঘাত ঘটে; চক্ষুর সম্মুখে বেম হরিজা বর্ণের দাগ ভাসে ।

নাসিকা । সর্দি এবং তদ্রূপ নাসারক্ক রুদ্ধ হওয়া; নাক অত্যন্ত জ্বালা করে এবং টাটার 'বা বেদনামুক্ত হয় ও আত্মাণ শক্তি থাকে না । নাকদিয়া তরল ক্ত কারক স্লেমা নির্গমন, বাহা লাগিয়া উপরের ওষ্ঠে অবধি ক্ত হয় (আর্স্, সিপা, মার্ক্-কর) ।

মুখগহ্বর এবং গলারমধ্য । দ্বিহায অপ্রভাগে ফোকার জ্বায ফুঁড়ী এবং তদ্রূপ উহাতে জ্বাযুক্ত বেদনা (আর্স্, মার্ক্-কর); গলার মধ্যে ক্ত এবং বেদনা ও উহাতে এত কঠিন স্লেমার সঞ্চায় হয় যে গলার খেকুর দিলে বা সঙ্কোরে কাশিলেও উহা নির্গত হয় না (আলোজ্, বোরাঙ্ক্, ক্যালী-বাই); গিলিবার সময় গলার মধ্যে স্থচীর্ষধানের জ্বায অস্বভূত হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । পাকস্থলীতে খালি খালি বা ক্ষুধা বোধ; হিকা; উদার উঠা; বমনোদ্যেগ; মুখ দিয়া জল উঠা । নাভি প্রদেহে কামড়াণীর জ্বায বেদনা; তলপেটে ভারিবোধ, বাহার দরুণ মনে হয় যেন ঐ স্থানে একটি বোঝা চাপাইয়া রাখিয়াছে এবং তদ্রূপ মনের অত্যন্ত উদ্যেগ ও মনে হয় যেন উদর কাটিয়া বাইবে ও বাহা ঘূমের পর লারিয়া যায় ।

মল এবং মলদ্বার । মলত্যাগের সময় এবং উহার অনেককণ পর পর্যন্ত গুহে জ্বালাহতব (আলোজ্, আর্স্, সাল্ক্); গুহে জ্বালা ও টাটানিমুক্ত চুলকানি; গুহের এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রণের জ্বায ফুঁড়ী প্রকাশ পায়; কোষ্ঠবদ্ধ; মল কঠিন ও নির্গত হইলে তালিয়া খণ্ড খণ্ড হয় (নেট্রাম্-মিউর) এবং বাহা অতি কষ্টে বহির্গত হয়; সবৃজ বর্ণের চট্-চটিয়া আঠা তরলভেদ (আর্স্, মার্ক্); মলে কাচের জ্বায সাধা চক্চকিয়া কঠিন স্লেমা থাকে (কষ্ট) ।

মুদ্রায়ুক্ত । রাত্রিতে বারবার প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ (আঁচু, কস, আম) ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের নিরমিত সময়ের অনেক পূর্বে রজঃ-
স্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট ও কোমরের পশ্চাৎদেশে বেদনা
বাহ্য রাত্রিতেও থাকে এবং যখন রজঃস্রাব অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে
হয়; রজঃস্রাবের সময় শুষ্কতার দিয়া রক্ত নির্গমন; ডিমের লাগের জায়
যেত প্রদর নিঃসরণ (বোরাক্স, বোবিট্টা, ক্যাক্স-কস, মেলিয়ারাম); প্রস্রা-
বের পর কটাবর্ণের চট্‌চট্টা আঠা বাতনাহীন শেঁতপ্রদর নিঃসরণ ।

স্বাসযন্ত্র । শরতঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুনের উপরিভাগে
আলাহুত্ব এবং উহাতে সূক্ষ্মভীর দ্রুপ শুক কাশি; রাত্রিতে চীৎ হইয়া
শয়ন করিলে কাশি; আহারে, ঠাণ্ডা কোন দ্রব্য পান করিলে এবং শয়ন
করিলে কাশির বৃদ্ধি; আহার দ্রব্য বৃকে বাঁধিয়া থাকিলে বেক্রপ হয়, বৃকের
মধ্যে সেক্রপ চাপাবোধ এবং সূচী বিধানের জায় বেদনা বা বাতনা; বৃকের
মধ্যে কোন কোন স্থানে আলাদোষ ।

পৃষ্ঠদেশ । ষাড় অত্যন্ত শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (একন,
আমারিকাশ); কোমরের পশ্চাৎভাগ শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না;
হাত, পা এবং কটিদেশে বেদনা; শুষ্ক হারের ঠিক উপরিভাগে শেঁতলিয়া
বাঁড়িয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার জায় বেদনা; পৃষ্ঠদেশে, বিশেষতঃ হুই কঙ্কের
বক্ষ্যবর্তী স্থানে, ঠাণ্ডাবোধ ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । অঙ্গাঙ্গ হইলে বেক্রপ হয়,
হাতে সেক্রপ জারিবোধ । বাম উরুর সন্ধিতে বেদনা, বাহ্য দ্রুপ মনে হয়
যেন উরুর পেশীর অগ্রভাগ শুনি খাট হইয়াছে এবং বাহ্য দ্রুপ রোগী
বোঁড়ার জায় চলিতে বাধা হয়; বসিয়া থাকার অবস্থায় পা ইত্যাদির হাড়
চর্জনবৎ বেদনা; বসিলে বা শয়ন করিয়া থাকিলে পা যেন কসিয়া ধরে;
চলিবার সময় পায়ের ডিমের পেশীগুলি যেন কসিয়া ধরে (আন্টি-টাট্‌);
পেশীগুলি খাট হইলে বেক্রপ হয়, সন্ধিতে সেক্রপ কসিয়া ধরার জায় অসুস্থ
হয়; শেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে বেক্রপ হয়, কুঁচকিতে সেরপ
বেদনা হওয়ার দ্রুপ সোজা হইয়া চলিতে অশক্তি ।

জ্বর । সন্ধ্যার সময় শয়ন করার পর বতবার ঘুম ভাঙে ততবারই নীতবোধ, কিন্তু পিপাসা থাকে না ।

চর্মশ । শরীরের প্রায় সমুদয় অংশেই চুলকানি, সাধারণতঃ সন্ধ্যার সময় বা প্রথম রাত্রিতে শয়ন করিলেই যাহার অধিক উদ্বেক হয় এবং ভৎপর সারিয়া যায় ।

ব্যবহার । শরীরের সমুদয় অংশেব শৈল্পিক বা শ্লেষ্মা সম্বলিত রোগ ; বক্ষাক্রান্ত ; সায়েটিক স্নায়ুশূল (Sciatica) ; সবিরাম বা পালাজ্বর ; বসন্তরোগ ইত্যাদি অস্থখে আমোনিয়াম্ মিউরিয়াটিকাম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । যে সকল রোগী মোটা, টোপুলা এবং চলচলে পেশী বিশিষ্ট এবং যাহাদিগের পা শীর্ণ বা সরু, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী । ডাক্তার গারেন্সি (Dr. Guerenzy) বলেন যে, পায়ের সঙ্কোচনের ভায় অস্থত হওয়া বা বাস্তবিক সঙ্কোচন এবং জ্বীলো-কের রক্তশ্রাবের সময় মলত্যাগের সময় গুহ্বার দিয়া রক্ত পড়া আদ্যো-নিয়াম্ মিউরিয়াটিকামের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সম্বন্ধ বিশিষ্ট ঔষধ । শৈল্পিক কিল্লীর উপর আমোনিয়াম্ মিউরিয়াটিকামের কার্যের সঙ্গে আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্ এবং পাল্‌মেটিলার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন ইহার কার্যের সঙ্গে আমোনিয়াম্ কার্ক, আর্সিনিক্, আর্জেন্টাম্ নাইট্রাশ্, কষ্টিকাম্, ক্যালী-কার্ক, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্, বেলাডোনা, হিপার সাল্‌ফিউরিস্, ফস্ফরাস্, সাইলিসিয়া এবং সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাম্ফার, ককিগা, হিপার সাল্‌ফিউরিস্, নাক্স-বমিকা, বিটার আমণ্ডস্ (Bitter Almonds) । অধিক মাত্রায় আমোনিয়াম্ মিউরিয়াটিকাম্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে বিনিগার (Vinegar) অথবা বেজিটেবেল্‌ আসিডস্ (Vegetable Acids) ব্যবহার্য্য ।

ডাইলুশন বিচার । ৩৪ এবং ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোকই সচরাচর ব্যব-হৃত হইয়া থাকে ।

আপোদিনাম্, ক্যানেনবিনাম্, -আপোস্-ক্যান্

(APOCYNUM CANNABINUM, -APOC.-CAN.)

কানেডা এবং ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সে এই গাছ জন্মে। কাঁচা শিকড় ষণ্মনিয়মে প্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মূত্রকোষ, চৰ্ম্ম এবং স্নায়ু কব্জীর (Serous-membranes) উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, ইহার দরুণ শরীরে নানা প্রকারের শোথ সম্বলিত অস্থখ উৎপন্ন হয়। পরিপাক সম্বন্ধীয় যন্ত্রের স্নায়িক কব্জীর উপরও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার দরুণ উক্ত যন্ত্রাদির নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ

মন। মন যেন এলোমেলো হইয়া যায়; স্বাভাবিক এবং অবসর ভাব (লাইকোপ্‌, নেট্রাম্-মিউর, পাগ্‌স্)।

মস্তক। মস্তিষ্কের শোথ; অজ্ঞানবহিতা (Stupor); এক চক্ষুর দেখিবার শক্তি একবারে বিনষ্ট হয় এবং অপর চক্ষুর দেখিবার শক্তি থাকে; অনবরত একধানি হাত এবং একধানি পায়েৰ সঞ্চালন; কপাল যেন উঁচু হয় বা কুলিয়া উঠে; মাথার হাড়ের জোড় যেন খোলা থাকে; মস্তিষ্কে দ্রুতি জলীয় পদার্থের সঞ্চার।

পাকস্থলী এবং উদর। পিপাসা, কিন্তু জল সহ হয় না, কারণ, জল পান করিলেই পেটে বেদনা হব, অথবা গলা দিয়া জল উঠিয়া পড়ে (আস্‌); পাকস্থলীর মধ্যে অভ্যস্ত খালিবোধ বা পেটে পিঠে লাগিয়া বাওয়া (হাইড্রাট্‌, টগ্‌মেস্, পাগ্‌স্, সিপিরা); মধ্যে মধ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অভ্যস্ত কষ্টদায়ক বমন; পাকস্থলীর অভ্যস্ত উত্তেজনা এবং বমন। উদরী (Ascites); উদর ক্ষীণ, বিস্তৃত এবং বেদনায়ুক্ত হয় (আস্‌, বাক্‌)।

মল। অতি অল্প পরিমাণে মলত্যাগ।

মূত্রযন্ত্র। অতি অল্প পরিমাণে মূত্র ত্যাগ, ইহার দরুণ কোনও অস্থখ অমুভূত হয় না; প্রচুর পরিমাণে ফিকা রসবিশিষ্ট মূত্রত্যাগ; মূত্রে কোন তলানি থাকে না (এপিস্, আর্জেন্ট্‌-নাইট্‌ক্‌)।

জননেন্দ্রিয় । দুবতী বাজিকালনের গোণে প্রথম রজঃস্রাব বা রজঃরোধ; উদর এবং পা শোথের জায় স্থিত; ক্রমগত বা মধ্যে মধ্যে অতিরিক্ত রজঃস্রাব; তরল বা চপ চীপ, খান খান রজঃস্রাব; বমনোষেধ; বমন, হৃৎস্পন্দন; নাড়ী দ্রুতগামী, এবং নড়িলে হুর্লগ হয়; মালিশ হইলে মাথা উঠাইলে বা মাথা খাড়া করিলে মুছার ভাব।

শ্বাস যন্ত্র । গণহায়ী শুককাশি; তরল কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া এবং বুকের মধ্যে অত্যন্ত কষ্টাহতব; উদরোদ্ধ প্রদেপ এবং বুকে অত্যন্ত কষ্টাহতব (আন্টি-টাট্, আন্); শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর এবং উহা দ্বারা মনের তুষ্টি হয় না।

ব্যবহার । স্ববিধোৎপন্ন বা অন্য কোন প্রকারের যোগ অনিত্য সর্বপ্রকারের শোথ; উদরো, সার্বাদিক শোথ এবং রক্তশোথ; অতিরিক্ত রজঃস্রাব; সর্দিলাগা এবং উহার দরুণ নাক বন্ধ হওয়া; অজীর্ণ রোগ, বাহার দরুণ আহারের পর পেট চোশ মারিয়া থাকে এবং কখন কখন পেটে পিটে-লাগিয়া যায়; উদরামর ইত্যাদি অনুরূপে আপোসিনাম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । ঘর্ম্ম এবং সূত্রের সঞ্চার ও নিঃসরণ বন্ধ হওয়া; সার্বাদিক হুর্লগতা এবং অস্থিরতা; আহারের পর পেট চোশ মারিয়া থাকা ইত্যাদি আপোসিনাম্ ক্যানেনবিনামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আপোসিনামের কার্যের সঙ্গে এপিস্ মেলিকিকা এবং হোলবোরাসের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্বারা কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আসিটিক্ আসিড্, আসিনিক্, ক্রাইওনিয়া, বেলাডোনা, কল্‌চিকাম্, ডিজিটালিস্, ক্যালো-কার্ক্ এবং বিরেট্রাম্ আকামের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার । এই ঔষধের মূল আরোক ১ হইতে ৫ ফোঁটা পর্যন্ত এক মাত্রার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদরী রোগাক্রান্ত কোন একটা রোগীর চিকিৎসার মূল আরোক ১০ ফোঁটা মাত্রার ব্যবস্থা করিয়া লেখক আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন। ইহার মিশ্র আরোক ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় না আপন রোগ চিকিৎসার ফল দেখিয়া লেখক একগু

স্থির করিয়াছেন। এই ঔষধের মিশ্র আরোক ব্যবহার করিয়া ক্রিমপ ফল পাওয়া যায় তাহা পাঠকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের কাঁচা শিকড় ১ ছটাক, দেড়শের জলে সিদ্ধ করিয়া উহার ২০। ৩০ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

আর্জেন্টাম্ মেটেলিকাম্,-আর্জেন্ট্-মেট্

(ARGENTUM METALLICUM,-ARG.-MET.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদৃত আর্জেন্টাম্ মেটেলিকাম্ ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে স্থগার অবস্থিকের সঙ্গে মিশাইয়া ৩য় শততমিক ক্রম পর্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। সন্ধি, অস্থি, উপাস্থি ও সন্ধির লিগামেন্টের (Ligaments) উপর ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইউষ্টেকিয়ান্ টিউব (Eustachian Tube), নাসিকা, কৃত্রিম পঞ্জরার হাড়, পার্শ্বের পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়ের উপরও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থি বিশিষ্ট বস্ত্র এবং জংপিণ্ডের উপরও ইহার কার্য্য আছে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের অতিরিক্ত উল্লাস এবং সমুদয় দিন কথা বলিবার স্বভাব।

মস্তক। হঠাৎ মাথাঘোরে এবং মনে হয় যেন চক্ষুর সম্মুখে কুয়াশা রহিয়াছে; মদ্যপান করিলে সেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ হামা দেওয়ার স্থায় অস্বস্তি হয় এবং মাথা টলে; মাথার চাপিয়া ধরার স্থায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে চিমাবোধ এবং মাথার পশ্চাৎদেশে কসিয়া ধরার স্থায় চাপাবোধ; কর্ণের পশ্চাৎভাগের হাড় চাপিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার স্থায় বেদনা, স্পর্শনে বাহার বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু । চক্ষুর পাতার প্রান্ত ক্ষীত, লালবর্ণ এবং পুরু (আণ্টি-জুডু, গ্রাফ, লাইকোপ, মার্ক) ; চক্ষুর পাতা এবং কোণের ভয়ানক চুলকানি (সাল্ফ) ।

কর্ণ । কানের উপরিভাগের ভয়ানক ক্ষতকারক চুলকানি ।

নাসিকা । নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে তরল স্লেমা নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি (একন্, আস্, ইউফ্লেস্, মার্ক-কর) ; প্রাতঃকালে নাকের উক্ত প্রকারের অবস্থা ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলের হাড়ে চাপিয়া ধরা এবং ছিঁড়িয়া ফেলার ভায় বেদনা ; ডাইনগালে কর্ণের সম্মুখভাগস্থিত হাড়ে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ভায় বেদনা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখে শুকবোধ ; মুখে জ্বৰ্গজ্ব । ইম্যাক্সিলা নিম্নস্থিত লাল নিঃসারক গ্রন্থি (Submaxillary glands) প্রদেশের ক্ষীতি ; ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ; গলার মধ্য ক্ষীত হইলে যেরূপ হয়, গিলিতে সেরূপ কষ্টানুভব, কাহার দরূপ আহার ত্র্যাত গিলিতে অত্যন্ত কষ্টানুভূত হয় ; প্রতি দিন প্রত্যুষে আহারবহা গলনালীর ঠিক উপরিভাগের দুই পার্শ্বে আঁটান, ধূসর বর্ণের, ভিজাগোদের ভায় স্লেমায় সঞ্চার, যাহা কাশিলে বা গলায় থেকুর দিলে সহজেই নির্গত হয় ; প্রথমে, কাশি এবং গিলিবার সময় গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়া বা ক্ষত হওয়ার ভায় অনুভূত হয় (আর্জেন্ট-নাইট্রিক) ; হাঁই তুলিবার সময় গলনালীর উপরিভাগের দুই পার্শ্বে বেদনানুভব ; উক্ত অংশে অসাড়বোধ ।

পাকস্থলী এবং উদর । গলা সমান ভরিয়া থাকিলেও আহারের তৎক্ষণাত্ পর অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হয় ; পাকস্থলীর মধ্যে উদ্বেগ এবং চাপাবোধ । বার উরুর ঠিক উপরিভাগে এবং বস্ত্রিকোটরের বাম পার্শ্বের সম্মুখ অংশেই বেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ভায় বেদনা ; উদরের উপরিস্থিত পেশীর বিস্তৃতি বা উহাতে কসিয়া ধরার ভায় অনুভূত হওয়া ; উদরে সঙ্কোচে কল কল, গড়্গড়্ শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা ।

মল এবং মলদ্বার । বারম্বার বাহ্যের বেগ বাহা শুষ্কের নিম্নাংশে অধিক অনুভূত হয় এবং বেগ দিলে অতি সামান্য পরিমাণে নরম মল নির্গত

হয় ; বালির জায় শুষ্ক মন নির্গমন ; মধ্যাহ্নে আহ্বারের পর উক্ত প্রকারের
মলত্যাগ ।

মূত্রযন্ত্র । বারবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর
পরিমাণে মূত্রত্যাগ (এপিস্, অ্যাক্জেণ্ট্-নাইট্রিক্, ফস্-আস্) ; মূত্র বোশাটিয়া ;
মূত্র মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট বাহ্য রাস্তিতেই অধিক পরিমাণে নির্গত হয় ; বহুমূত্র ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের অণ্ডকোষে ছেঁচিয়া দেওয়ার জায় বেদনা
বা ব্যতনা (একন্) ; কাপড় পরিয়া চলিবার সময় বেদনার বৃদ্ধি ; প্রায় প্রতি
রাস্তিতেই স্বপ্নে ধাতু নির্গমন ; কিন্তু ঐ সময় পুরুষাঙ্গ ঝাড়া হয় না এবং
উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গ ছোট হইয়া যায় ; হস্ত মৈথুনের পর পুরুষাঙ্গের
উক্ত অবস্থা ; যুশ্-যুশে রক্তমের প্রমেহ বোগ এবং তদ্রূপ হরিদ্রা বা সবুজের
আত্মাত্মক রূপ নিঃসরণ । জ্বীলোকের বাম ভিষকোষ এবং কোমরে বেদনা
ডাইন ভিষকোষে বেদনার এপিস্ ব্যবস্থা ।

হাস্যযন্ত্র । বাহার্য্য সর্বদা গান এবং বক্তৃতা করে তাহানিগের
স্বরভঙ্গ (অ্যাক্জেণ্ট্-নাইট্রিক্, এরাস্, ফস্) ; হাসিলে বায়ু নলের উপরি-
ভাগে স্লেষ্মার সঞ্চার এবং কাশের উদ্রেক হয় (চায়না, ড্রুসিরা, ফস্) ;
চলিবার সময় অথবা নীচের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠি-
বার সময় বা ঘাড় হেট করিয়া উপড় হইলে গলার মধ্যে স্লেষ্মার সঞ্চার,
বাহ্য একবার কাশিলেই নির্গত হয় ; কাশিবার সময় (গিলিবার সময় নহে)
বায়ুনলের উপরিভাগে জ্বালা এবং টাটানি ; যেখানে বায়ুনল হই পাখার
বিত্তক হইয়াছে, সে স্থানের উপরে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জায় অনুভূত হয়,
শব্দ প্রয়োগে বাহার বৃদ্ধি হয় ; বায়ুনলের নিম্নভাগ হইতে উপরের দিকে
প্রথমতঃ যুশ্-যুশে বর্জনবৎ বেদনা, বাহ্য স্থচী বিধানের জায় বেদনা বা
ব্যতনার পরিণত হয় এবং বাহার দ্রুত ২৩ বার কাশির উদ্রেক হয় ; দিনের
বেলায় মধ্যে মধ্যে কণ্ঠস্থানী সাঁই সাঁই, ঘড়্-ঘড়্ শব্দ বিশিষ্ট কাশি বাহ্য
রাস্তিতে বা বহির্বিষ্মতে থাকে না এবং বাহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিগা সিদ্ধ
করা সরদাদির জায় সাদা সাদা গাঢ় স্লেষ্মা সহজে নির্গত হয় ; বুকের অত্যন্ত
জ্বৰ্জলতা, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বের ।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎপিণ্ডের পেশীতে বেদনা বা উহার কষ্টহীন বারবার

আকস্মিক স্পন্দন, তীব্র হইয়া শয়ন করিলেই বাহার অধিক উদ্রেক হয়।

ব্যবহার। পারার (Mercury) অপব্যবহার জনিত অস্থব; হস্ত ঠৈমধুন হেতু অস্থব; অস্থির সন্ধিতে প্রদাহ এবং উহাতে ভরানক বেদনা; কণ্ঠনালীর পুরাতন প্রদাহ (Chronic Laryngitis) এবং উহার লগ্নে স্বরভঙ্গ; বহুমূত্র; এক শিরার ব্যারাম বা অন্তকোষ প্রদাহ; হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা; পূঁবাণি রসকর হেতু জ্বর বা হেকটিক্ ফিবার (Hectic Fever) ইত্যাদি অন্তর্থে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। টেষ্টি (Teste) বগেনে যে, একটা জীলোকের জরায়ুব কর্কট রোগে (Uterine Cancer) এই ঔষধ ব্যবহৃত করিয়া তিনি বিশেষ কল পাইয়াছেন।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অস্থিতে ছিঁড়িয়া কেলা বা চাপিয়া ধরার ভার প্রবল বেদনা; অস্থিসন্ধিতে তুর্জলবোধ এবং টাটানি বাহা উপর হইতে নীচে নামিতেই অধিক অসুভূত হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবশ এবং অসাড় বোধ; চলিবার পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ক্লান্তিবোধ এবং উহাতে শক্তি না থাকা; পায়ের পাতা শোথের ভার স্বীত; বেদনাদি আন্তে আন্তে ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হয়, কিন্তু হঠাৎ দূরীভূত হয়; আভ্যন্তরিক বস্ত্রে জ্বালা এবং টাটানি; বেলা ছুই প্রহরের সময়, আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলে এবং চীত হইয়া শয়ন করিলে বেদনাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি আর্জেন্টাম্ মেটেলিকামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ যে সকল রোগী লম্বা এবং শীর্ণকার বিশিষ্ট এবং সহজেই চটিয়া যায় তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অধিক উপকারী।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। আর্জেন্টাম্ মেটেলিকামের কার্যের লগ্নে অরাম্, প্রাটিনাম্, সেলিনিয়াম্ এবং জিঙ্কামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার লগ্নে অ্যানাকিটিডা, এরাম্, ক্যাকেরিয়া-কার্ক, চায়না, হিপার, সাল্ফিউরিস্, মার্কিউরিয়াম্, নাস্টিক্ অ্যাসিড্, পাগ্‌সেটিলা এবং গিলিরার কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। মার্কিউরিয়াম্, পাগ্‌সেটিলা।

ডাইলুশন বিচার। হানিমান এই ঔষধের ২য় ক্রয়ের গুঁড়া ব্যবহৃত করিয়া গিয়াছেন। ইহার ৬ষ্ঠ এবং ৩০ক্রমের আরোকণব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আর্সিনিকাম্ আয়োডেটাম্,-আয়োডাইড্

অব্ আর্সিনিক্,-আর্স্-আয়োড্

(ARSENICUM IODATUM,-IODIDE OF ARSENIC,-ARS.-IOD.)

একভাগ মেটেলিক্ আর্সিনিক্ এবং ৫ ভাগ আয়োডিড্ একত্রে মিশাইয়া তাতাইয়া আয়োডাইড্ অব্ আর্সিনিক্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথানিয়মে সুগার্ অব্ সিক্কের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ডাক্তার হেল্ (Dr. Hale) বলেন যে, যে প্রকার রৈমিক বা স্লেয়া জনিত রোগে নিঃসরণ অত্যন্ত ক্ষতকারক এবং উত্তেজক, সে প্রকার রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। তিনি বলেন যে বোগলে অত্যন্ত সাংঘাতিক রকমের ক্ষীতি এবং কঠিনতা এই ঔষধ সেবনে সারিয়া গিয়াছে। অরারু'র মুখের উক্ত প্রকারের ক্ষীতি এবং কঠিনতা এই ঔষধ ব্যবহারে একবারে সারিয়া গিয়াছে। যে প্রকার পুৰাতন আকারের ফুফুসপ্রদাহজনিত বক্ষাকান্ডিত (Chronic Pneumonic Phthisis) গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে পুঁ'বাদি মিশ্রিত স্লেয়া নির্গত হয় এবং তদ্বক্ষণ শেষ বেলার প্রবল জ্বর হয় (hectic Fever) এবং রোগী অতি লীন্তু লীন্তু শীর্ণ হয়, সে প্রকার বক্ষাকান্ডের পক্ষে আয়োডাইড্ অব্ আর্সিনিকের ২২ হইতে ৬৪ দশমিক ক্রমের গুঁড়া ২১১ গ্রেইণ্ মাত্রার বিশেষ উপকারী। ইং ১৮৮০ সনে বোম্বে নগরে উক্ত প্রকারের একটা বক্ষাকান্ডাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় আর্সিনিক্ আয়োডাইড্ ২২ক্রমের গুঁড়া, ২গ্রেইণ্ মাত্রার, প্রতিদিন ৩মাত্রা করিয়া ১ সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিয়া লেখক আশ্চর্যকৃত ফল পাইয়াছিলেন। এমন কি, রোগীর গলা দিয়া প্রতিদিন প্রায় এক পোওয়া বেড় পোওয়া করিয়া পুঁ'ব পড়িত এবং সকাল বেলা শরীরের স্তম্ভাপ 102° ফারণ হিট্ ডিগ্রী এবং সন্ধ্যার সময় 104° এবং কখন কখন 106° ফারণ হিট্ ডিগ্রী হইত। এই ঔষধ ১ সপ্তাহ কাল ব্যবহারে শরীরের স্তম্ভাপ সন্ধ্যার সময় 99.6° ডিগ্রী এবং প্রাতঃকালে 98.6° ডিগ্রী হইতে লাগিল এবং গলা দিয়া সমস্ত দিন রাত্রিতে ২১৩ কাঁটার অধিক পুঁ'বাদি পড়ে নাই।

আসাকিটিডা,-(হিং),-আসফ

(ASAFETIDA,-ASAF.)

পারস্ত দেশ, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানে এই গাছ জন্মে। ভারী গাছের শিকড় ছিঁড়িলে গৌদের জ্বার যে একপ্রকার পদার্থ নির্গত হয় তাহাকে আসাকিটিডা বলে। এতদ্দেশে ইহাকে হিং বলে। যধানিয়মে যেকটকাইড্ স্পিরিটে ডিস্কাইরা ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মায়বিক মণ্ডলী দ্বারা জীলোকের জননেত্রির এবং শ্বাস বস্ত্রের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। ইহা জীলোকের ডিম্ব-কোষকে উত্তেজিত করে এবং গ্লেট্রিয়া, ইম্পানিকেশি ইত্যাদি রোগ উৎপাদন করে। অস্থি এবং চর্মের উপরও ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। হিষ্টিরিয়া রোগ জনিত অস্থিরতা এবং মনের উত্তেজ; মন সর্বদা চঞ্চল এবং অস্থির; সর্বদা চিড়্ চিড়্, থিট্ থিট্ করা (ব্রাই, ক্যান্, নাক্স-বয়); সর্বদা বিপদের আশঙ্কা করা।

মস্তক। কপালে চাপিয়া ধরার জ্বার বেদনা বাহা বাঁধার মধ্যদেশে হইতে আরম্ভ হইয়া বহির্দিকে বিস্তৃত হয় (একন্, ব্রাই); কপালের বাম পার্শ্বের উন্নত স্থানে স্ফটী বিধানের জ্বার চিড়িক মারা; চোঁচ বিধাইয়া রাখিলে যেরূপ হয়, মাথা এবং কপালের দুই পার্শ্বে সেরূপ কসিয়া ধরা বা চাপিয়া ধরার জ্বার বেদনা (অনাকার্ড); বাম পার্শ্বেই এই বেদনা অধিক অল্পভূত হয়।

চক্ষু। রাহিতে মাথার মধ্য এবং উর্গাব চতুর্দিকে দৃশ্যদৃশিয়া বেদনা; চক্ষুর আইরিস মাসক অংশের গরমীর ব্যারাম জনিত প্রদাহ (Syphilitic Iritis); কর্ণির বিস্তৃত রক্তের ভাঙ্গা স্রব এবং তদ্রূপ চক্রে অলাভুক, চাপিয়া ধরার জ্বার বেদনা, বাহা মধ্যদেশে হইতে বহির্দিকে বিস্তৃত হয় এবং বিশ্রাম ও প্রচাপনে বাহ্যর উপশম হয়; চক্রে শুষ্ক এবং অলাভুক (আর্দ, মাল্); জ্বর উপরে ছিদ্র করার জ্বার প্রবল বেদনা।

নাসিকা। নাক দ্বারা দুর্গন্ধযুক্ত ক্রোম নিঃসরণ এবং নাকের হাড় ক্ষীণ ও প্রদাহযুক্ত।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলের হাড়ে অবশবোধ ; নিম্ন ওষ্ঠের ক্ষীতি ।

মুখগহ্বর ও গলার মধ্য । মুখগহ্বর, গলার মধ্য এবং আহার বহা গলনালীর মধ্যে শুষ্কবোধ ; উদর হইতে উর্দ্ধদিকে গোলার জ্বার কোম পদার্থ গলার মধ্যে ঠেলিয়া উঠিতেছে, একুণ অস্বভূত হয় (লাইকোপ্, সালফ্, ম্যাগ্নেস্-নিউর, ফাইসট্) যাহা নিবারণ করার জন্য বারম্বার চোক গিল-বার ইচ্ছা হয় এবং বাহার দ্রুণ কখন কখন খাঁসকষ্ট হয় ; আহার বহা গলনালী যেন সমুচিত হইতেছে বারম্বার একুণ অস্বভূত হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । পাকস্থলীর মধ্যে দপ্পনপানি (অ্যান্টি-টার্ট, পাল্‌স্, সিমিয়া) ; পাকস্থলীতে পূর্ণবোধ এবং উহার ক্ষীতি ও বিস্তৃতি (চায়না) ; রক্তনের গন্ধযুক্ত, পচা বা উগ্র স্বাদ বিশিষ্ট উদ্‌গার উঠা ; পেটের মধ্যে সঞ্চিত দূষিত বায়ু (Flatus) গলাদিয়া নির্গত হয়, কিন্তু উহা কখনও শুষ্কতার দিয়া নির্গত হয় না । উদর অত্যন্ত ক্ষীত এবং বিস্তৃত (অ্যান্টি-ক্লড্, চায়না) ; উদরোচ্চ প্রদেশ এবং সমুদয় উদরে পূর্ণবোধ (মার্ক্) ; উদরস্থিত পেশীতে চাপিয়া ধরার জ্বার বেদনা ।

মল এবং মলদ্বার । পুরুষক এবং শুষ্ক বারের মধ্যবর্তী স্থানে (Perineum) চাপিয়া ধরার জ্বার ঘৃণ্ণ-শ্বে বেদনা ; প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল অথবা গাঢ় গোলাবির জ্বার, কটাবর্ণের এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ (আস্, লেপ্টেণ্ডা, বাপ্টে) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র কটাবর্ণ এবং উগ্র বা ঝাল গন্ধযুক্ত (বেঞ্জ্-আস্) ; মূত্র ত্যাগের সময় এবং উহার পর মূত্রাধারের আক্ষেপ (Spasms) ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের প্রসব বেদনার জ্বার বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে কর্তনবৎ বা নিম্নদিকে ঠেলিয়া নাথার জ্বার যাতনা (আগারি-কান্, আগোজ্, কোলোফিগাম্, সিরিসিক্, পাল্‌স্) ; পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা (ক্যাছ্) ; সবৃজের আভাব, তরল এবং দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর পরিমাণে যেত প্রদর নিঃসরণ ; ঘোনি ইত্যাদির ক্ষীতি এবং প্রদাহ ।

শ্বাসযন্ত্র । বুকে আক্ষেপিক আঁটা বোধ, বাহার দ্রুণ মনে হয় যেন বন্ধের মধ্যস্থিত সমুদয় যন্ত্র অনারাসে বিস্তৃত হইতে পারিতেছে না (ক্রেটন, ইগ্নেস্, লরোস) ; বুকে কষ্টদায়ক চাপিয়া ধরার জ্বার বেদনা বা

কনকনানি ; বৃক (ডাইন পাৰ্শ্ব) সূচীবিধানে স্তায় বেদনা বা যাতনা বাহ্য মধ্য দেশ হইতে বহির্দেশ পানে বিস্তৃত হয় ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । স্নায়বিক সংস্পন্দন (ককিউন্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুতগামী এবং অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ডাইন স্ক্কাস্থির পশ্চাৎভাগে জালাবৃত্ত, সূচীবিধানের স্তায় বেদনা যাহা পাজরার হাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; পৃষ্ঠদেশে কনকনানির দরুণ কান্ন কৰ্ম্ম কবিত্তে অশক্তি ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । হাতের সমুদয় অংশের, এমন কি হাতের আঙুলের আগাতে পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলা বা সূচীবিধানের স্তায় বেদনা ; বাহুর পেশীর স্পন্দন । পায়ের পেশীর স্পন্দন ; পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক হাড় এবং পায়ের পাতার হাড় পোকায ধরা (Caries) (হিপ্প-সাল্ফ, মার্ক, মেজিরিয়াম, নাইট্রিক-অ্যাস, ফস্-অ্যাস, সাইলিনি); পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগে অত্যন্ত কষ্টদায়ক দণ্ডপানি ।

চর্ম্ম । গায় উচ্চ এবং কঠিন প্রান্ত বিশিষ্ট ক্ষত যাহা স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় এবং যাহা হইতে সহজে রক্ত গড়ে (হিপ্প-সাল্ফ, মার্ক, মেজিরিয়াম) ; বা হইতে প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বজের আভায়ুক্ত তরল, দুর্গন্ধযুক্ত এবং কখন কখন পচা পর্দা বিশিষ্ট পুঁষ নির্গমন ।

জ্বর । সময়ে সময়ে সমুদয় শরীরে শীতবোধ ; মধ্যাহ্নে আহারের পর গা গরম হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের উদ্বেগ, নিদ্রাবেশ, কিন্তু পিপাসা থাকে না ।

ব্যবহার । হিষ্টিরিয়া ; সমুদয় যন্ত্রের অতিরিক্ত চেতনা ; মনোঅবততা ; (Hypochondriasis) হাঁপানি কানি ; হৃপিং কফ বা কানি ; অজীর্ণ ; হৃৎবেদনা ; উদরাময় ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে কষ্টকর রজঃস্রাব ; পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা ; অস্থি এবং চর্ম্মের পারার অপব্যবহার বা গণ্ডমালা জনিত অসুখ ; (যথা অস্থি পোকায ধরা এবং ক্ষত) ; অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ হেতু অসুখ (Rickets) ; তরুণ এবং পুৰাতন আকারের গৌণ উপদংশ (Secondary and Tertiary Syphilis) ইত্যাদি অসুখে আসফিটিডা ব্যবস্থা ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । হিষ্টিরিয়া যোগে গলারমধ্য এবং

আহারবহা গলনালীর মধ্যে অত্যন্ত কষ্টাশ্রুতব; বসিরা থাকিলে সমুদয় উপদ্রব আরম্ভ হয় এবং বহির্কায়ুতে এবং নড়াচড়াতে অশ্রুতের বৃদ্ধি ইত্যাদি আসাকিটিভার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। দ্বায়বিক, হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত হওয়া এবং গণ্ডমালা ধাতু; গণ্ডমালা ধাতু, চোন্দা এবং অপ-
রিষ্কার শিশু বা বাগক বালিকার পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। দ্বায়বিক মণ্ডলীর উপর ইহার কার্য আশ্রু, মক্ষাশ্ এবং বেলেরিয়ানের স্তায়। অস্থির উপর ইহার কার্য অরাম, ক্লোরিক-আসিড, মার্কিউরিয়াম্, ফক্করাস্ এবং সাইলিনিয়াম স্তায়। এতদ্ভিন্ন ইহার কার্যের সঙ্গে আর্সিনিক, বেগাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যান্ডেরিয়া-কার্ব, কষ্টিকাম্, চায়না, কার্বো-বেজিটেবিলিস্, কফিরা, কোনারাম্, লাইকোপডিয়াম্, নাইট্রিক্ আসিড্, পাল্মেটিগা, পিপিধা এবং সালফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। কষ্টিকাম্, ক্যান্কার, চায়না, মার্কিউরিয়াম্, পাল্মেটিগা।

ডাইলুশন বিচার। হিষ্টিরিয়া ঘটিত অশ্রুতে ১ম, ২য় এবং ৩য় দশ-
মিক ক্রমের আরোক বিশেষ উপকারী। ডাক্তার হলকোম্ (Dr. Holcombe)
বলেন যে, অস্থির অশ্রুতে (অস্থি পোকার ধরিলে, -Caries) ১২ এবং ৩০
ডাইলুশন বিশেষ উপকারী।

বিস্মাথাম্, -বিস্মাথ, -বিস্মাথ্

(BISMUTHUM, -BISMUTH SUBNITRATE, -BISM.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধাগর হইতে আদত বিস্মাথ্, সাবনাইট্রেট্ ক্রয় করিয়া যথানিয়মে সুগার অবস্কের সঙ্গে মিলাইয়া ১ম দশমিক হইতে ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রম হইতে যথানিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। যে সকল যন্ত্র নিউমোগ্যাট্রিক্ বায়ুর (Pneumo-

gastric nerve) শাসনাধীন, সেই সকল যন্ত্রের উপরই ইহার কার্য অতি
এবল। পাকস্থলীর উপর ইহার কার্য সর্বাঙ্গিক প্রবণ এবং তদনুসারে পাক-
স্থলীতে বমন সম্বন্ধিত বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । মাথায় চাপিয়া ধরার জ্ঞান বেদনা এবং কপাল প্রদেশে
ভারিবোধ ।

চক্ষু । ডাইন চক্ষু গোলকে বেদনা বাহ্য সম্মুখ দিশে হইতে আরম্ভ
হইয়া পশ্চাৎদিকে এবং নিম্নদিক হইতে আগন্ত হইয়া উপরের দিকে বিস্তৃত
■ ■ ; চক্ষুর দুই কোণে গাঢ় পূঁথের জ্ঞান কেতুকের সঞ্চার ।

মুখগহ্বর । দন্তশূল ঠাণ্ডাজল মুখে লইলে বাহার উপশম হয় (কফিয়া) ।

পাকস্থলী এবং উদর । শেষ বেলা বা সন্ধ্যার সময় জিহ্বা
সাদা লেপযুক্ত (শ্রীতঃকালে জিহ্বা উক্ত প্রকারের লেপযুক্ত হইলে সাল্‌ফ্‌) ;
বারবার কাঠ উদগার উঠা এবং পাকস্থলীতে অত্যন্ত অস্থির বোধ ; আহার
বা যাত্তন তৃপ্ত পানের পর বমন বা বমনোৰ্বেগ ; তরল পদার্থ বমন ; মল
পাকস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাত্রাই বমন (ফল্‌) ; কোন একটা ভারি
পদার্থ চাপিয়া থাকিলে বক্রণ হয়, আহারের পর পাকস্থলী প্রদেশে অত্যন্ত
কষ্টদায়ক এবং জ্বালাযুক্ত সেক্রণ চাপাবোধ (আস্‌) ; বমন বা আক্কেপিক
বমনোৰ্বেগ বা কাঠবমী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে অকথা বেদনা
বা ধস্তণা ; পাকস্থলীতে আক্কেপিক বেদনা ; পাকস্থলীতে একবার জ্বালা-
বোধ এবং একবার চাপাবোধ ; মেরুদণ্ডে চাপাবোধ, বাহার দরুণ রোগী
পশ্চাৎপানে বাঁকিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। গৃহস্থার দিয়া বারম্বার দূষিত বারু
(Flatus) নিঃসরণ ; তলপেটে চিন্‌চিনে বেদনা এবং চাপাবোধ ও উহার
সঙ্গে সঙ্গে পেটে গড়্‌ গড়্‌, কল কল শব্দ হওয়া এবং মল ভাগের ইচ্ছা ।

মূত্রযন্ত্র । বারম্বার প্রচুর পরিমাণে জলবৎমূত্র ভ্যাগ ।

শ্বাসযন্ত্র । চলিবার সময় বন্ধ এবং উদর কোটরের মধ্যস্থিত পৌল
পেনী বা (Diaphragm) প্রদেশের মধ্য দিয়া আক্কেপিক এবং চাপিয়া
ধরার জ্ঞান বেদনা ; বৃক্‌, পিঠে ছিঁড় করার জ্ঞান এবং জ্বালাযুক্ত বেদনা ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । ডাইন বাহ্যে পক্ষাঘাতের স্ফার অবশ্য এবং জ্বৰ্ণ-বোধ; ডাইন বাহ্যের সমুখভাগে অবশ্য কারক এবং ছিঁড়িয়া ফেলা বা চাপিয়া ধরার স্ফার বেদনা, বহির্দিকেই বাহ্যে অধিক অশুভ হইয় এবং নড়া চড়া ও স্পর্শনে বাহ্যে দূরীভূত হয়; ডাইন হাতের তর্জনী এবং মধ্যমাস্থলীর হাড়ে ছিঁড়িয়া ফেলার স্ফার বেদনা; ডাইন হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে ছিঁড়িয়া ফেলার স্ফার তীক্ষ্ণ বেদনা বাহ্যে নখের নীচেই অধিক অশুভ হয় ।

চর্ম্ম । পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক হাড়ের পার্শ্বে এবং উত্তরপায়ের পাতার পশ্চাদ্দেশে সন্ধির নিকটবর্তী স্থানে ক্ষতকারক চুলকানি, চুলকাইলে বাহার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যে পর্য্যন্ত রক্ত না পড়ে, সে পর্য্যন্ত চুলকাইতে ইচ্ছা হয় ।

নিদ্রা । শেব রাত্রিতে অত্যন্ত ঘুম হয় না; ভয় থাকিলে ঘোরতর হয়, রাত্রিতে বারংবার সেরূপ জাগিয়া উঠা; স্ত্রী বা পুরুষ সহবাস সম্বন্ধীয় স্বপ্ন দেখিয়া অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল না হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন ধাতু-নির্গত হয়, কখন বা ধাতু নির্গত হয় না ।

ব্যবহার । পাকস্থলীর অশুখে, বিশেষতঃ বমন সম্বলিত পাকস্থলীতে বেদনার বিস্মাৎ বিশেষ উপকারী । তেজ, বমন এবং পেটে বেদনা সম্বলিত পেটের অশুখ; উদরাময় ইত্যাদি অশুখে ইহা বিশেষ উপকারী । টেষ্ট (Teste) বলেন যে, জীলোকের সন্তান প্রসবের পর পায়ের ডিমের শিরাদির সাদা ক্ষাতিতে (Phlegmasia Alba Dolens) বিস্মাৎ ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । বিস্মাণের কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক্, আর্জেন্টাম্, হাইড্রোম্যারেনিক্ আর্সিড্ এবং জিক্কামের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আণ্টিমোনিয়াম্, ক্রোডাম্, বেলাডোনা, ক্যাকেরিয়া কার্বোনিকা, হাইড্রাষ্টিস্, ইগ্‌নিসিয়া, লাইকোপডিয়াম্, ফক্ষরাস্, নাক্স-বনিকা, পাল্‌সেটিল্লা, রাস্‌টেল্ল, সিপিরা এবং গাল্‌ফারের কার্য্যেরও সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব, ক্যাপ্‌সিকাম্, নাক্স-

ক্ষমিকা। অধিক মাত্রায় বিস্মাথ দ্বারা বিযুক্ত হইলে বমন উৎপাদক ঔষধ প্রয়োগের পর দুগ্ধাদি ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। হানিয়ান এই ঔষধের ২য় ক্রমের গুঁড়া ব্যবহার করিতেন। আমরাও ১ম এবং ২য় ক্রমের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকি। ডাক্তার ইল্‌চাম্ (Dr. Yoldham) বলেন যে, পাকস্থলীর বমন সম্বলিত বেদনার এই ঔষধের মিশ্র গুঁড়াতে কোন ফল না পাইয়া আদত বিস্মাথ ৫ গ্রেইন মাত্রায় ব্যবহার করিয়া জীলোক দিগের উক্ত প্রকারের পাকস্থলীর বেদনায় তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন। লেখকও ডাক্তার ইল্‌চামের উক্ত মতের পোষকতা করেন। তিনি ২।৩ স্ট্রি রোগীর উক্ত প্রকার পেটে বেদনায় আদত বিস্মাথ, ১ গ্রেইন মাথায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

বোরাক্স,-সোহাগা,-বোরাক্স

(BORAX,—BORAX)

কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধানর হইতে আদত বোরাক্স (সোহাগা) ক্রম করিয়া যথা নিয়মে সুগার অব্ মিকের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ২য় দশমিক ক্রম হইতে যথা নিয়মে ৩য় শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মহাঘায়ে এই ঔষধ কি প্রকারে বা প্রথাতে কার্য্য করিয়া থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু স্নায়িক বিজ্ঞী, প্রধানতঃ মুখগহ্বর, অস্ত্র, স্ত্রাসু এবং যোনিদ্বারের স্নায়িক বিজ্ঞীর উপর যে ইহার কার্য্য অতি প্রবল সে সন্দেহ সন্দেহ নাই। খাস যন্ত্র এবং চর্ম্মের উপরও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নদিকে নামিতে ভয় এই ঔষধের একটি বিশেষ মানসিক প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। নিম্নদিকে চলিতে ভয় পাওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখাক্তি উদ্বেগের চিহ্নযুক্ত, (দোলায় ছলিলে, দোলায় ভায় কেদারায়

বসিগে, বা উপরের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচের ঘরে নামিবার সময়
 যত্নপূর্বক হইয়া থাকে); অপরকে কোন কাজ করিতে ইচ্ছা না হওয়ার
 দরুন চূপ মারিয়া বসিয়া থাকা; কোন কাজ কর্তব্য না করা বা একবার
 একাজ আবার ওকাজ, এরূপ বারম্বার কাজ পরিবর্তন করা; বারম্বার এঘর
 হইতে ওঘরে যাওয়া এবং কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট না করিতে পারা; মনের
 অত্যন্ত উবেগ এবং নিঃশব্দ বা নিঃশব্দ ইচ্ছা; সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১১টা
 পর্যন্ত মনের উবেগ থাকে; সর্বদা চিড়্ চিড়্, থিট্ থিট্ করা এবং সকল
 বিষয়েই অসন্তোষ প্রকাশ করা (ব্রাট, ক্যান্, নাক্স-বম্); সর্বদা অলসভাবে
 সময় কাটান; সামান্য শব্দ শুনিয়াও সহজে চমকিয়া উঠা।

মস্তক। চুলের আগা একত্র জড়াইয়া যায় এবং চুলের জড়িত
 আগা কাটিয়া দেওয়ার পর চুল বড় হইলে উহা আবার জড়াইয়া যায়; সমুদয়
 মাথায় কনকনানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোবেগ এবং বমনের ইচ্ছা
 ও সমুদয় শরীরের কাঁপনি।

চক্ষু। চক্ষুর পদ্ম (পিছি) চক্ষুর মধ্যমিকে বাঁকিয়া মধ্যে প্রবিষ্ট
 হওয়ার দরুন চক্ষু, বিশেষতঃ নাকের নিকটবর্তী কোণ, প্রদাহযুক্ত হয় এবং
 চক্ষুর পাতার প্রান্ত কতকগুলি হয় ও টাটার (মার্ক্); ডাইন চক্ষের
 ডাইন বা বহির্দেশের কোণ প্রদাহযুক্ত হয় এবং উহার পদ্ম এলোমেলো
 ভাবে থাকে; রাত্রিতে চক্ষুর পাতার পাতার লাগিয়া থাকে (লাইকোপ্,
 মার্ক্, পাল্, সাল্); প্রাতঃকালে লিখিবার সময় চক্ষুর সম্মুখে পাখির
 ডানা ঝাড়ার ভায় ধড়্-ধড়ানী, বাহার দরুন দেখিবার ব্যাঘাত জন্মে বা
 চক্ষে কাপ্লা দেখায়; চক্ষুর সম্মুখে যেন উজ্জল ঢেউ ডাইন দিক হইতে
 বাম দিকে এবং উপরের দিক হইতে নিম্নদিকে গড়াইয়া যাইতেছে এরূপ
 অনুভূত হয়।

কর্ণ। কানে সৌ সৌ শব্দ হওয়া; বাম কানে স্থগীর্বিধানের ভায়
 অনুভূত হয়।

নাসিকা। নাকের মধ্যে শুকনা চুমটি পড়ে বাহা একবার ফেলিয়া
 দিলে পুনরায় পড়ে; বাম নাসারন্ধ্রের সম্মুখভাগে নাকের নিকট ব্রণ এবং
 উহাতে বেদনা বা টাটানি ও নাসিকার অগ্রভাগের ক্ষীতি; নাকের

জিঙ্গল লাল বর্ণের ক্ষীতি এবং উহাতে দশদণ্ডানি এবং কসিয়া ধরার ভ্রাস বেদনা (বল) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল ফিকা বা শিটা এবং মেটে রঙ্গ বিশিষ্ট (আস, চায়না); মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং উহাতে অত্যন্ত জ্বালা উৎপাদক উকামুতব (একন, বেল) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দন্তমাড়ি ত্রণ (Gum-boil) বাহাতে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয় এবং ছিদ্র বিশিষ্ট দাঁতে ঘৃণ, ঘৃশে বেদনা; গাল এবং মুখমণ্ডলের বাম দিকের সমুদয় অংশের ক্ষীতি ; জিহ্বা, ওষ্ঠ এবং গালের মধ্যদেশের ক্ষত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখগহ্বরের শুষ্কতা (হাইড্রিট, হেলিবোরাস, আয়োড, মার্ক, নাইট্রিক-আস); জিহ্বার উপরে অত্যন্ত কষ্টদায়ক লাল কোড়ার ভ্রাস ফুসুড়ী (নাক্স-বম), বাহার দরুণ মনে হয় যেন জিহ্বা পুড়িয়া ছাল উঠিয়া গিয়াছে; পুড়িলে বেরুণ হয়, তালুকার সমুদয়ের অংশে বেশ সেরুণ কোঁচকাইয়া যায় এবং কোন জব্য চিবাইবার সময় অত্যন্ত বেদনা-বুদ্ধ হয়; মুখে বিষাদ, তিক্ত স্বাদ বা স্বাদ একবারেই থাকে না (ব্যাণ্ট, ক্রাই, পালস, সাল্ফ) । গলার মধ্যে সাদাটিয়া কঠিন স্লেয়ার লকার শাফ্র অনেক কষ্টে বা চেষ্টাতে গলার মধ্য হইতে নির্গত হয় (এইলাছ, আমন-মিউর) ।

পাকস্থলী এবং উদর । আহারের পর পাকস্থলীর ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি ও উহাতে অত্যন্ত অস্বথবোধ এবং গা বমী বমী করা; কোমল ভ্রাসি জব্য উঠাইতে চেষ্টা করার পর পাকস্থলী প্রদেশে বেদনা আরম্ভ হইয়া কোমরের পশ্চাৎদেশে বিস্তৃত হইয়া সূচীবিধানের ভ্রাস বেদনার পরিণত হয়; বেদনার দরুণ রাত্রিতে পাশ ফিরিয়া শুইতে পারা যায় না; শেষ রাত্রি বা প্রাতঃকালে বেদনার উপশম । আহারের পর দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার দরুণ উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত হয় (কার্বো-বেজ, চায়না); উদরে ভিন্‌ডিনে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় ।

মল । কোমল ফিকা হরিদ্রাবর্ণ (এণ্ড্রা, চেলিডন) স্লেয়া ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলক্ষয়; শিশু বা বালক বালিকা-গণের সবুজ বর্ণের মল ভেদ এবং দান্তের পূর্বে ক্রন্দন (কলোস); প্রাতঃকালে বেদনাহীন উদরাময় (পডোফ, সাল্ফ) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রত্যাগের অভ্যন্ত প্রবল ইচ্ছা (একন), বাহার দ্রুত
রাজিতে প্রস্রাব করার জন্য বারম্বার বিছানা হইতে উঠিতে হয় (আহু) ;
বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগমিলে এক কোঁটাও মূত্র নির্গত হয় না
(একন, কাহ) ; মূত্রত্যাগের পর মূত্রনালীতে জ্বালা ও চিড়িকমারা ;
শিতগণের উষ্ণ বা জ্বালা উৎপাদক মূত্র নির্গমন (একন, কাহ) ; শিত প্রায়
১০।১৫ মিনিট অন্তরই প্রস্রাব করে এবং প্রত্যেকবার মূত্রত্যাগের পূর্বেই
চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠে ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের নিরমিত সময়ের অনেক পূর্বে, প্রচুর
পরিমাণে রজঃস্রাব (আমন্-কার্ক, আস, ক্যাল্-কার্ক, নাক্স-বম)
এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বিগ্ন এবং পেটকামড়ানী বা বেদনা ; ডিম্বের
লালের জ্বালা বেতপ্রদর নিঃসরণ (আমন্-মিউর, বোবিস্টা, ক্যাল্-কন্,
মেজিরিয়াম) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন গরম জল জরায়ু হইতে
বোনিহার দিবা বহিরা পড়িতেছে ; সাদা গাঢ় কাঁহিরের জ্বালা বেত প্রদর
নিঃসরণ ; রজঃস্রাবের পূর্বে পাকস্থলী হইতে কোমরের পশ্চাৎদেশ পর্যন্ত
বেদনা ; রজঃস্রাবের সময় কুঁচকিতে স্থচীবিধান বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বালা
বেদনা ; শিতকে শুষ্ক পান করানোর পরক্ষণেই শুনে কামড়ানী বা স্থচী-
বিধানের জ্বালা বেদনা, বাহার দ্রুত রোগী হাতের পাতা দিয়া শুষ্ক চাপিয়া
রাখিতে বাধ্য হয়, কারণ তাহা না হইলে শুষ্ক কনকন করে ।

শ্বাসযন্ত্র । থুগুথুশে এবং প্রবল কাশি এবং গলাদিয়া সামান্য পরি-
মাণে বিস্তীর্ণ শ্বাস এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্লেমা নির্গমন ; কাশি এবং গলাদিয়া রক্তের
ছিটবৃত্ত সাদা স্লেমা নির্গমন ; ২।৪ মিনিট অন্তরই হোমী দীর্ঘনিশ্বাস টানিতে
বাধ্য হয় এবং তৎপর বৃকের ডাইন পার্শ্বে স্থচীবিধানের জ্বালা বেদনা বা
যাতনা আরম্ভ হইয়া বেদনা কমে ; দীর্ঘনিশ্বাস এবং আন্তে আন্তে প্রশ্বাস
বহে ; প্রত্যেকবার কাশি ও দীর্ঘনিশ্বাসের সময় বৃকে ঝাটরা বা কদিয়া ধরার
জ্বালা বেদনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ক) ; হাঁহিভোলা কাশি দেওয়া অথবা দীর্ঘনিশ্বাস
প্রশ্বাসের সময় বৃকে স্থচী বিধানের জ্বালা বেদনা ; চাপিলে, বা ঠাণ্ডা জলে
বুকে ধোয়াইলে বৃকের বেদনার উপশম এবং সদ্যপানে উহার বৃদ্ধি হয় ।

চক্ষু । চক্ষু অন্ধ, বাহার দ্রুত গায় সামান্য ক্ষত হইলেই

করিয়। উহাতে সুঁথের নকার হয় (ক্যাম, হিপ-সাল্ফ, গ্রাফ, সাইনিসি, সাল্ফ); মুখমণ্ডল এবং হাতের চামড়ার উপর যেন মাৰ্জনার আল লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অস্বভূত হয়; আঙ্গুলের সন্ধির পশ্চাৎদেশে অত্যন্ত চুলকানি, বাহার দৰুণ অত্যন্ত চুলকাইবার ইচ্ছা হয়; গালে এবং টুটীক চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল ফুসুড়ী; শীতকালে হাত পায়েৰ আঙ্গুল হেজে বাও-রায় ভ্রায় লালবর্ণ হয় এবং উহাতে অত্যন্ত আগারুত হয় (আগারিকাম্)।

নিদ্রা। স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক ঘুম হয় বটে, কিন্তু বারবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; শেষ রাত্রি ৩ টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং সমুদ্র শরীরে গরমবোধ হওয়ার দৰুণ ঘুম হয় না এবং এই সময়ে উরুদেশে ঘৰ্ষ হয়, ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলে বেরুপ হয়, শিশু ঘুমেরঘোরে সেরূপ হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে।

ব্যবহার। মুখে বা; শিশু বা বালক বাণিকার উদারময়; জীলো-কের কষ্টকর রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনা; ষেতপ্রদর বা পদীর জ্বর শদাৰ্থযুক্ত রক্তস্রাব; বক্ষ্যাত্ত ইত্যাদি অস্থে বোরাক্স ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। ডাক্তার গ্যারেলি (Dr. Guorensy) বলেন যে নিম্নদিকে নামিতে ভয়ের উদ্ভেজ এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাক-তিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। শিশুগণের দাঁত উঠার সময় অস্থ এবং তাহাদিগের অত্যন্ত সময়ের অস্থের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। বোরাক্সের কার্যের সঙ্গে বেলাভোনা, আইওনিয়া, ক্যাসোমিলা, সিনা, ক্যাল্কেরিয়া-কার্বোনিকা, ক্যাল্কেরিয়া-ফকরিকা, ককিয়া, হিপার সাল্ফিউরিস, মার্কিউরিয়াম্, নান্স-বমিক, পাল্‌সেটিগার্ কার্খোয় শাদৃশ আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাসোমিলা, ককিয়া।

ডাইলুশন বিচার। সচারাচার আদত মোহাণা শুভা করিয়া ১ হইতে ৫ গ্রেইন মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার অনেক সময় ইহার ১ম বা ২য় দশমিক ক্রমের শুভা ২.৩ গ্রেইন মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোহাণার শৈ শুভা করিয়া উহাতে অল্প পরিমাণে মধু মিশাইয়া মুখের দ্বাৰা লানাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। অনেক চিকিৎসক মুখের দ্বাৰা এই ঔষধের

১ম দশমিক ক্রমের শুঁড়া মধুন সঙ্গে নিশাইয়া বাহ প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। আবার এই ঔষধের কেবল বাহিক প্রয়োগেই অনেক সময় মুখের ঘা সারিয়া যাইতে দেখা যায় ।

ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা, -(গাঁজা)-ক্যান্-ইণ্ড্ (CANNABIS INDICA, -INDIAN HEMP, -CANN-IND.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোনিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে একটুকটাম্ ক্যানাবিস্ ইণ্ডিস (Extractum Cannabis Indicae, P. B.) ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে রেকটিকাইড্ স্পিরিটে নিশাইয়া ইহাৰ মূল আবেক প্রস্তুত হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা স্নায়বিক মণ্ডলকে অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়া মস্তিষ্কে বিকৃত করে এবং স্নায়বিক মণ্ডলীর জ্ঞান এবং গতি উৎপাদক শক্তির চাকলা বৃদ্ধি করে । একজন্ত এতদ্দেশে মনের উন্নাস উৎপাদন করার জন্ত অনেক লোক গাঁজা খাইয়া থাকে । বাহ্যিক গাঁজা খায় তাহাদিগের যাত্ন বুদ্ধিমা উচ্চ উন্নাসের পরিমাণ কম বা অধিক হইয়া থাকে । গাঁজা খাইলে অতি সামান্য বিষণ্ড মনে গুরুতব বলিয়া অনুভূত হয় । স্বাভাবিক অবস্থায় মনের যে যে বৃত্তি প্রায় থাকে, গাঁজা খাইলে সে সকল বৃত্তি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া থাকে । যথা স্বাভাবিক অবস্থায় যে চক্ষু করান ইচ্ছা থাকে, গাঁজা খাইলে সেই চক্ষু করিবার ইচ্ছা চরম মীমা প্রাপ্ত হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় যে ভাষা কাব্য কবিতার ইচ্ছা থাকে, গাঁজা খাইলে সে ভাষা ইচ্ছা উহার চরম মীমা প্রাপ্ত হয় । এই ঔষধের বিশেষ কার্য্য নিম্ন লিখিত লক্ষণাদিতেই বিশেষ করে প্রকাশ পাইবে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মনের অত্যন্ত উন্নাস এবং নানা বিষয়ে চিন্তা, অর্থ ও ভ্রম প্রকাশ করা (হারোস্, ল্যাক্, ষ্ট্যান্) ; সর্বদা আমোদ করা এবং অনিষ্ট করার ইচ্ছা ও অতিরিক্ত হাসি ; অনেক প্রকারের ভ্রম এবং কাল্পনিক বিষয় দেখা (আবিসিঙ্ক্, হারোস্, ষ্ট্যান্) ; সর্বদা চিন্তাযুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের অত্যন্ত কষ্ট, বহির্লীয়াতে যাহার উপশম হয় ; বারংবার পাগল

হওয়ার ভয় (কাল্‌ক-কার্ক, মার্ক) ; অল্প সময় অধিক এবং সামান্য দূরত্বে অধিক দূর বলিয়া অনুভূত হয়, যথা ১ মিনিট সময়কে ১ বৎসর এবং ২৩ হাত দূরত্বে ২৪ ক্রোশ বলিয়া অনুভূত হয় ; অরুকারে ভয়ের উদ্বেক হয় ; মৃত্যু যেন নিকটবর্তী রোগী এরূপ মনে করিয়া অত্যন্ত ভয় খায় (একন্, আস্) ; মস্তিষ্কের মধ্যে নানা বিষয়ের চিন্তার উদয় হওয়ার দরুন রোগী কোন বিষয় বা ঘটনার কথা স্মরণ করিতে পারে না ; সর্বদা উন্মনকতা (এপিস) ; অচেতনাবস্থা ; মলোন্মত্ততা (Delirium Tremens) ; শরীর কম্পন ; চিত্ত বিভ্রম ; সর্বদা চটাচটি করার ভাব ; বমনোদ্বগ ; অদৃশ্য পিপাসা ।

মস্তক । বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথাধোরা এবং উভয় সঙ্গে সঙ্গে মাথার পশ্চাৎভাগে অবসন্ন কারক বেদনা ; বারম্বার অনিচ্ছা পূর্বক মাথার ঝাকনি ; মস্তিকে অত্যন্ত ভারি এবং চাপা বোধ, যাহার দরুন রোগী ঝাড় হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; মস্তিষ্কের মধ্যে যেন বারম্বার হঠাৎ ধাক্কা লাগে ; কপালে, বিশেষতঃ চক্ষুর উপরিভাগে, কসিয়া ধরার স্থায় ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনা ; কপালে দগ্ধপানি বা কনকনিয়া বেদনা ; কপালের ডাইন পার্শ্বে, মাথার মধ্যদেশ এবং পশ্চাৎ দেশ গানে ঝাকি লাগা ; কপালের হুই পার্শ্বে কনকনানি, ডাইন পার্শ্বেই যাহা অধিক প্রবল বলিয়া অনুভূত হয় ; কপালের ডাইন পার্শ্বে স্থলীবিধানের স্থায় ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনা ; মাথার ডাইন পার্শ্বের সমুদয় অংশেই বেদনা ; মাথায় অত্যন্ত ভারিবোধ এবং রোগী চেতনাহীন হইয়া পড়িয়া যায় ।

চক্ষু । একদৃষ্টে তা কাইয়া থাকা ; অজ্ঞান অবস্থায় নানা প্রকারের কাল্পনিক বিষয় দেখা ; চক্ষুর বহির্দিকের কোণে এবং চক্ষুর পাতার ঝাকনি ; চক্ষুর যোজক স্বকেষ শিরাদি লাল বর্ণ (একন্) ; পড়িবার সময় পুস্তকাদির অক্ষর গুলি যেন একত্রিত হইয়া জড়াইয়া যায় ; চক্ষুর কপনি এবং চক্ষুর সম্মুখে ধড়্‌ফড়গী ।

কর্ণ । হুই কানেই বেদনা ; উভয় কানেই দগ্ধপানি এবং পূর্ণ বোধ ; কানের মধ্যে টন্ টন্, বজ্ বজ্ শব্দ হওয়া ; কানের মধ্যে জল সিদ্ধ করার স্থায় শব্দ হওয়া ; স্বপ্নের অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট সময়ে কানে গান করার স্থায় শব্দ শুনা যাহা স্বপ্নের অবস্থা দূরীভূত হইলে থাকে না ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল ক্লান্ত এবং শ্রান্ত হওয়ার চিহ্নযুক্ত ; মুখাকৃতি নিম্নাবশেষের জ্বর বা বোকার জ্বর চিহ্ন বিশিষ্ট ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । আঠা নাখাইয়া রাখিলে ঘেঁরুণ হয়, দুই ওষ্ঠ যেন সেরূপ লাগিয়া থাকে ; ঘূমেরঘোরে দাঁতে দাঁতে কড়্, মড়্, খট্, খট্, খট্, খট্ শব্দ করা (সিকুটা) ; মুখগহ্বর এবং ওষ্ঠে শুকাহুতব ; মুখে সান্দা, গাঢ়, কণায়ুক্ত এবং আঠা থুথু উঠে ; সমুদয় খাদ্য জ্বায়ই যেন খাইতে খুব ভাল লাগে ; সর্বদা তোতলার জ্বর বৎ গলা কাঁপাইয়া কথা বলা (কষ্ট্, ট্রামন্) ; জিহ্বা যেন একবারে শুকাইয়া বার, বাহার দরুণ ঠাণ্ডা জল খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয় ।

পাকস্থলী । ক্ষুধা ; পাকস্থলীর স্থাপিণ্ডের নিকটবর্তীস্থ মুখের নিকট বেদনা, প্রচাপনে বাহার উপশম হয় ।

মলদ্বার । একটি গোলাব উন্নত গুহদ্বার চাপিয়া বসিলে ঘেঁরুণ হয়, গুহদ্বারে সেরূপ অস্থূত হয় ; মনে হয় যেন গুহদ্বার এবং মূত্রনালীর এক অংশ একটি কঠিন গোলাকারের পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে ।

মূত্রযন্ত্র । হাসিবার সময় মূত্রকোষে বেদনা ; মূত্রকোষে জ্বালা, কনকনানি অথবা স্তম্ভবিধানের জ্বর তাক্র বেদনা ; পুরুষাঙ্গ টিপিলেই মূত্র-নালী দিয়া শ্লেষ্মার জ্বর এক প্রকার চক্চকে পদার্থ নির্গত হয় ; মূত্রত্যাগের সময়, উহার পূর্বে এবং উহার পর মূত্রনালাতে জ্বালা ও চিড়িকমার, অথবা হল ফুটানের জ্বর বেদনা (ক্যানাবিস্ সাট্, ক্যান্) ; প্রস্রাবের বেগ হয়, বুটে, কিন্তু বেগ দিলে মূত্র ১ ফোঁটাও নির্গত হয় না ; প্রচুর পরিমাণে রক্তহীন মূত্রত্যাগ ; প্রস্রাব পাইলে অনেকক্ষণ বসিয়া চেঁচার পর মূত্র নির্গত হয় এবং হাত দিয়া পুরুষাঙ্গ টিপিয়া শেষ কএক ফোঁটা মূত্র বাহির করিতে হয় ; প্রস্রাব ধারে পড়ার পর মূত্র আপনা আপনি গড়াইয়া পড়ে ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের জীসহবাসের ইচ্ছার অত্যন্ত বৃদ্ধি (ক্যান্) ; জীবিরে চিন্তার পুরুষাঙ্গ খাড়া হয় না ; পুরুষাঙ্গ প্রায় সদাসর্বদাই সুজোরে খাড়া হয় এবং শুদ্ধরূপ অত্যন্ত যাতনার উদ্রেক হয় (ক্যান্) ; পুরুষাঙ্গ শিথিল এবং ছোট হয় (আগ্‌নাশ্) ; পুরুষাঙ্গের মাথার চুলকানি । জীলোকের প্রচুর রক্তপ্রাব (বেল্, নাস্-বম্) ।

শ্বাসযন্ত্র । কর্কশ কাশি এবং কাশিবার পরক্ষণই বক্ষাহির পশ্চাৎ দেশে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ভায় অমুভূত হয় (আশ্বা, কন্, কমেস্ব) ; দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে অনেক প্রয়াস পাইতে হয় ; বৃকে কষ্টাভূতব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রবাহে কষ্টাভূতব ; রোগী মনে করে যেন তাঁহার নিশ্বাস প্রয়াস বৃদ্ধ হইবে এবং বাহার দক্ষণ রোগী পাখার বাতাস খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে (আস্) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নার্ভী । হৃৎস্পন্দন, বাহা সময়ে সময়ে এত প্রবল হয় যে, উহার দক্ষণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; হৃৎপিণ্ডে চাপিয়া ধরার ভায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিন শ্বাসকষ্ট ; হৃৎপিণ্ডে ছুরী বিধানের ভায় বেদনা ; মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড হইতে কোন তরল পদার্থ ফোঁটার ফোঁটার পড়িতেছে ; হৃৎপিণ্ডে স্থলীবিধানের ভায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে অত্যন্ত যাতনা ; দীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহে যাতনার উপশম হয় ; নার্ভী অত্যন্ত মৃদুগতি বিশিষ্ট, এমন কি ইহা প্রতি মিনিটে ৪৬ বারের অধিক স্পন্দন করে না (ভিজিট, ওপিয়াম) ।

পৃষ্ঠদেশ । কক এবং মেরুদণ্ডের মধ্যদিয়া বেদনা, বাহার দক্ষণ রোগী নোজা হইয়া চলিতে না পারিয়া ঘাড় হেট করিয়া উপুড় হইয়া চলে ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । নিম্নাঙ্গ এবং ডাইন বাহর পক্ষাঘাত ; বাহু এবং হাতের মধ্য দিয়া বন্ধনানি বা কোন তীক্ষ্ণ পদার্থ বিধার ভায় অমুভূত হয় বা কুটকুটানি । পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গ সমূহের সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত ; পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গে ক্লান্তিবোধ ও হাঁটুর সন্ধির কঠিনতা এবং উহাতে কন্ধনানি ও প্রায় পক্ষাঘাতের ভায় অবশ বা অসাড়বোধ ; হাঁটুর সন্ধি হইতে নিম্নাঙ্গকে বন্ধনানি এবং কোন তীক্ষ্ণ পদার্থ বিধানের ভায় অমুভূত হয় বা কুটকুটানি এবং মনে হয় যেন কোন একটা পাখীর পাক্সার নদী দিয়া হাঁটু শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে ; চলিবার সময় মনে হয় যেন পায়ের পাতার তলায় লোহার কাঁটা ফুটিতেছে এবং উহা যেন পায়ের পাতার ফুটিয়া পা দিয়া বহিয়া উপরের দিকে উক্কর সন্ধি পর্য্যন্ত বাইতেছে এরূপ অমুভূত হয়, বাহা ডাইন অঙ্গেই অধিক অমুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উভয় পায়ের তিমে কসিয়া ধরার ভায় বেদনা ; বাম পায়ের

পাতার অস্থি সন্ধিতে খোঁচা বিধার জ্বাৰ বেদনা, বাহা পায়ের বুচ্ছাঙ্গুলিতেই অধিক অনুভূত হয় ; বামপায়ের বুচ্ছাঙ্গুলির মাথার ষাটিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা ।

নিদ্রা । অত্যন্ত ঘুমের ভাব বা ইচ্ছা (নাঙ্ক-মক্) ; ঘুম ভাল হয় বটে, কিন্তু ঘুমেরঘোবে বিমর্ষতা উৎপাদক স্বপ্ন হয় ; ঘুমের অবস্থায় চমকিয়া উঠা, বাহ্যিক দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; ঘুমেরঘোরে জী বা পুরুষ সহবাস বিষয়ে স্বপ্ন দেখিয়া ধাতুনিঃসরণ ; ঘুমেরঘোরে ভবিষ্যতে কি হইবে, বিরক্তি জনক ভবিষ্যতে বিনাশ এবং বিপদের বিষয়ে স্বপ্ন দেখা ; ঘুনাইয়া পড়িলেই প্রাতি রাত্রে ঘোবায় ধরে (Night-mare) ।

জ্বর । শরীরের স্বাভাবিক সন্তাপের হ্রাস বা বিনাশ (সাইলিদি, সিপিয়া) ; সার্বজনিক শীতবোধ ; মধ্যাহ্নে আহারের পর মুখমণ্ডল, নাক এবং হাতে ঠাণ্ডাবোধ ; কপালে কোঁটায় কোঁটায় ঘর্ষ জমিয়া থাকা ।

ব্যবহার । মদোন্মত্ততা (Delirium Tremens) ; উন্মত্ততা ; নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং হৃৎপিণ্ডের কার্য ব্যত্যস্ত স্পন্দরহিত হইয়া অচেতনতা (Catalepsy) ; নারসূল ; মূত্রকোষের ব্রাইটস্ ডিজিজ্ (Bright's Disease) ; শিরঃশীড়া ইত্যাদি অস্থখে ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । দিনের বেলা শয়ন করিয়া থাকার অত্যন্ত ইচ্ছা ; সামান্য পথ চলিয়া বেড়াইলেই একবারে নিস্তেজ হইয়া পড়া ; অত্যন্ত হ্রস্বলতা, বাহ্যিক দরুণ কথা বলিতেও ইচ্ছা যায় না (টোনাম্) এবং ভদ্ররূপে অতি শীঘ্রই ঘুনাইয়া পড়িতে হয় ; প্রাতঃকালে, স্নাত্তিতে, কাফি খাইলে, খাওয়ার সময়, মদ্যপান বা তামাকু খাইলে অস্থখের বৃদ্ধি এবং বিশুদ্ধ বায়ু, ঠাণ্ডা জল এবং বিশ্রামে অস্থখের উপশম ইত্যাদি ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রকৃতি এই যে, ইহা সেবনে যখন যে বিষয়ে মন চলে, তখনই উহার চরম সীমার যায় । যথা অস্থখের ভাবের উদয় হইলে মনে অস্থখের আর সীমা পরিসীমা থাকে না । আবার হৃৎপিণ্ডের বিষয় যখন মনে হয়, তখন হৃৎপিণ্ডের আর সীমা পরিসীমা থাকে না । স্নায়বিক, রক্তাধিক্য এবং কখন কখন পিত্তাধিক্য দ্বারা বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । মস্তিষ্কের উপর ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকার

কার্য আগারিকান্, বেলাডোনা, কান্ফার, ক্রোকান্, হায়োসসারেনাস্, ওপিয়াম্ এবং ট্র্যান্সনিয়ামের জ্ঞার। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে ডিজিটালিস্, ক্যানাবিস্ স্যাটাইবা, ক্যাথারিস্, নাক্স-বমিকার কার্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটি পাণ্ডলের চিকিৎসায় এই ঔষধের মূল আরোক, ৫ কোঁটা মাত্রার, ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ ৬ষ্ঠ ক্রম ১ সপ্তাহ কাল এবং উহা দ্বারা কোনও ফল না পাওয়াতে উহার পরের ১ সপ্তাহ কাল ৩য় ক্রম, এবং উহাতেও কোন ফল না পাওয়াতে ১ম ক্রম, ১ সপ্তাহ কাল ব্যবহৃত করা গেল। ইহাতেও কোন বিশেষ উপকার না হওয়াতে মূল আরোক, প্রতি মাত্রার ৫ কোঁটা করিয়া, ব্যবহার করিলে, ২ সপ্তাহের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল।

ক্যানাবিস্ স্যাটাইবা, -(সিন্ধি, -ভাঙ্গ), -ক্যান্-স্যাট্

(CANNABIS SATIVA, -HEMP, -CANN.-SAT.)

এই গাছ ভারতবর্ষ এবং পারস্যদেশে জন্মিয়া থাকে। রুসিয়া, ফ্রান্স্ এবং ইটালী দেশেও ইহার চাষ হইয়া থাকে। এই গাছের ফুল এবং ফুলের নিকটবর্তী কোমল পাতা বথানিয়মে প্রক্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মূত্রনাশীর শৈল্পিকবিল্লী এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের আবরক চর্খের (Prepuce) উপরই ইহার কার্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, বাহার দক্ষণ উক অংশ উত্তেজিত হইয়া প্রদাহযুক্ত হয় এবং উহা হইতে প্রমেহ রোগের জ্ঞার পুঁষাদি নির্গত হয়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। বিষম্ভাব (ইগ্‌নেস্, নেটাম্-মিউর, পাল্‌স্, রাসটম্); মনের অত্যন্ত উত্তেজ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থনীতে কষ্টাভূতব, ঘাস কষ্ট ও হৃৎস্পন্দন।

মস্তক । দাঁড়াইলে মাথাধোরা এবং মাথা কিম্ব কিম্ব করা ; চলিবার সময় দুই পার্শ্বে চলিয়া পড়ার উপক্রম হওয়া ; কপালে (চক্ষুর কোটির প্রান্ত হইতে কপালের পার্শ্ব পর্য্যন্ত) চাপিয়া ধরার জ্বাৰ অম্লভূত হয়, সমুখ পানে বাঁকিয়া পড়িলেও বাহ্যিক উপশম হয় না ; কপালের দুই পার্শ্বে উচ্চ স্থানের নিম্ন দেশে চাপ পড়ার জ্বাৰ বেদনা, বাহ্যিক মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া যেন মাথার পশ্চাৎভাগে বিস্তৃত হয় ; মনে হয় যেন মাথার কোঁটার কোঁটার ঠাণ্ডা জল পড়িতেছে ।

চক্ষু । চক্ষুর পশ্চাৎদেশ হইতে সমুখ পানে চাপ পড়ার জ্বাৰ অম্লভূত হয় ; চক্ষে আকস্মিকরূপে কসিয়া ধরার জ্বাৰ অম্লভূত হয় ।

নাসিকা । নাসিকার শুকাইয়া উঠে ।

পাকস্থলী । পাকস্থলীতে, ঠিক পাঁজরের নীচে, ক্রমাগত স্থী বিধানের জ্বাৰ ঘূর্ণ ঘূর্ণ বেদনা ; উদ্গাবে দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; উদ্গারে তিক্ত বা উগ্র স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠা ; নিশ্বাস প্রাশ্বাসের সময় এবং নিশ্বাস প্রাশ্বাস ব্যতীতও পাকস্থলীর বাম পার্শ্বে পাঁজরের হাড়ের ঠিক নীচে স্থী বিধানের জ্বাৰ ঘূর্ণ ঘূর্ণ বেদনা ।

শুষ্ক, শুষ্কদ্বার । বসিয়া থাকিলে শুষ্ক এবং শুষ্ক দ্বারের ঠিক উপবিভাগে চাপাবোধ, বাহ্যিক দক্ষণ মনে হয় যেন অস্ত্র নিম্নদিকে শুষ্কদ্বার দিয়া চেলিয়া বাহির হইবে ; শুষ্কদ্বারের সঙ্কোচন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে যেন দুই উরুদেশ একত্রে লাগিয়া আসিতেছে ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রকোষ প্রদেশ হইতে কুঁচকি প্রদেশ পর্য্যন্ত কসিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা বমী বমী করা ; পুরুষদের অগ্রভাগ হইতে উহার গোড়া পর্য্যন্ত মূত্রনালীতে জ্বাৰ এবং তিক্তিকমার ; মূত্র ত্যাগের সময় মূত্রনালীর পশ্চাৎভাগে স্থীবিধানের জ্বাৰ অম্লভূত হয় ; মূত্রনালী যেন আগাগোড়া ক্ষীণ এবং প্রবাহশূন্য হইয়াছে এরূপ অম্লভূত হয় (অজেক্ট-নাইট্রাস) ; পুরুষের খাড়া হইলে উহাতে কসিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা ; প্রাশ্বাস করার সময় এবং উহার ক্রিয়াকাল মূত্রনালীতে জ্বালাবোধ (আকুই বা, কাছ) ; মূত্রত্যাগের অবস্তু এবং মূত্রত্যাগ শেষ হওয়ার সময় মূত্রনালীতে জ্বালাহতব ; মূত্রত্যাগের আভ্যন্তরিক কালেও মূত্রনালীর সমুখ ভাগে জ্বালা-

যুক্ত বেদনা, যাহার দরুণ রোগী অনবরত মূত্রত্যাগ করিতে বাধ্য হয় ; মূত্র ত্যাগের সময় ঘেরুপ হয়, মূত্র ত্যাগের আভ্যন্তরিক কালেও মূত্রনালীর সম্মুখ ভাগে সেরুপ চাপাবোধ ; মূত্র ত্যাগের আভ্যন্তরিক কালে মূত্রনালীতে স্থলীবিধানের জ্বায় অম্লভূত হইয়া গা শিহরিয়া উঠা ; মূত্রনালী সোজা না হইয়া একা বাঁকা হইলে ঘেরুপ হয়, মূত্রত্যাগ করার সময় মূত্রনালীতে সেরুপ অম্লভূত হয় ; মূত্র সন্ধাৰে পড়ে এবং মূত্র পড়িতে পড়িতে মূত্র নিঃসরণ বন্ধ হইয়া যায় (ক্যান্) ।

* জননেন্দ্রিয় । পুরুষাঙ্গ ক্ষতি, কিন্তু উহা বিশেষ খাড়া হয় না ; পুরুষাঙ্গ বারম্বার খাড়া হইয়া তৎপর মূত্র নালীতে স্থলী বিধানের জ্বায় অম্লভূত হয় ; ক্ষত হইলে বা পুড়িয়া গেলে ঘেরুপ হয়, চলিবার সময় পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ এবং উহার আনরক চর্ম কাল্পে লালবর্ণ হয় ; দাঁড়াইয়া থাকিলে অণ্ডকোষে কসিমা বা চাপিয়া ধরাব জ্বায় বেদনা (বার্কেরিম্) ।

খাসযন্ত্র । প্রাতঃকালে বায়ুনেত্র নিম্নভাগে কঠিন স্লেষ্মার সঞ্চায় যাহা গলায় থেকুর দিয়া বা কাশিলে নির্গত হয় এবং কাশি ও গলায় থেকুর দেওয়ার দরুণ বায়ুনল অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায় এবং অবশেষে স্লেষ্মা তরল হয় ও রোগী বারম্বার কাশিবা বা গলায় থেকুর দিয়া স্লেষ্মা বাহির করিতে বাধ্য হয় ; গলায় মধ্যের গভীরতম অংশ হইতে যেন কাশির উদ্বেক হয় এবং কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া লোন্‌তাষাদ বিশিষ্ট এক প্রকারের তরল পদার্থ নির্গত হয় ; বক্ষাহির মধ্যদেশে কসিমা বা চাপিয়া ধরার জ্বায় বেদনার দরুণ খাসকষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ ; বুকের মধ্যে কষ্টানুভব ; গলায় মধ্যে আঁটাবোধ, যাহার দরুণ রোগী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় ; বক্ষাহির উপবিভাগের নীচে খনন করার জ্বায় বেদনা, কিন্তু উহার দরুণ খাসকষ্ট হয় না ।

হৃৎপিণ্ড । নড়িলে বা ঘাড় হেট করিয়া উপড় হইলে ভয়ানক আকারের হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপ্রদেশ উন্মাদভব ।

নিদ্রা । ঘুমবেঘোরে ভয়ানক অসহ্য জনক স্বপ্ন দেখা এবং তদ্রূপ মনের উদ্বেগ এবং হতাশ ; ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙিয়া যায় এবং সে কোথায় রহিয়াছে রোগী তাহা বুঝিতে পাবে না ।

ব্যবহার । তরুণ প্রমেহ রোগে যখন একোনাইট ব্যবহার করিয়া প্রবল লক্ষণাদির অনেক হ্রাস হইয়া কেবল পূর্বাদি নির্গত হয় ; মূত্রাধারের প্রদাহ ; মূত্রকোষ প্রদাহ ; মূত্র ক্রচ্ছ বা মূত্রাবরোধ এবং অন্তান্ত প্রকারের মূত্র বস্ত্রের রোগ ; ফুফুস প্রদাহ ; শ্বাসকষ্টে সম্বলিত রোগ ; হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ ; চক্ষুর কর্ণিরার অসচ্ছতা (Opacity of the Cornea) ; চক্ষে ছানিপড়া (Cataract) ইত্যাদি অস্থি ক্যানাবিস্ ত্রাটাইবা ব্যবহার্য্য । এই ঔষধ দ্বারা ডাক্তার কুইন্ (Dr. Quin) একটী আধকণাণীয়া মাথা বাধা (Hemicrania) আক্রান্ত রোগীকে আরাম করিরাছেন এরূপ ব্রিটিশ জার্নেল অব হোমিওপ্যাথী (British Journal of Homœopathy) নামক চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্রিকায় পাঠ করা গিয়াছে ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । যেন ফোঁটার ফোঁটার ঠাণ্ডা জল পড়িতেছে মাথার এরূপ অহুত হয় ; গুহদ্বার দিয়া বা হৃৎপিণ্ড হইতে যেন ফোঁটার ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পড়িতেছে এরূপ অহুত হয় ইত্যাদি ক্যানাবিস্ ত্রাটাইবার বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । মূত্রবস্ত্রের উপর ক্যানাবিস্ ত্রাটাইবার কার্য্য অনেকটা এপিস্, ক্যাস্টারিস্, কোপেইবা এবং টিরিবিম্বিনার ত্রায় । চক্ষের উপর ইহার কার্য্য ইউক্লেদিয়ার ত্রায় । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আণিকা এবং নাক্স-বমিকার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাম্ফার । অধিক মাত্রায় দিচ্চি খাইয়া বিবাক্ত হইলে লেনুর রস, তেঁতুলগোলা, দধি ইত্যাদি টক দ্রব্য ব্যবহৃত্য ।

ডাইলুশন বিচার । প্রমেহ রোগে ক্যানাবিস্ ত্রাটাইবার মূল আরোকে ১ ফোঁটা হইতে ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার ইল্‌ডাম্ (Dr. Yeldham) বলেন যে, প্রমেহ রোগে অধিক মাত্রায় মূল আরোক ব্যবহার না করিয়া মিশ্র আরোক দ্বারা প্রমেহ রোগের চিকিৎসা করা এক প্রকার সময় নষ্ট বলিলেও অতুক্তি হয় না । এতদ্ব্যতীত ১৫-দশমিক ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই প্রমেহ রোগের চিকিৎসায় আশ্রয় যথোচিত ফল পাইয়া থাকি । আবার ডাক্তার হেল্মথ্ (Dr. Helmutb) বলেন তিনি অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিরাছেন যে প্রমেহ রোগে ১২ ক্রম ব্যবহারে

বিশেষ কল পাওয়া যায়। চক্ষে ছানি পড়া (Cataract), কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea), ফুফুস প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ, আধ-কপালিয়া মাথাব্যথা ইত্যাদি সমুদ্রে ১২, ১৮ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য। চক্ষে ছানি পড়ার প্রথমাবস্থায় ২০০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া একটী রোগীর চিকিৎসায় লেখক বিশেষ উপকার পাইয়াছেন।

ক্যাপ্সিকাম্ আনুয়াম্, -(লাল মরিচ),- ক্যাপ্স্

(CAPSICUM ANNUUM,-CAPS.)

বড় বড় লাল মরিচের খোসা (চোকুন) এবং বিচি যথানিয়মে রেক্ট-ফাইড্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । স্নায়িককিল্লী, প্রধানতঃ আহার বহা নালী (Alimentary Canal) এবং মূত্রনালীর স্নায়িককিল্লীর উপরই ইহার কার্য্য অতি প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুন উক্ত বস্তুাদি উত্তেজিত হইয়া প্রবাহযুক্ত হওয়ার উপক্রম হইয়া থাকে। আবার স্বাস্থ্যের স্নায়িক কিল্লীর উপরও ইহা উক্ত প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে। লাল মরিচ বাটিয়া গায় মাথাইরা দিলে ঘেরূপ হয়, আক্রান্ত বস্তুাদিতে সেরূপ জ্বালা উৎপাদন করা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । চূপ মারিয়া থাকা, চিড়্ চিড়্ করা, একগোঁয়েমী, সহজেই বিরক্ত হওয়া (নাক্স-এম্); সর্ব্বদা নাড়াতে বা আপন দেশে থাকিবার ইচ্ছা (হেলিবোরান্, ফস্-আন্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গাল লালবর্ণ এবং টল্-টলে, নিদ্রাশূন্যতা, মুখগহ্বরের পশ্চাত্ভাগে উষ্ণাভব; শিশুগণের সর্ব্বল-বিত্তী মরলার থাকার ইচ্ছা।

মস্তক । সবিরাম বা পালাক্সের নীতলাবস্থায় মাথাব্যথা; শিরঃ-পীড়া, যাহার দরুন মর্মে হয় যেন মাথার ছাড় কাটিয়া যাইবে (ব্রাই, চায়না, নেট্রাম্-মিউর, মার্ক্, পাল্); কাশিলে, মাথা নাড়িলে অথবা

চলিয়া বেড়াইলে মাথা ধরা (ব্রাই) ; কপালে চাপিয়া ধরার জ্বর বেদনা বাহা ডাইন পার্শ্বেই অধিক অনুভূত হয় ; কপালে দশ্দপিয়া বেদনা ; কপালের হাড়ে, প্রধানতঃ ডাইন পার্শ্বের হাড়ে, কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা ; কর্ণের পশ্চাৎভাগে চাপিয়া ধরার জ্বর বেদনা ; মাথার বাম পার্শ্বে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা ।

চক্ষু । কাকর বা বালির কণাদি প্রবিষ্ট হইলে যেরূপ হয়, চক্ষের মধ্যে সেক্রণ চাপিয়া ধরার জ্বর বেদনা ; চক্ষু যেন লালচে, বড় এবং বহির্দিকে আকৃষ্ট বলিয়া অনুভূত হয় ।

নাসিকা । সর্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হাঁচি এবং নাক দিয়া তরল স্লেষ্মা নির্গমন ও কখন কখন নাকের মধ্যে জ্বালা, স্ফুটন এবং ধস্ধসেবোধ ; সর্দি শুকাইয়া বা বসিয়া যাইয়া নাকের মধ্যে স্ফুটন এবং কুটকুটানি ; নাক দিয়া রক্ত পড়া ।

কর্ণ । কর্ণের পশ্চাৎভাগের ক্ষীতি এবং তদ্রূপ অত্যন্ত বেদনা ; কর্ণের নিকটবর্তী যে অংশ, মাড়ির হাড়ের সে অংশের হাড়ে পোকায় ধরা (Caries) (অরাম) ; বাম কানের পশ্চাৎভাগে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, কাশিলেই যাহা অধিক অনুভূত হয় ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলে হাডের মধ্যে বেদনার ন্যায় বেদনা, চাপিলে বা স্পর্শ করিলে যাহার উদ্বেক হয় ; গাল লালবর্ণ, কিন্তু উষ্ণ নহে, যাহা কখন কখন সাদা বা ফিকা হয় ; ওষ্ঠ ফাট, ফাটায়ুক্ত এবং উহাতে উদ্ভুতানি বা চিড়িকমারা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে । মুখে জ্বগন্ধ (আর্গিকা, টিনিলাম্-আস্, হিপ্পো-সাল্, ফ্রিয়াস্, মার্ক্, নাটটিক্-আস্) ; মুখে কঠিন স্লেষ্মার জ্বর পদার্থের সঞ্চার ; মুখে জলের জ্বর স্বাদ বা কোন স্বাদই থাকে না এবং তৎপর বুক জ্বালা । গলার মধ্যে জ্বালা (একন্, আস্, ক্যান্স্, মার্ক্-কর) এবং বেদনা, গিলিবার আভ্যন্তরিক কালে বাহার বৃদ্ধি হয় ; বেদনামুক্ত ক্ষীতি বা ঘা থাকিলে যেরূপ হয়, কাশিবার সময় গলার মধ্যে সেক্রণ বেদনা ; গলার মধ্যের আক্কেপিক সঙ্কোচন (বেগ্, কার্ভো-বেজ্, হায়োস্, ট্রায়ন্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । পাকস্থলীতে জ্বালামুতব (আস্,

ক্যাম্ফার, ক্যাহ্), আহারের পর বাহ্যে অধিক অম্লভূত হয় ; বৃকে জালা ; মুখ দিয়া জল উঠা ; বমন ও বমনোদ্বিগ্ন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা ; স্নায়বিক, আক্ষেপিক বমন ; শীতের সঙ্গে সঙ্গে তরল শ্লেষ্মার তায় পদার্থ বমন ; সাংখ্যাতিক আকারের জ্বরের সঙ্গে বমন ; পাকস্থলী বরফের তায় ঠাণ্ডা এবং তৎপর পাকস্থলীর কাঁপনি ও উহাতে জালাহুতব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সময়ে সময়ে জ্বাল উদ্‌গার উঠা। পেট কাঁপিলে ঘেরূপ হয়, উদর হইতে বৃক পর্যন্ত কসিয়া ধরার তায় সেরূপ কষ্টানুভব ; উদরে দূষিত বায়ুর (Flatulence) সঞ্চার হেতু শূল বেদনা (কলোস্, লাইকোপ্), বা পেটে কসিয়া বা মোচড়াইয়া ধরার তায় বেদনা ; উদর ক্ষীণ এবং বিস্তৃত, বাহ্যের দরুণ বেন স্বাস্রোধ হওয়ার উপক্রম হয়।

মল এবং মলদ্বার। বারম্বার কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া এবং পেট-কামড়ানী (মার্ক্) ; শুষ্কবারে জালাহুতব (মাস্, ক্যাহ্) ; অর্শরোগ, বাহার দরুণ শুষ্কবার জালা করে এবং চুলকায় (মালিক্) ; শ্লেষ্মাভেদ ; বারম্বার রক্ত মিশ্রিত বা রক্তের ছিটযুক্ত শ্লেষ্মা ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বার-বার কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া এবং পেট কামড়ানী (মার্ক্-কর) ; জলাদি পানের পর উক্ত প্রকারের দাস্ত হওয়া ; প্রত্যেকবার দাস্তের পর পিপাসা এবং প্রত্যেকবার জলাদি পানের পর শীত কম্প।

মূত্রযন্ত্র। প্রস্রাব করার পব মূহনালীতে জালা এবং চিড়িক মারা (কাহ্, ক্যানাবিস্-স্তাট্) ; মূত্রত্যাগের সময় এবং উহার পূর্বে ও পর মূহনালীর মুখে জালাহুতব (কাহ্, ক্যানাবিস্-স্তাট্) ; মূত্রত্যাগের আভাস্তবিক কালে মূত্র নালীর সম্মুখভাগে ও উহার মুখে স্থলীবিধানের তায় অম্লভূত হওয়া (ক্যানাবিস্-স্তাট্) ; মূত্রকৃচ্ছ এবং মূত্রত্যাগের সময় কোঁথ পাড়া (কাহ্, মার্ক্-কর) ; জালা উৎপাদক মূত্রত্যাগ।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের ধ্বজভঙ্গ ; অণ্ডকোষাধার ঠাণ্ডা (বার্কেরিস্) ; মূহনালীদিয়া হৃদয়ের লনির তায় পুঁথ নিঃসরণ ; অণ্ডকোষ ছোট হইয়া যাওয়া।

স্বাসযন্ত্র। বায়ুনল এবং কণ্ঠনালীতে হান্না দেওয়ার তায় হৃৎ হৃদী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুরু শ্বশ্বশে কাশি ; প্রথম রাত্রে শয়নের পর উক্ত প্রকারের কাশি (হার্যোস্) ; কাশিবার সময় বেন কুফ্ল হইতে এক

প্রকারের দুর্গন্ধ বাহির হয় (ক্রোকাশ্, সাক্সুনেরিয়া) ; শ্বাসকষ্ট এবং বৃক্কে বেদনা ; বৃক্কে অত্যন্ত পূর্ণবোধ ; বৃক্কে অত্যন্ত অঁচীবাধ ; বৃক্কে দপ্পদপিয়া বেদনা ; শ্বাসকষ্ট বাহা উদরের অস্থির দক্ষণ বলিয়া অনুভূত হয় ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবার ডাইন পার্শ্বের গ্রহিতে চিড়িক যারা এবং ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা ; মেরুদেশে এবং উহার নিকটবর্তী স্থানে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা ।

নিম্নাঙ্গ । উরুর সন্ধি হইতে হাঁটু এবং পায়ের পাতার সন্ধি পর্য্যন্ত বোঁচা বিদা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা, কাশিনেই বাহা অধিক অনুভূত হয় ; উরুর সন্ধিতে কসিয়া ধরার জ্বর বেদনা, স্পর্শনে এবং শরীর পশ্চাৎদিকে বাকিয়া পড়িলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; হাঁটুর সন্ধিতে বাটিয়া বা কসিয়া ধরার জ্বর বেদনা ।

নিদ্রা । হাঁইতোলা ; অস্থির নিদ্রা ; ঘুমেরষোবে স্বপ্ন দেখা ।

জ্বর । পৃষ্ঠদেশ হইতে শীত আরম্ভ হয় (ইউপেট্-পাপূর, লাক্) এবং শীতের সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা ; জলাদি পানের পর শীতের বৃদ্ধি হয় ; প্রত্যেকবার জলাদি পানের পর শীত কম্প (টারেক্স) ; শীতের পর ঘর্ম বা উষ্ণাবস্থা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম এবং পিপাসা ; শরীর অত্যন্ত উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গার অত্যন্ত জ্বালা (একন্, আন্) । বাথরগঙ্গজ, চট্টগ্রাম, নোরাখালি ইত্যাদি লোণা জল বিশিষ্ট স্থানের জ্বরে ক্যাপ্সিকাম্ বিশেষ উপকারী লেখক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ।

ব্যবহার । কাকিপানের অপব্যবহার জনিত অস্থ ; কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত বা কোইনাইনের আট্‌কান জ্বর ; সর্দি ; তালু-কার পার্শ্বস্থিত গ্রহি বা টন্সিল প্রদাহ (Tonsillitis) ; ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) ; আরক্ত-জ্বর ; অজীর্ণ রোগ ; উদরাময় ; আমাশয় ; মূষদিয়া জল উঠা ; হিকা ; অর্শ্বরোগ ; মূত্রাধার প্রদাহ ; মূত্রাধারের মৈথ্রিক রোগ ; তক্ষণ এবং পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ ; সবিরাম বা গালাজীর, বিশেষতঃ লোণা স্থানের ; কান নিরা পূঁবাণি পড়া ; কর্ণ প্রবাহ ; বৃক্ জ্বালা বা পেটে জ্বালা সম্বন্ধিত শূল বেদনা ইত্যাদি অস্থখে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । আক্রান্ত স্থানের নানা অংশে জ্বালা ।

এবং চিড়িকষায়া ; নড়াচড়াতে অনিচ্ছা ; আক্রান্ত স্থানে অসাড়বোধ ; ইন্ড্রিয়াদির অতিরিক্ত চেতনা ; শীতলাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং উষ্ণাবস্থার ঘৰ্শ ; কাশি রোগে প্রত্যেকবার কাশিকার সময় কানে বেদনা ; মাতাল-দিগের অজীর্ণরোগ ; কাশিবার সময় ফুফুস হইতে পচা দুর্গন্ধ বাহির হওয়া ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিলে, সন্ধ্যার সময় আহারের পর, জলাদি পানের পর, ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা অঙ্গ চালনা করার প্রারম্ভে অস্থিরতা বৃদ্ধি এবং উত্তাপে ও ক্রমাগত নড়াচড়াতে অস্থিরতা উপশম ইত্যাদি ক্যাপ্সিকামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । যাহারা মোটা, অলস, অপরিষ্কার, চিড়্ চিড়ে এবং সামান্ত কারণেই বিরক্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ক্যাপ্সিকামের কার্যের সঙ্গে আর্জেন্টাম্ নাইট্রিকাম্, আর্সিনিকাম্, ক্যালেলিডিয়াম্, ক্যাছারিস্, চায়না, ক্রোটন, ইগনেসিয়া, লাইকোপডিয়াম্, নাক্স-বরিকা, পালসেটিলা, ইউফর্সিয়াম্ এবং বিরেট্রাম্ আল্‌বামের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যালেলিডিয়াম্, ক্যাস্কার, সিনা, চায়না, লাল্‌ফার ।

ডাইলুশন বিচার । হানিমানের মতে ৯ম ডাইলুশন ব্যবহার্য । অল্প রোগে ৬ এবং ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় । কোন কোন চিকিৎসক ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন । অজীর্ণ এবং আমাশয় রোগে ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশন উপকারী । প্রমেহ রোগ, বৃক জ্বালা ইত্যাদিতে ১ম দশমিক ক্রমের আরো ক ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায় । সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ১ হইতে ১২ ডাইলুশনের মধ্যে সকল ডাইলুশনই ব্যবহার্য । বৃক বা পেটে জ্বালা সম্বলিত শূল বেদনার মূল আরোক ২।১ ফোঁটা মাত্রায় বিশেষ উপকারী । এমন কি, ২।১ মাত্রা সেবনেই শূল বেদনা সারিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে ।

কলোফিলাম্ থ্যালিকট্রয়েড্‌স্‌,-কলোফ্‌ (CAULOPHYLLUM THALICTROIDES,-CAULOPH.)

উত্তর আমেরিকার এই গাছ জন্মে। ইহার শিকড় বণা নিয়মে প্রফ্-স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার শুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে। শুঁড়াকে কলোফিলিন্ বলে।

সাধারণ ক্রিয়া। জীজনেনেদ্রিয়ের পৈশিক অংশ, জরায়ুর গতি উৎপাদক স্নায়ু এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী ও সন্ধির উপর টহার কার্য্য অতি প্রবল।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। বাত স্নানিত বা স্নায়ুশূল লনিত মাথা ধরা, জীলোককেই বাহা অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে (নিবিসিক্‌); জরায়ুর অস্থূল লনিত মাথাধরা।

চক্ষু। চক্ষুর পশ্চাৎভাগে চাপাবোধ; চক্ষু দিরা প্রচুর পরিমাণে জল পড়া।

মুখমণ্ডল। ফণালে (জীলোকের) একপ্রকার কীটজ (Parasitic) ছুসুড়ী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে খেতপ্রদর।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। দাঁতে টাটানি এবং উহা যেন লম্বা হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত; মুখগহ্বরে শুষ্ক এবং উষ্ণাভাব। মুখগহ্বরের ঠিক পশ্চাৎদেশে অত্যন্ত কষ্টাভূতব, বাহার লক্ষণ বারম্বার ঢোক গিলিবার ইচ্ছা বায়।

পাকস্থলী এবং উদর। কাঠ উদগাব উঠা; বারম্বার গলাদিয়া তিক্ত বা টকস্বাদ বিশিষ্ট জল উঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা; জরায়ুর উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপিক বমন, পাকস্থলীতে বেদনা, অত্যন্ত বমনোদ্বেগ; অজীর্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপিক লক্ষণ; জরায়ুর উত্তেজনার দরুন অজীর্ণ। গতিউৎপাদক স্নায়ুর উত্তেজনা এবং বাতের দরুন তন্ত্রের পৈশিক অংশের আক্ষেপিক ক্রিয়া।

জী-জনেনেদ্রিয়। মনে হয় যেন জরায়ুতে রক্তাবরোধ হইয়াছে

এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তলপেটে পূর্ণ এবং আঁটাবোধ (আলোজ্, বেল্, সিমিসিফ্, পাল্‌স্) ; জরায়ু এবং তলপেটের নানা স্থানে আক্ষেপিক বেদনা ; রক্তস্রাব এবং উহার দরুণ পেটে বেদনা ; জরায়ুর মুখ ও গ্রীবা মোচড়াইয়া পড়া ; রক্তরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর আক্ষেপ বা উহার জড়তা (সিমিসিফ্) ; আক্ষেপিক আকাবের কষ্টকর রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনা ; গর্ভস্রাব এবং সে সময়ে তলপেটে বেদনা অত্যন্ত মূহ, অনিয়মিত এবং আক্ষেপিক আকারের হয় ; মূহ বা অপ্রচুর আক্ষেপিক প্রসব বেদনা (জেল্‌স্) ; জরায়ুর মুখের আক্ষেপিক কঠিনতাব দরুণ মূহ বা অপ্রচুর প্রসব বেদনা (বেল্, সিমিসিফ্, জেল্‌স্) ; গর্ভস্রাব বা সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব (চার্না) ; সন্তান প্রসবের পর জরায়ুর জড়তার দরুণ অনেকদিন ধরিয়া ক্লেশ বা লোকিয়া নিঃসরণ ; জরায়ু স্ফিরাম সঙ্কোচন (সিকেল্, কর্ণুটাম্) ; অনেক কষ্টে সন্তান প্রসবের পর পেটে বেদনা ।

ঋগি যন্ত্র । বৃক এবং কঠিনাঙ্গীর আক্ষেপিক অস্থখ ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । ক্ষুদ্র সন্ধিবাতে (আক্টিয়া স্পাইক্, লেডাম্) বাহ এবং পায়ের স্থানে স্থানে বেদনা যাহা এক স্থানে অনেকক্ষণ থাকে না ; বাহ, পা, হাত এবং পায়ের পাতার সন্ধিতে কসিয়া ধরার ভায় বেদনা । মণিবন্ধ এবং হাতের আঙ্গুলের সন্ধিতে অত্যন্ত প্রবল বেদনা ; হাতের আঙ্গুল অত্যন্ত শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ; মুট করার সময় হাতের আঙ্গুলের সন্ধিতে কঠিনবৎ প্রবল বেদনা ।

ব্যবহার । অস্বাভাবিক প্রসববেদনা ; সন্তান প্রসবের পর পেটে বেদনা, ক্লেশ (Lochia) নিঃসরণ ; গর্ভস্রাব ; কষ্টকর রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful menstruation) ; রক্তরোধ ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia) ; জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হওয়া (Prolapsus uteri) ; নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত ও উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর গ্রীবা এবং মুখ মোচড়াইয়া পড়া এবং জরায়ুত রক্তাধিক্য বা রক্তারোধ ; জ্বীলোকের ঘোবন কালে হিষ্টিরিয়া, কমেসক্কার উত্তেজনা এবং কোরিয়া (Chorea) ; জ্বীলোকের ঘোবনাবস্থা, হিষ্টিরিয়া বা মূগী রোগের আক্রমণ বা আক্ষেপ ; ক্ষুদ্র সন্ধি (লেডাম্), বিশেষতঃ মণিবন্ধ এবং আঙ্গুলের ক্ষুদ্র সন্ধিবাতে ; মূহ

এসব বেদনা যাহা আর্গট্, দিয়াও প্রবল হয় না ; কৃত্রিম এসব বেদনা ইত্যাদিতে কলোফিলাম ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । জীলোকের অন্তর্থেই কলোফিলাম বিশেষ উপকারী ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । কলোফিলামের কার্যের সঙ্গে সিমিকি-উগা, পাল্‌সেটীলা এবং সাবাইনার কার্যের বিশেষ আদৃষ্ট আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে সিকেল্‌-কর্নুটাম্‌ এবং সাব-ডিলার কার্যেরও সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । কলোফিলামেব মূল আরোক বা ১ম দশমিক ক্রমের আরোক এবং কলোফিলিনের ১ম হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের ওঁড়াই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

সিড্রন,-সিড্রন

(CEDRON,-CEDRON)

নিউগ্রানেনডা এবং মধ্য আমেরিকায় এই গাছ জন্মে । ফলের বিচি যথা নিম্নমে রেক্‌টিকাইড্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণক্রিয়া । মস্তিষ্ক, কসেরুকা মর্জ্জা এবং সিম্প্যাথেটিক্‌ স্নায়ু সঙ্কলের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুনু মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয় এবং তৎপর ভিজা শেত্‌শেতিয়া, উষ্ণ, নিম্ন জলাভূমিতে বেরূপ হয়, সেরূপ সবিরাম-অব উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রতি দিন ঠিক এক সময়ে রোগের আক্রমণ এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ ।

ব্যবহার । যে প্রকার সবিরাম বা পালাজর কোন মতেই সারে না এবং যাহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের উত্তেজনা বর্তমান থাকে ও যাহা কোন চিকিৎসায়ই না থামিয়া রোগীকে ব্যর্থব্যর্থ আক্রমণ করে এবং যাহা ভিজা শেত্‌শেতিয়া, গ্রীষ্ম ঋতান, জলাশয় বিশিষ্ট স্থানে বাসের দরুনু উৎপন্ন হয়, সে

প্রকার সবিরাম বা পাল্লা অরেই সিড্রুন্ বিশেষ উপকারী। ডাক্তার কাসানোবা (Dr. Casanova) বলেন যে, যে সকল রোগী গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাস করে, তাহাদিগের অস্থ্যেই এই ঔষধ অধিক উপকারী। তিনি আরো বলেন যে, কোইনান্ এবং আর্সিনিকের ছায় ইহা আন্টিপিরিয়োডিক্ (Anti-periodic) ঔষধের ছায় কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব স্নায়ুশূল, সবিরাম অর ইত্যাদি যাহা কোন নির্দিষ্ট সময়ে রোগীকে আক্রমণ করিয়া থাকে, সে সকল রোগেই তিনি সিড্রুন্ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। তিনি আরো বলেন যে, যেসকল গ্রীলোকের প্রত্যেকবারই ঠিক এক নির্দিষ্ট সময়ে গর্ভশ্রাব হয় তাহাদিগের গর্ভশ্রাব নিবারণের পক্ষে সিড্রুন্ সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। ডাক্তার আলেন্ (Dr.Allen) এবং ডাক্তার নটন্ (Dr. Norton) বলেন যে, চক্ষুর আইরিস প্রদাহ (Iritis), চক্ষুর কোরয়েড্, ক্লরী প্রদাহ (Choroiditis) এবং চক্ষুর অন্ত্রাশ্র গভীরতম অংশের যে প্রকার প্রদাহে চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা থাকে, তাহার চিকিৎসায় এই ঔষধ দ্বারা তাহারা বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। দক্ষিণ আমেরিকাতে সিড্রুন্ বিবাক্ত স্বর্ণের কামড়ের এক অব্যর্থ (Specific) ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক চারনা, জেল্‌সিমিয়াম্ এবং ল্যাকেসিমের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার। অর রোগে ২য় এবং ৩য় ডাইলুশনই আদর্শ সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। টেষ্টির (Taste) মতে ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক্ত অধিক উপকারী। স্নায়ুশূলদি অস্থ্য যাহা নির্দিষ্ট সময়ে রোগীকে আক্রমণ করে, তাহাতে ৬ষ্ঠ ক্রম বিশেষ উৎকারী।

সিকুটা বিরোসা,-সিকুটা

(CICUTA VIROSA,-Cic. V.)

উত্তর এবং মধ্য ইউরোপ, কসিয়াস্থ আদিরা এবং উত্তর আমেরিকার এই গাছের জন্ম। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং আয়ারলণ্ডেও ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার কাঁচা শিকড় যথানিয়মে প্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা মস্তিষ্ক এবং কসেরূপা মজ্জার উত্তেজক স্বরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, যাহার দরুণ ধমুঠেকার, মূগীরোগ এবং মূগীরোগের জ্বর আক্ষেপ, দাঁতলাগা এবং সর্বদেহে স্থানিক এমন আক্ষেপের উদ্বেক হয়, যাহার দরুণ আক্রান্ত অঙ্গাদি পর্য্যায়ক্রমে একবার প্রসারিত এবং একবার সংকুচিত হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যের সঙ্গে নাক্স-বমিকার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে। তবে নাক্স-বমিকাতে রোগীর কতক পরিমাণে চেতনা থাকে, সিকুটাতে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হইয়া চেতনা একবারে থাকে না।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। জন্মন, কৌথানি বা কৌকানি এবং চীৎকার করা (বিরেট্-আল্‌ব্); মনের বিকৃতি, গানকরা, অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া নাচা এবং উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনী বা অস্ত্র কোন প্রকারের শব্দ করা (হায়োস্, ট্রায়ম্); নিস্তব্ধভাবে থাকার স্বভাব, সর্বদা আপন অবস্থার সন্তুষ্ট এবং সুখী থাকা; মনের অত্যন্ত জড়তা এবং তদরূপ কোন প্রকার মানসিক চিন্তার অশক্তি (হায়োস্, ওপিয়াম্); মনের উদ্বেগ এবং কোন প্রকারের দুঃখের কাহিনি শুনিয়া মন অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়া।

মস্তক। মাথাঘোরা; মাথার বাকনি এবং স্পন্দন; মাথার পশ্চাৎভাগে ভরানক কন্কনিয়া বেদনা; মাথার আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের কার্য্যাবরোধের দরুণ আক্ষেপ (কুপ্রায়)।

চক্ষু। কোন বস্তু পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকা; চক্ষুর তারা বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল আলোক জ্ঞানাদি রহিত হওয়া (বেল্, হায়োস্, ওপিয়াম্, ইনাস্); চক্ষুর তারা প্রথমতঃ সংকুচিত এবং তৎপর বিস্তৃত হয়; এক বস্তু দুই চীত্ৰ দ্বারা দেখার (অরাম্, বেল্, ফাটিটোল্, ট্রায়ম্); সম্মুখস্থিত বস্তুগুলি যেন একবার আগে যায় এবং একবার পাছে যায়।

কর্ণ। কানে কম শুনা।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল লালবর্ণ, শিটা, ফিকা বা মলিন, মূতবৎ (আস্, বিরেট্-আল্‌ব্); মুখাকৃতি বিকৃত, -হয় ভয় উৎপাদক, নতুবা স্বাভাৱিক উৎপাদক (কুপ্রায়); মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপ (আগারিকান্, ইগ্‌নেস্, নাক্স-বম্)।

মুখগহ্বর ও গলার মধ্য । দাঁতে দাঁতে আঁটিয়া বাঁজরা বা দাঁত লাগা (আবিসিহ, ইগনেস, দিনা, শডোক); জিহ্বার ধারে সাধা, বেদনামূল, আলাবুক্ত কত; কণা বলিবার সময় দ্বিকা হইলে বেদন হই, মাথায় সেক্রণ হঠাৎ থাকি লাগা; মুখে ফেলা উঠা (ককিউন্, কুপ্রাম, লরোস, নেজা)। গিলিতে অশক্তি; গলার মধ্য যেন জুড়িয়া-যায়; গলার মধ্যে শুকাহুভব।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত পিপাসা (একন্, হাই, ক্যাম); প্রবল দ্বিকা (নাক্স-বন্, হায়োস, ট্রাইমন্, সিকেল, কর্ণটাম); পাকস্থলীতে জালাহুভব (আর্স, ক্যাম্ফার, ক্যাহ); পাকস্থলীর মধ্যে ক্ষীতি এবং দপ্-দপনি; বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ; পাকস্থলীর গভীরভাগ অংশে হঠাৎ ধাক্কা লাগা, যাহার দরুন আক্ষেপ হইয়া শরীর পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া পড়ে। উদরে গড়্-গড়্, কল কল এবং সোঁ-সোঁ শব্দ হওয়া; উদর ক্ষীত, বিস্তৃত এবং বেদনামূলক হয়।

মল । বারম্বার তরল মলত্যাগ।

মূত্রে । অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্রত্যাগ (আর্স, বেল, হায়োস, ওপিয়াম); হয় অতিরিক্ত পরিমাণে মূত্রত্যাগ, নতুবা মূত্র একবারেই নির্গত হয় না।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের অন্তকোষ উপরের দিকে আকৃষ্ট; পুরুষের গোড়ায় স্থচীবিধানের জ্বায় বেদনা এবং স্বাভাবিক যুগ্মেরবোরে অনিচ্ছাপূর্বক ধাতু নিঃসরণ (স্বপ্নদোষ); স্ত্রীলোকের গোণে রজঃস্রাব; রজঃস্রাব রুদ্ধ হইলেই আক্ষেপ বা বৈচলির উদ্ভেদ হয়; রজঃস্রাবের সময় গর্ভ হারের ঠিক উপরিভাগে ছিঁড়িয়া ফেলা বা কসিয়া ধরার জ্বায় বেদনা; সন্তান প্রসবের সময় আক্ষেপ বা বৈচলি।

শ্বাসযন্ত্র । বৃক্ কষ্টহুভব এবং শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হওয়া, যাহা বৃকের পেক্টোরেল (Pectoral) পেশীর আক্ষেপের দরুন ঘটয়া থাকে (কুপ্রাম); বৃক্ আঁটাবোধ, যাহার দরুন নিশ্বাস প্রাণে অত্যন্ত কষ্টহুভব হয়; বৃকের মধ্যে ঠাণ্ডাবোধ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশ ব্যাকিয়া ধনুকের জ্বায় হয় (নাক্স-বন্, ওপিয়াম); শ্বাসহারের ঠিক উপরিভাগে ছিঁড়িয়া ফেলা বা চিড়িক্ মারার জ্বায় বেদনা।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । সমুদয় অঙ্গের কম্পন; বাহু এবং পায়ের হর্ষণতা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্কেপিক বিকৃতি (দিনা); ইচ্ছাৎ থাকি লাগার পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শক্তি একবারেই না থাকে। বাহু এবং হাতের আঙ্গুলের ঝাঁকনি বা স্পন্দন (কুপ্রায়); চলিবার সময় পাের শক্তি না থাকা। অভ্যবরোগী কাঁপিয়া কাঁপিয়া বা হেলিয়া টলিয়া চলে; এক পায়ের কাঁপনি।

নিদ্রা । বারবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং সমুদয় শরীরে ঘর্ষ হয়; রোগী আপনাকে আপনি হুহু বোধ করে; পূর্ন দিনেব ঘটনাগুলি অগ্রে স্পষ্ট দেখা।

চর্ম । মুখমণ্ডল এবং হাতে মটরের দানার জার ফুসুড়ী এবং স্পর্শ করিলে উহাতে আলায়ুক্ত বেদনার উদ্বেক হয় ও যাহা কএক দিন পর বিশিয়া একত্রিত হয় (আণ্টি-টার্চ, ফ্রেটন্); গার আলায়ুক্ত পুঁথু সম্বলিত ফুসুড়ী।

ব্যবহার । সকল প্রকারের আক্কেপ বা কন্বাল্‌সন্স (Convulsions); মৃগীরোগ; কোরিয়া (Chorea); হিষ্টিরিয়া; উন্মত্ততা; অন্ধতা; মস্তিষ্ক ও কলেককা মজ্জার প্রদাহ (Cerebro-spinal Meningitis); মস্তিষ্কে আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের কার্যাবরোধ (Concussion of the brain) হেতু অস্থ; সকল প্রকারের আক্কেপ বা খেঁচনি সম্বলিত রোগ; ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া আপন কার্যাদি করা বা পলারন করা; (Somnambulism); ধমুঠেকার; পুষ্কবের টুটীতে বিকচ বা একজিয়া (Eczema); আক্কেপিক রকনের হিকা এবং উগার উঠা ইত্যাদি অস্থে দিকুটা ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । পেশির সর্বপ্রকারের আক্কেপ (আগারিকান, জিঙ্ক); আক্কেপ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে চেতনা-রহিততা; সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভয়ানক বিকৃতি; আক্কেপ এবং উৎকরণ শরীর পশ্চাৎদিকে ঝিকিয়া পড়া; ডায়েফ্রাম (Diaphragm) নামক পেশীতে প্রবল আক্কেপ হইলে বক্রপ হয়, মৃগীরোগের দেক্রপ আক্রমণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাক-স্থলীর ক্ষতি, হিকা, চীৎকার করা, দাঁত লাগা, অচেতন হওয়া এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতি; সামান্য স্পর্শন, ঘরের দরজা খুলিলে এবং সজোরে কথা বলিলেই আক্কেপের পুনরাক্রমণ; ঘর্ষ, যাহা হাত্তিতেই অধিক হয়; উদরে

বর্ষ ; শীত ; শীতবোধ এবং ভদ্ররূপ উদ্ভাপ প্রয়োগের ইচ্ছা ইত্যাদি সিকুটার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগ্ৰণ বিশিষ্ট ঔষধ । সিকুটার কার্বোর সঙ্গে একোনাইট্, হাইড্রোসালফেটিক অ্যাসিড এবং ষ্ট্রিক্‌নিয়ার কার্বোর বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিবরে ইহার কার্বোব সঙ্গে বেলাডোনা, কোনায়াস্, ল্যাকেসিস্, হায়োসায়েরাস্, পাল্‌সেটেলা, ট্র্যামোনিয়াস্ এবং বিরেট্রাস্ আল্‌বানের কার্বোরও সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আর্বিকা, ওপিয়াম্ । অধিক মাত্রায় সিকুটা খাইয়া বিষাক্ত হইলে তামাকু ব্যবহা ।

ডাইলুশন বিচার । ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ২০০ ক্রমও ব্যবহা করিয়া থাকেন ।

কলিন্সোনিয়া ক্যানেডেন্সিস্,-কলিন্স্

(COLLINSONIA CANADENSIS,-COLLLNS.)

উত্তর আমেরিকার ভিজা জঙ্গলা ভূমিতে এই গাছ জন্মে । ইহার শিকড় যথানিয়মে ফ্রক্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া নুল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । যথানিয়মে লুগার অব্‌ নিকে মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে । গুড়াকে কলিন্সোনিন্ বলে ।

সাধারণ ক্রিয়া । পাকস্থলী এবং অন্ত্রের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বিশেষতঃ গুল্মের উপর । ইহা হৃৎপিণ্ড এবং জননেন্দ্রিয়কে প্রবলরূপে আক্রমণ করিয়া থাকে । অর্শরোগে ইহা বিশেষ উপকারী ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । কপালে ঘৃশ্‌ঘৃশে বেদনা ; অর্শরোগের রক্তস্রাবাদি রক্ত হইয়া মাথা ধরা ।

মুখগহ্বর । দ্বিহ্নাত মধ্য ও পশ্চাৎভাগ হরিজার লেপযুক্ত এবং

উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে তিক্তব্ধাৎ ; বমমোষণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে খিলধরার স্থায় বেদনা ।

উদর । তলপেটে কর্ত্তনবৎ প্রবল বেদনা ।

মল । কোষ্ঠবদ্ধ ; মল ফিকা রজ বিশিষ্ট, মোটা নেড় বাহা বহির্গত হইতে অত্যন্ত কৌথ পাড়িতে হয় এবং মলত্যাগের পর গুহদ্বার এবং তলপেটে ঘৃশ্-ঘৃশ্ বেদনার উল্লেখ হয় ; উদরাময়, মল রক্তমিশ্রিত স্লেমা অথবা তরল হরিদ্রাবর্ণের পদার্থ, বা জলবৎ তরল এবং মলত্যাগের সময় অত্যন্ত কৌথপাড়া ও অঙ্গের মধ্যে ভয়ানক কর্ত্তনবৎ বেদনা (মার্ক) ; রক্তস্রাবক অর্শ (Bleeding Piles) বা অন্ধ অর্শ (Blind Piles) (ইন্ডুগাস) ; গুহদ্বারে ভার বোধ ; গুহদ্বারের চুলকানি বা কুট্-কুটানি, বাহার দরুণ মনে হয় যেন গুহদ্বারে বালি বা কাঁকর ইত্যাদি লাগিয়া রহিয়াছে ।

জ্ঞানেন্দ্রিয় । স্রংপিণ্ডের স্নায়ু উত্তেজনা ; স্রংপিণ্ডের কার্যের অতিরিক্ত চাক্ষুশ ; স্রংপিণ্ডের কার্য সঙ্কীর্ণ অস্বাভাবিক ; নাড়ী দ্রুতগামী ; হৃকের মধ্যে পূর্ণ এবং কঠিনত্ব ; শ্বাসকষ্ট এবং অবসন্নবোধ (একন) ।

ব্যবহার । অর্শরোগ এবং তদরূপ যান্ত্রিক কার্য সঙ্কীর্ণ অস্বাভাবিক ; কোষ্ঠবদ্ধ ; উদরাময় ; স্রংপিণ্ডের যান্ত্রিক এবং কার্য সঙ্কীর্ণ অস্বাভাবিক ; শোথ ; কষ্টকর রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation) ; যোনি দ্বারের চুলকানি এবং অর্শ জনিত অন্যান্য প্রকারের অস্বাভাবিক ; অণ্ডকোষের শিরার প্রস্রাব ; স্ত্রীলোকের জরায়ু স্থানান্তরিত হওয়া (Prolapsus Uteri) ; আমাশয় এবং মলত্যাগের পূর্বে ও পর তলপেটে শূল বেদনার স্থায় বেদনা এবং বায়বায় কষ্টদায়ক কৌথ পাড়া ; গর্ভাবস্থার বা সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীলোকের অর্শরোগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ ও জরায়ু স্থানান্তরিত হইয়া মোড়াইয়া পড়া ইত্যাদি অস্বাভাবিক কলিম্বোনিয়া ব্যবস্থা ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । কলিম্বোনিয়ার কার্যের সঙ্গে আদোজ, ইন্ডুগাস হিপোক্যাঠেনাম্ এবং পডোফিলামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । অত্যন্ত কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে হাইড্রাষ্টিস, নাক্স-বমিকা, সাল্ফার, ডায়োকসিয়া এবং ডিজিটালিসের কার্যেরও সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ২য় এবং ৩য় স্কেলের আরোকই সচরাচর

অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গর্ভাবস্থায় অর্শরোগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এই ঔষধের মূল আরোক, ২ ফেঁটা মাত্রার, ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায়, আপন চিকিৎসার ফল দেখিয়া লেখক এরূপ স্থির করিয়াছেন ।

ক্রোকাশ্ স্যাটাইবাস্, -(যাক্রাঙ্গ), -ক্রোকাশ্

(CROCUS SATIVUS, -CROC. SAT.)

আসিয়া মাইনারে এই গাছের জন্ম । স্পেইন্, ফ্রান্স্ এবং ইটালী দেশ হইতেও নানা দেশে ইহার আমদানি হয় । শুকনা যাক্রাঙ্গ্ বধানিরমে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । যাক্রাঙ্গ্ প্রায় সমুদ্র পসারি বা বেনের দোকানেই পাওয়া যায় ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার উপর ইহার কার্য অতি প্রবল । ইহা মস্তিষ্কের উত্তেজনা এবং রক্তাববোধ উৎপাদন করিয়া হিষ্টিরিয়া জনিত উন্নততা উৎপাদন করে । ইহা জরায়ুতে শিরা লক্ষ্যকর (Venous) রক্তাববোধ আনয়ন করে এবং তদ্বৎ জরায়ু হইতে কাল্পেট লাগবর্ণ, চাপ্ চাপ, থানা থানা, রসির জ্বর রক্তস্রাব হয় । রসির জ্বর রক্তস্রাব হওয়া এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সর্বদা মনের ভাবের পরিবর্তন ; রাগ করিয়া উহার পর-ক্ষণেই উহার দ্রবণ সহ্যতা পূর্য ; মনে অবগততা এবং আনন্দ বা সুখ ; একবার চটিয়া বা ছুঃখিত হইয়া উহার পরক্ষণেই মনের উন্নাদ বা সুখভাব (একন্, ইগ্‌নেস্, নাক্স-মক্স্, প্লাটিনা) ; মন অস্থির, উদ্বেগবৃত্ত এবং মনে ছুঃখের ভাব ; উন্নততা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা মনের উন্নাদ বা সুখি থাকা ; গান করা, ঠাট্টা ভাষা এবং হাসিবার অভ্যস্ত প্রবণ ইচ্ছা (হায়োস্, ট্র্যান্) ; রোগী সকলের মুখেই চুপন করিতে চাহে ।

মস্তক । ডাইন কর্কেনর পক্ষাংভাগে এবং কপালের বাম পার্শ্বের

উন্নত স্থানে মস্তিষ্কের মধ্যে যেন হঠাৎ ধাক্কা লাগে, যাহার দরুণ রোগী হঠাৎ চমকিয়া উঠে ।

চক্ষু । কেতুব পড়িলে ঘেরুপ হয়, চক্ষু সেরুপ টিপান এবং বারবার চক্ষু মুছা (আলাম্, পাল্‌স্) ; চক্ষুর ভারী অভ্যস্ত বিস্তৃত ; ধূম প্রবেশ করিলে ঘেরুপ হয়, চক্ষে সেরুপ জালা এবং কুট্‌কুটানি ; একখানি অতি সরু কাপ-ডের নখ্য দিয়া তাকাইলে ঘেরুপ হয়, চক্ষে আলোক সেরুপ ঢিমা বা অস্পষ্ট দেখায় (ব্যারাইটা-কার্ক, কষ্ট, হারোস্, পিট্রোং, পাল্‌স্) ; চক্ষের মধ্যে জলের সঞ্চার হইলে ঘেরুপ হয়, চক্ষে অনবরত সেরুপ অল্পভূত হয় ; অনেক-কণ কাশিলে ঘেরুপ হয়, চক্ষে সেরুপ অল্পভূত হয় ; গুস্তকাদি পাঠের পর চক্ষে জালা এবং টাটানি ; চক্ষে কাপ্‌সা দেখা, যাহার দরুণ বারবার চক্ষু টিপাইতে হয় (ইউ-ফ্রেন্) ; সময় সময় চক্ষু পাতা সজোবে চাপিবার ইচ্ছা (ইউফ্রেন্) ; চক্ষু উপরের পাতার স্পন্দন ।

নাগিকা । নাকদিয়া চট্‌চটয়া আঠা এবং কাল রক্তস্রাব ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে বড় বড় ফোঁটার ঘর্ষ ; প্রবল হাঁচি ।

গলার মধ্য । গিলিবার সময় এবং উহার আভ্যন্তরিক কালেও জিহ্বা লম্বা হইয়াছে এরূপ অল্পভূত হয় ।

পাকস্থলী । অভ্যস্ত পিপাসা এবং শীতল জলানিধানের ইচ্ছা (একন্, ব্রাই) ; উদ্যার উঠা ; কোন একটী জীবিত প্রাণী লাফাইবা বেড়াইলে ঘেরুপ হয়, পাকস্থলী এবং উদরের মধ্যে সেরুপ অল্পভূত হয় (থুজা) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্যোগ ও শরীর কম্পন ।

মলদ্বার । সময়ে সময়ে গুহদ্বারের বামপার্শ্বের নিকটবর্তী স্থানে স্রুতীর্ষধানের জ্বায়ে যুস্মুনে বেদনা এবং টাটানি ; গুহদ্বারের অসহ্য মোড়গী ; স্রুতবৎকৃতা থাকিলে ঘেরুপ হয়, গুহদ্বারে হামা দেওয়ার জ্বায়ে সেরুপ হুড়্‌হুড়ী ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের স্রাবস্রবাসের ইচ্ছার অতিরিক্ত উত্তেজনা । স্রীলোকের রক্তস্রাব আরম্ভ হইবে এরূপ অল্পভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তলপেটে বেদনা এবং যোনির নিম্নদিকে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার জ্বায়ে অল্পভূত হওয়া (সিমিসিক্, পাল্‌স্, কালোফ্) ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত

পরিমাণে কাল্চে (ক্যালী-নাইট্রিক), অঁটাল, রসির জ্বর রক্তস্রাব বাহ্য
কাল চাপে চাপে নির্গত হয় (আমন্-কার্ক, সাইক্লেমেন্, ইগ্‌নেস্, প্লাটিনা,
সাবাইন) ; সামান্য নড়াচড়াতেই জ্বরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ।

ঋাসযন্ত্র । অত্যন্ত অবসন্ন কারক প্রবল শুষ্ক কাশি ; ঋাস প্রবাসে
বমনোৎপাদক দুর্গন্ধ বাহির হয় (ক্যাম্প্, সাক্সুনেরিয়া) ; বুকের বাম পার্শ্বে
সুটীবিধানের জ্বায় ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনা ; বুকে অত্যন্ত ভারিবোধ, বাহার দক্ষণ
রোগী বারবার দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে বাধ্য হয় ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । বাহর হিউমারাস্ (Humerus) নামক অস্থির
মাথা ঢল্‌ঢলে হইলে ঘেক্রপ হয়, বাহর উপরিভাগ সঞ্চালনে সেক্রপ বেদনার
উদ্বেক হয় ।

নিদ্রা । ঘুমেরঘোরে এলোমেলো এবং ভয়ানক স্বপ্ন দেখা ।

ব্যবহার । কোরিয়া (Chorea) ; হিষ্টেরিয়া জনিত অস্থখ ; রক্তস্রাব ;
জ্বরায়ু হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব (Metrorrhagia) ; নাক দিয়া
রক্তস্রাব ; অতিরিক্ত বা প্রচুর রক্তস্রাব ; চক্ষে ঝাপসা দেখা ; চক্ষুর পেশীর
অতিরিক্ত ব্যবহার জনিত চক্ষে ঝাপসা বা কম দেখা (Asthenopia) ইত্যাদি
অস্থখে ক্রোকাশ্ ব্যবস্থা ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । পেটে কোন জীবিত প্রাণী লাকাইয়া
বেড়াইতেছে, এক্রপ অন্তত্ব হওয়া ; নানা যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, (রক্তস্রাবের) রক্ত
কাল্চে এবং চাপ চাপ, থানা থানা ; (ডাক্তার গারেন্সি (Dr. Guerenzy)
বলেন আল্‌কাতরার হ্যাম অঁটাল) ; অত্যন্ত শারীরিক পারিশ্রমে ঘেক্রপ হয়,
সজ্জার সময় সেক্রপ অতিরিক্ত পরিমাণে শ্রান্তিবোধ বা অবসন্নতা এবং
উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার ভাব এবং মনে হয় যেন চক্ষের পাতা ফুলিয়া ভারি
হইয়াছে ; পুস্তকাদি পাঠে উপদ্রবের উপশম হয় ; পেণার ঝাকান ; প্রাতঃ-
কালে লক্ষণাদির বৃদ্ধি এবং বাহিরায়ুতে উহার উপশম ইত্যাদি ক্রোকাশের
কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ক্রোকাশের কার্যের সঙ্গে বেগাডোনা,
প্লাটিনা, সাবাইন এবং সর্বাপেক্ষা কটীর কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে ।
এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে একোনাইট, ক্যাল্‌কেরিয়া

কার্বোনিকা, ইপিকাকিউএনা, ইগ্নেসিয়া, নাক্স-বমিকা; ওশিয়াম, পাগ-
নেটিল, রাস্টল্‌স্‌, সিপিয়া এবং সাল্‌ফারের কার্যেরও সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একেনাইট্‌, বেলাডোনা, ওপিয়ারাম্‌।

ডাইলুশন বিচার। ডাক্তার হিউজ্‌ (Dr. Hughes) সচরাচর ২য়
ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে কখন কখন ১ম ক্রম ২য় ক্রম
অপেক্ষা অধিক উপকারী। লেখক স্বয়ং ২য়, ৩য়, এবং ৬ষ্ঠ ক্রমই সচরাচর
ব্যবহার করিয়াই বোধোচিত ফল পাইয়া থাকেন।

ক্রোটন্‌ টিগ্লিয়াম্‌,-ক্রোটন্‌

(CROTON TIGLIUM,—CROT.)

ভারতবর্ষ, লঙ্কাদ্বীপ, মালাক্কা দ্বীপ এবং আসিয়ার অন্যান্য স্থানে এই
গাছের জন্ম। ইহার বিচি আব্‌সোলিউট্‌ আল্‌কোহালে (Absolute
Alcohol) (১ ভাগ ক্রোটন্‌ এবং ২০ ভাগ আব্‌সোলিউট্‌ আল্‌কোহল্‌),
ভিজাইরা ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। অস্ত্রের যোজক বিল্লী এবং চর্ম্মের উপর ইহার
কার্য অতি প্রবল। ইহা রক্তের জগীয় পদার্থ পরিবর্তন করিয়া প্রচুর
পরিমাণে উদরাময় এবং চর্ম্মের উপর প্রকৃত বিকচ (Eczema) উৎপাদন
করিয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

চক্ষু। চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়া (ইউফ্রেন্স)।

কর্ণ। বামকর্ণের গভীরতম অংশে আক্কেপিক রক্তের কুটুটানী
বা খোঁচা বিধার স্রাব বেদনা।

পাকস্থলী এবং উদর। পাকস্থলীর মধ্যে খালি খালিবোধ
(সিপিয়া); পাকস্থলীতে হ্রস্বলবোধ এবং পেটে পিঠে ঘেন লাগিয়া যার
(ইগ্নেস)। উদর পূর্ণ, স্ফীত এবং বিস্তৃত ও নাভি প্রদেশে বেদনা বা
পেটকামড়ানী (কলোস্‌); উদরে কষ্টকর খালিবোধ এবং ক্ষুধাবোধ; উদরে

কল কল, গড়্ গড়্ শব্দ হওয়া ; কেবল জল ভরা থাকিলে বেরূপ হয়, আর সেরূপ গড়্ গড়্ শব্দ হওয়া (হেলিবোরাস্), বাহা বাম পার্শ্বেই অধিক অম্লভূত হয় ; জল থাকিলে বেরূপ হয়, আরের মধ্যে সেরূপ গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হওয়া ।

মল এবং মলদ্বার । উদবে দূষিত বায়ুর স্ফোর (Flatulence) হওয়ার পরই মলত্যাগের অত্যন্ত ইচ্ছা বা বেগ (আলোজ্) ; মল হঠাৎ স্ফোরে নির্গত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্কতার দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্) ; শুষ্কদ্বারে অনবরত বহির্দিক পানে চাপাবোধ এবং নাভি-প্রদেশে চাপ দিলে শুষ্কতার পর্য্যন্ত অত্যন্ত কষ্টকর বেদনানুভব ; শুষ্কদ্বারে এরূপ অম্লভূত হয় যে, উহার দরুণ মনে হয় যেন সহজেই উদরাময় হইবে ; একখানি কাঠের টুকরা বহির্দিকে ঠেলিয়া বাহির হইলে বেরূপ হয়, শুষ্কদ্বারে সেরূপ বেদনা ; অনবরত বাহ্যের বেগ হইয়া তৎপর হর্গন্ধবৃদ্ধ, মলিন সব্জ-বর্ণের কাইয়ের ভ্রাম মল ভেদ, বাহা শুষ্কতার দিয়া বন্ধুকের গোলার ভ্রাম হঠাৎ স্ফোরে বাহির হয় (নেট্রাম্-কার্ক, গ্রাটিওলা) ; মল অত্যন্ত তরল, হরিত্রা-বর্ণের জলের ভ্রাম, বাহা শুষ্কতার দিয়া স্ফোরে বাহির হয় (গ্রাটিওলা, থুজা, সেনিগা) ; বেদনাহীন জনবৎতরল ভেদ (আস্, চারনা, পডোফ্) ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ এবং অণ্ডকোষাধারে বারবার ক্ষতকারক চুলকানি ; অণ্ডকোষাধার ছোট হয়, অত্যন্ত চুলকানি, যাহার দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং চুলকাইলে যাহার উপশম হয় ও যাহার দরুণ ক্রীসহবাসের ইচ্ছার উদ্রেক হয় ; অণ্ডকোষাধারে ক্ষতকারক চুলকানি, চলিবার সময় যাহার বৃদ্ধি হয় ; আক্রান্ত স্থান লালবর্ণ ; অণ্ডকোষাধার এবং পুরুষাঙ্গে কোষার ভ্রাম ধুকুড়ী (রাস্টজ্) । ক্রীলোকের যোনি ইত্যাদিতে অত্যন্ত চুলকানি, সামান্য চুলকাইলেই যাহার উপশম হয় ; স্তন কঠিন এবং স্কীত ও উহার বোটার মধ্য দিয়া স্বচ্ছাঙ্গি পর্য্যন্ত বেদনা ; স্তনের বোটা স্পর্শ করিলেও টাটানির উদ্রেক হয় ; শিশু যে স্তন পান করে সে স্তনের বোটার মধ্যদ্বারা স্বচ্ছাঙ্গি পর্য্যন্ত বেদনা ।

আসায়ন্ত্র । বুকের মধ্যে আঁটাবোধ, যাহার দরুণ মনে হয় যেন কুফল বিস্তৃত হইবে না (আসাক্) ; বুকের দুই পার্শ্বেই পূর্ববোধ এবং উহার

সঙ্গে সঙ্গে বুকের বাম পার্শ্বে এবং উপর বকের দিকে জ্বালাযুক্ত স্থী বিধা-
নের জ্বর বেদনা ।

চর্মা । বাম উরুতে, অণ্ডকোষাধাৰের বিপরিতদিকে লাল, অর্ধ
ফুস্ফুড়ী, যাহা হইতে হর্গন্ধযুক্ত কলতানি পড়ে এবং বাহ্য স্পর্শ করিলে বা
চলিবার সময় অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় এবং টাটার ; চর্মের চুলকানি এবং
জ্বালাযুক্ত বেদনা ও অক্রান্ত স্থান লালবর্ণ ; গায় ফোকার জ্বর ফুস্ফুড়ী
বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বাহ্য ফাটিয়া বা হইয়া কলতানি পড়ে এবং ফুস্ফুড়ীতে
ধোলা বা চুনটি জন্মিয়া পড়িয়া বার (আন্টি-টর্চ, সিকুটা, রাস্টল্জ, সাল-
কার) ; গায় চুলকানি বিশিষ্ট ফোকাব জ্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ ।

জ্বর । গায় ঠাণ্ডাবোধ বাহ্য পায়ের ডিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

ব্যবহার । উষণ্যময় ; গ্রীষ্মকালীয় উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে
বমন ; ওলাউঠা ; বিকচ (Eczema), বিশেষতঃ সুখমণ্ডল এবং জননেত্রিয়ে ;
গায় ফোকার জ্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্ফুড়ী বা ব্রণ ; জ্বীলোকের শিশুগণকে স্তনদুগ্ধ
পান করান সময়ে স্তনের বোটা হইতে বন্ধ পর্য্যন্ত খোঁচা বিধার জ্বর বেদনা
ইত্যাদি অস্থখে ক্রোটিন ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । গুহাবাব দিয়া মল বন্ধকের গোলা বা
পিচ্কারীর নালের জ্বর সজোরে নির্গমন, গায় ফুস্ফুড়ী হইলে অত্যন্ত চুল-
কানি এবং তদ্রূপ জ্বালা ও কলতানি পড়া ক্রোটিনের বিশেষ প্রাকৃতিক
লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । অরুের উপর ক্রোটিনের কার্য্য ইলেকট্রিয়ার্দ,
বিরেট্রাম্ আল্‌বাম্ এবং কল্‌চিকামের জ্বর । চর্মের উপর ইহার কার্য্য
রাস্টল্জ, এলিস্ এবং মেজিরিয়ার্মের জ্বর । এতদ্বিধ কোন কোন বিষয়ে
ইহার কার্য্যের সঙ্গে আনাকার্ডিয়ার্দ, গ্রাটিওলা এবং খুজার কার্য্যেরও
সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । রাস্টল্জ ।

ভাইলুশন বিচার । ওষুদ্বশমিক হইতে ঔষুদ্ব শতভাগিক ক্রমের
আরোহই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ডায়োকরিসা বিলোসা,-ডায়োক্

(DIOSCOREA VILLOSA,-DIOSC.)

দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল ভূমিতে এই গাছ জন্মে। ইহার শিকড় যথা নিয়মে প্রক্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হয়। গুঁড়াকে ডায়োকরিন্ বলে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্যাঙ্গ্লিয়োনিক্ স্নায়ুগুণের (Ganglionic nervous System) মধ্যদ্বারা নাতি প্রদেশের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দরুণ পেট ও নাতিপ্রদেশে পিত্তাধিক্য জনিত শূল বেদনার (Bilious Colic) ভায় বেদনা উৎপন্ন হয়। এই বেদনার দরুণ রোগী হাঁটু গুঁড়াইয়া জড়নড় হইয়া থাকিতে চাহে বটে এবং মনে হয় যেন আক্রান্ত স্থানে চাপ দিলে বেদনার উপশম হইবে;° বাস্তবিক তাহা নহে, প্রচাপনে বরং উক্ত প্রকারের বেদনার বৃদ্ধি হয় এবং শরীর বিস্তৃত করিলে বেদনার উপশম হয়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। এক বস্তুকে উহার প্রকৃত নাম ধরিয়া না বলিয়া অন্য একটা নাম ধরিয়া বলার ইচ্ছা।

মস্তক। মাথাঘোরো এবং মাথা কিম্ কিম্ করা; মাথা এবং কপালের দুই পার্শ্বে ঘুশ্-ঘুশে বেদনা; কপালের দুই পার্শ্বে অত্যন্ত প্রখর বেদনা।

চক্ষু। প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতার পাতার লাগিয়া থাকে।

কর্ণ। কর্ণের সম্মুখ ভাগে চাপিয়া ধরার ভায় ঘুশ্-ঘুশে বেদনা; কর্ণের সম্মুখ এবং পশ্চাৎভাগে প্রথর বেদনা।

নাসিকা। নাকের মধ্যে অত্যন্ত জ্বালাহুত্ত্ব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত হাঁচি দেওয়া (একন্, জেল্‌স্); বাম নাসারন্ধ্র দিয়া উজ্জল লালবর্ণ রক্ত পড়া; নাসারন্ধ্রে জ্বালা এবং টাটানি; নাকে বিশ্রী দুর্গন্ধ।

মুখমণ্ডল। বাম নিম্ন মাড়ির কোণে চৰ্চ্চনবৎ, কসিয়া ধরা, খনন করা অথবা ছুরি বিধানের ভায় প্রবল বেদনা।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। প্রাতঃকালে জিহ্বা কটাবর্ণের পুরু লেণযুক্ত; পুড়িলে খবরূপ হয়, জিহ্বার ধারে দেরূপ টাটানি এবং জ্বালাহুত্ত্ব (কলোস্, আইরিস্, প্লাটিনা, সালুনেরিয়া, বিরেট্-বিন্নাইড্);

জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষত বা টাটানি ; প্রাতঃকালে মুখগহ্বর অত্যন্ত শুষ্ক, তিক্ত এবং চট্‌চটিয়া আঠা ; মুখগহ্বরের তালুতে এবং মাড়িতে টাটানি । মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ এবং গলার মধ্যে চড়্‌চড়ানি, জ্বালা এবং চিড়িক মারা ; কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থিতে বেদনা এবং টাটানি ।

পাকস্থলী এবং উদর । টক বা তিক্ত উদগার উঠা ; গলাদিয়া অধিক পরিমাণে স্বাদশূন্য উদগার উঠা, বাহার দরুণ পাকস্থলীর অন্ত্রের অনেকটা উপশম হয় (কার্কোলিক-আস্) ; বমনোদ্বিগ্ন ; পাকস্থলীর মধ্যে ভারি হওয়ায় জ্বর অন্ত্র বোধ ; পাকস্থলীর মধ্যে অনবরত কষ্টমুভব এবং বারম্বার প্রবল বেদনা, বাহার দরুণ রোগী কোমরের কাপড় তলতলে করিয়া পরিতে বাধ্য হয় ; উদবোর্ক প্রদেশে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা, উদগারে টক বা তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট দূষিত বায়ুনিঃসরণে বাহার উপশম হয় ; পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ (আস্) ; পাকস্থলীর মধ্যে খিল ধরার জ্বর প্রবল বেদনা এবং উহার পর উদগার ও গলাদিয়া স্বাদশূন্য দূষিত বায়ু নিঃসরণ এবং তৎপর হিকা ও গুহুদ্বার দিয়া দূষিত বায়ু (Flatulence) নিঃসরণ ; উদবোর্ক প্রদেশে বর্জনবৎ প্রথর বেদনা (কলোস্) । তলপেটের বাম পার্শ্বে প্রথর বেদনা ; যকৃত প্রদেশে ভারিবোধ এবং চর্জনবৎ ঘৃণ্‌ঘৃণে বেদনা, সন্ধ্যার সময় বাহার বৃদ্ধি হয় ; যকৃত প্রদেশে কর্জনবৎ বেদনা ; যকৃতের পিত্তাধাব প্রদেশে কঠিন বোধ এবং ঘৃণ্‌ঘৃণে বেদনা ; নাভি প্রদেশ এবং তলপেটে অনবরত অন্ত্র বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্যে মূর্ছক মূর্ছকে কর্জনবৎ শূল বেদনার জ্বর বেদনা (কলোস্) ; নাভি প্রদেশে খিলধরার জ্বর বা আক্কেপিক বেদনা এবং পেট কামড়ানী (কলোস্) ; অন্ত্রের মধ্যে গড়্‌গড়্‌, কল কল শব্দ হওয়া এবং গুহুদ্বার দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; আহারের পর উদরে প্রচুর দূষিত বায়ু সঞ্চার এবং দূষিত বায়ুর সঞ্চার ছেজ শূল বেদনা, কিন্তু উহার সঙ্গে যকৃতের সামান্য অন্ত্র থাকে, অথবা যকৃতের অন্ত্র একবারেই থাকে না ; গুহুদ্বার দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; অন্ত্রের মধ্যে মোচড়ানের জ্বর বা প্রথর কর্জনবৎ বেদনা ; চাপিলে অন্ত্রের মধ্যে বেদনা এবং টাটানির উদ্রেক হয় ; কুঁচকি প্রদেশে বেদনা বাহ্য অঙকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হব ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্কদ্বারে চুলকানি ; শুষ্কদ্বারে লাল, বড় বলী বাহা অতি বেদনায়ুক্ত হয় এবং টাটার ; বারদ্বার অত্যন্ত বাহ্যে বেস ; অতি প্রত্যাঘে উদরাময়, বাহার দরুণ রোগী বিছানা হইতে তাড়াভাড়ি উঠিয়া পায়থানায় যাইতে বাধ্য হয় (আলোজ, পডোক, ক্রমেন্স, সালফ) ; প্রাতঃকালে প্রচুর পরিমাণে হয়িজ্রা বর্ণের তরল ভেদ ; তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কৌপপাড়া, মল চট্‌চটিয়া আঠা, কাল্‌চে, পিত্তযুক্ত ; অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, পাতলা রাখা সাগুর ভায় ।

জননেদ্রিয় । পুরুষের বারদ্বার স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা এবং তদরূপ পুরুষাদি খাড়া হওয়া ; পুরুষাদি নীতল এবং শিথিল (আগ্নাস, ক্যান্সার) ; অণ্ডকোষাধা এবং উহার নিম্ন দেশে উগ্র গন্ধযুক্ত ঘন ; স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছার হ্রাস ; নিক্রাবস্থায় ঋতু নিঃসরণ বা স্বপ্নদোষ (চায়না, কন্-আস) ।

শ্বাসযন্ত্র । গলাব মধ্যম নিম্নদেশে হুড়্‌হুড়্‌ বা কুট্‌ কুট্‌ করার দরুণ ঘুশ্‌ ঘুশে কাশি ; উভয় কুক্ষুসেই ঘুশ্‌ ঘুশে রক্তের কনকনান অথবা কর্কশবৎ শব্দ বেদনা ।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎপ্রদেশে প্রথর বেদনা ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবার পশ্চাৎদেশে ঘুশ্‌ ঘুশে বেদনা ; প্রাতঃকালে পৃষ্ঠদেশে বেদনা, বাহার দরুণ উপুড় হওয়া যায় না ; পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক বেদনা ; পৃষ্ঠদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । বাম হৃৎকে বেদনা ; বাহ্য সমুখ ভাগ, হাত এবং মাংসবন্ধের হাড়ে কঠিন বেদনা । উক্ত সন্ধিতে কঠিন ঘুশ্‌ ঘুশে অথবা ছিঁড়িয়া ফেলার ভায় বেদনা ; চলিবার সময় অথবা সোজা হইয়া বসিলে ডাইন পায়ের গোড়াভী হইতে পাতা পর্য্যন্ত বেদনা ; হাঁটু দুর্বল, কঠিন এবং উহাতে সঞ্চালনের শক্তির অভাব ; পায়ের পাতার সন্ধি দুর্বল এবং বেদনায়ুক্ত ।

চর্ম্ম । পায়ের নখকোণীর প্রান্ত্রে যখন নখের মধ্যে কুট্‌ কুট্‌ করে এবং নখ অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় ; নখ মট্‌কা বা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় ।

ব্যবহার । বিরাম রহিত বা স্বল্প বিরাম বিশিষ্ট শূল বেদনা (সবিরাম

শূল বেদনার কলোসিহ্ উপকারী) ; উদরাময় ; ওলাউঠার দ্বায় প্রবল উদরাময় বা ওলাউঠার পূর্ববর্তী উদরাময় ; পিত্তাধিক্য জনিত অম্বুধ ; অর্শরোগ ইত্যাদি অম্বুধে ডায়োকরিয়া ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অস্থিরতা, শরীর কম্পন, অবসন্নবোধ, ক্লান্তি এবং শ্রান্তি বোধ ; শরীরের নানা স্থান এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চুলকানি (কার্কোলিক্-আস) ; সন্ধ্যার সময় বা প্রথম রাত্ৰিতে বিছানায় শয়ন করিলে, রাত্ৰিতে, শয়ন করিয়া থাকিলে, হাঁটু শুটাইয়া জড় সড় হইলে অম্বুধের বৃদ্ধি এবং বহির্কায়ুতে নড়াচড়াতে, নড়া চড়া, ঘোড়ায় চাপিলে বা চলিয়া বেড়াইলে অথবা সোজা হইয়া দাঁড়াইলে অম্বুধের উপশম ; প্রায় সমুদয় অম্বুধই, বিশেষতঃ শূল বেদনা, বিরাম রহিত বা স্বল্প বিরাম বিশিষ্ট ইত্যাদি ডায়োকরিয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ডায়োকরিয়ার কাৰ্বোর সঙ্গে ইন্ধুলাস্, আলোজ্, ব্রাইওনিয়া, কলোসিহ্, নাক্সবমিকা, পডোকিলাম্ এবং সাল্-কারের কাৰ্বোর সাদৃশ্য আছে ।

ডাইনুশান বিচার । ডায়োকরিয়ার মূল আরোক এবং ১ম দশমিক ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডায়োকেরিণের ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ হইতে ৩ গ্রেইণ মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । শূল বেদনার জন্য লেখক ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া ২।৩ গ্রেইণ মাত্রায় ব্যবহৃত করিয়া থাকেন । ১ম দশমিক ক্রম অপেক্ষা উচ্চ ক্রম ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইতে দেখা যায় না ।

ইউকেলিপ্‌টাস্ গ্লবিউলাস্,-ইউকেলিপ্‌ট্

(EUCALYPTUS GLOBULUS,-EUCALYPT.)

এই গাছ অষ্ট্রেলিয়াতে জন্মে । ইহার গুলকনা পাতা দিয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য

অতি প্রবল, বাহার দক্ষণ অজীর্ণ হইয়া উদরাময় হয় এবং মলে ইউকেলিপ্-টোলের (Eucalyptol) গন্ধ বর্তমান থাকে । ইহা জ্বংপিণ্ডের কার্য বৃদ্ধি করে, রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়ার জোর বাঁতেজ কমায় এবং তদক্ষণ মেলেরিয়া জনিত সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরের জ্বর লক্ষণাদি বিশিষ্ট জ্বর উৎপন্ন হয় । অতএব এই ঔষধ উক্ত প্রকারের জ্বরে বিশেষ উপকারী ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । স্নায়বিক এবং অস্ত্রান্ত্র প্রকারের মাথাধরা ।

নাসিকা । নাসারন্ধ্র সম্বন্ধীয় সর্দি (হাইড্রাট্, ক্যালী-বাই) ।

চক্ষু । স্লেম্মাজনিত চক্ষু প্রদাহ ।

মুখগহ্বর । মুখগহ্বরে জ্বালাহুতব বাহা মুখগহ্বরের পশ্চাত্তাঙ্গ এবং বাহ্যাহা গলনালী পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা ; মুখে অতিরিক্ত পরিমাণে লালের সঞ্চাব (মার্ক্, আয়োড্, নাইট্রিক্-অ্যাস্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । উগ্র গন্ধবিশিষ্ট উদরার উঠা ; উদরস্থ আহার জ্বাদি ভাল হজম হয় না ; পাকস্থলীতে গরম এবং জ্বালাবোধ ; পাকস্থলীতে পূর্ণ, চাপা এবং ভারিবোধ (অ্যাস্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্) । নাভি প্রদেশে অত্যন্ত কষ্টকর চাপা এবং পূর্ণবোধ ; মনে হয় যেন উদরাময় হইবে (অ্যালোজ্) ।

মূত্র । আমাশয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্কতার মধ্যে গরম বোধ, কষ্টদায়ক কৌথপাড়া এবং স্লেম্মা ভেদ ; অত্যন্ত বলক্ষয় ; শুষ্কতার দিয়া রক্তস্রাব (হামামেলিস্, ইপিকাক্) ; জলবৎ তরল উদরাময় এবং দাঁতের পুর্বে অস্ত্রের মধ্যে প্রথম কনকনিয়া বেদনা ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন ; জ্বংপিণ্ড সম্বন্ধীয় হাঁপানি (Cardiac Asthma) ; যদি ধমনির স্ফীতি এবং বিস্তৃতির দক্ষণ নিউমোগ্যাট্রিক্ স্নায়ু এবং উহার শাখাতে চাপ পড়ে ।

চর্ম্ম । গায় দাঁদের জ্বর ফুস্ফুড়ী; গ্রহির বিবৃদ্ধি ; গায় পচাযুক্ত ক্ষত বাহা সহজে শুকায় না ।

ব্যবহার । মেলেরিয়া জনিত ঐক্যিক বা ত্র্যাহিক জ্বরে কোইনাইন্

স্ববহার না করা হইয়া থাকিলে ; কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত পুরাতন আকারের জ্বর ; সর্দি ; আমাশয় ; উদরাময় ; শ্বেত প্রদর ; বায়ুনশ প্রদাহ ; গায় ফুস্ফুসী এবং কত ; পূঁষ সম্বন্ধিত কত ; শায় শূল ; বাতরোগ ; জ্বর বিকার বা আন্ত্রিক জ্বর ; জ্বরায়ুর যে প্রকার শৈল্পিক রোগ, নাসিকার প্রদাহ, ককট রোগ এবং গলন বিশিষ্ট বা হহতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নির্গত হয়, সেপ্রকার অন্তর্গত এই ঔষধ ব্যবহার্য । মেলেরিয়া জনিত জ্বরে ইউকেলিপ্টাসের উৎকারীতা সম্বন্ধে হেল্‌স্‌ নিউ রেমিডিজ্‌ (Hale's "New Remedies") নামক গ্রন্থে লিখিত আছে “যে সকল স্থানে এই গাছ জন্মে, সে সকল স্থানে মেলেরিয়া জনিত জ্বর হয় না।” “যে জনে এই গাছ জন্মে অথবা যে জলে ইহার পাতা পড়ে, সে জন যে পথিকেনা পান করে, তাহাদিগকে মেলেরিয়া জনিত জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতে দেখা যায় না।”

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ইউকেলিপ্টাসের কার্যের সঙ্গে আর্দ্র-নিক্‌, ব্যাপ্‌টিসিয়া, চামনা, সিড্রন্‌ এবং কার্বোলাক্‌ আবিভেদের কারণের বিশেষ সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের আরোক বা মূল আরোক এক কোঁঠা মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই ঔষধ দ্বারা লেখক জরাক্রান্ত যত রোগীর চিকিৎসা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন, উহার সমুদয় রোগীকেই মূল আরোক সেবন করাইতে হইয়াছে । ইহার মিশ্র আরোক দ্বারা তাহাদিগের বিশেষ ফল হয় নাই । ইহার মিশ্র আরোক দ্বারা, বিশেষতঃ জ্বররোগে, কোনও উপকার পাওয়া যায় না লেখক এক্রূপ বিশ্বাস করেন । যে সকল স্থানে অধিক পাতা জলাশয় থাকে এবং উহার বাসীগণ মেলেরিয়া জনিত জ্বরের দরুন অত্যন্ত কষ্ট পায়, সে সকল স্থানে এই গাছ রোপন করিলে অনেক উপকার দর্শে, এক্রূপ চিকিৎসা বিবধক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় ।

ইউপেটেরিয়াম পার্ফোলিয়েটাম,-ইউপেট-পার্ক

(EUPATORIUM PERFOLIATUM,-EUPAT.-PERF.)

উত্তর আমেরিকাতে এই গাছ জন্মে। যখন ফুল ফুটে, তখন এই গাছের সমুদয় অংশ সংগ্রহ করিয়া উহা যথানিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার অংশ আরোক প্রস্তুত করিতে হয়।

সাধারণ ক্রিয়া।। পাকস্থলী এবং যকৃত, শরীরের আশাল অংশ এবং বায়ু নলের শৈল্পিক বিস্তার উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। মেলেরিয়া জনিত, পিত্তাধিক হেতু অস্থখ উৎপাদন করা এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। মাথাধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে টাটানি, ঘরের মধ্যে থাকিলে বাহার উপশম হয় এবং প্রথম বহির্বাযুতে বাওয়ার সময় বাহার বৃদ্ধি হয় ও কথোপকথনে বাহার আরাম বা বিশেষ উপশম হয়; একদিন অস্তর একদিন প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথাধরা এবং বমনোদ্বগ; শয়ন করিলে মাথার পশ্চাত্ভাগে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভারিবোধ, বাহার দরুণ মাথা হাত দিয়া না উঠাইলে রোগী মাথা খাড়া করিতে বা ভুলিতে পারে না (চেলিডন)।

চক্ষু। চক্ষু গোলকে টাটানি (ব্রাই, সিমিসিক্); চক্রে আলোক লাগে বা আলোক সহ হয় না (একন্, বেগ্, মার্ক্)।

নাসিকা। সর্দি এবং নাক দিয়া তরল স্লেয়া নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি (একন্, সাক্সেনেরিয়া) এবং প্রত্যেক হাড়ে কনকনানি।

পাকস্থলী এবং উদর। পিপাসা এবং শীতল জল পানের ইচ্ছা (একন্, আস্, ব্রাই); বমনোদ্বগ এবং উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন (আন্টি-টার্ট্, ইপিকাক্); কাঠবমী এবং পিত্তবমন (আইরিস্, পডোফ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে কঁাপনি এবং বেদনা ও তদরুণ অত্যন্ত দুর্বলতা এবং প্রায় মূর্ছার ভাব; বমনের পূর্বে পিপাসা; প্রত্যেকবার জল বা জলীয় পদার্থ পানে বমন (কস্, সাইলিসি)। যকৃত প্রদেশে টাটানি

(এপিস্, ব্রাই, চেলিডন, মার্ক্, পডোক্); কোমবে আঁটা কাপড় পরা সহ হয় না (ক্যাক্-কার্ক্, কার্কো-বেজ্) ।

মল । মলতাগের সময় শুষ্কভাবে গরমবোধ, চিড়িক্কারা ও আঁলা ।

মূত্রযন্ত্র । কাল্চে স্বচ্ছ মূত্রতাগ ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বরভঙ্গ (একন্, কার্কো-বেজ্, হিপ্-সাল্ফ্, কন্); সন্ধ্যাকালে খুশ্-খুশ্ কাশি (কষ্ট্); কাশি এবং উহাৰ সঙ্গে সঙ্গে বায়ুনের মধ্যে গরম এবং আলাবোধ বা টাটানি, মুখমণ্ডল আরক্ত ও টল্‌টলে; চক্ষু জলপূর্ণ; রক্ত সন্নিবিষ্ট জ্বর হেতু বৈকালে কাশি (চায়না); বুকের মধ্যে টাটানি, নিশ্বাসে বাহার বৃদ্ধি হয় (আর্গিকা) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় এবং মাথার পশ্চাৎভাগে দপ্‌দপিয়া বেদনা (চেলিডন), উষ্ণতা দাঁড়াইলে বাহার উপশম হয়; মোচড়াইয়া পড়িলে বা ধেঁতলিয়া গেলে বেকপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেকপ কন্‌কনানি (আর্গিকা, ব্রাই); কোমরের পশ্চাৎদেশে দুর্বলবোধ; জরের সময় পৃষ্ঠদেশের কম্পন ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । মোচড়াইয়া পড়িলে, ধেঁতলিয়া গেলে বা পিটিলে বেকপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেকপ বেদনা (আর্গিকা, চায়না); অস্থি স্থান ঝট হইলে বা ভাঙিলে বেকপ হয়, মণিবন্ধে সেকপ বেদনা (একন্, ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক্, রাস্‌টক্) ।

জ্বর । সমস্ত রাত্রি এবং প্রাতঃকালে শীতবোধ; সামান্ত নড়াচড়াতেই শরীর কম্পন এবং বমনোদ্বেষণ; পৃষ্ঠদেশ এবং হাত, পা ইত্যাদিতে অত্যন্ত বেদনা, কন্‌কনানি এবং টাটানি; নেপরিমাণে শীত হয়, তদুপেক্ষা কম্পন অধিক হয়; শীতলাবস্থার পব শিত্তবমন; প্রবল শিরঃশীড়া; শীতলাবস্থার অনেককাল পূর্বে হইতেই পিপাসা আরম্ভ হইয়া শীতলাবস্থা এবং উকাবস্থা পর্যন্তও ব্যাপিয়া থাকে; জ্বর রাত্রি ১২টার পর বা প্রাতঃকালে আরম্ভ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বেদনা, কম্প, দুর্বলতা এবং টাটানি থাকে, কিন্তু সামান্ত পরিমাণে ঘর্ষ হয় বা ঘর্ষ একবারেই হয় না ।

ব্যবহার । সন্নিবিষ্ট জ্বর এবং স্নায়বিক জ্বর (মেলেরিয়া জনিত হইলেই অধিক উপকারী); পিত্তাধিক এবং পাকস্থলীর অসুখ জনিত অসুখ; মর্দি জনিত জ্বর; বাতঃপ্রাণ; ডেস্‌জ্বর ইত্যাদি 'অসুখে এই ঔষধ ব্যবস্থা ।

ইউফর্বিয়াম অফিসিনেলি ।

৩৩

ডেজুজের ইউপেটেরিয়াম পার্ফোলিয়েটাম ব্যবহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এম্, ডি, মহাশয় বলিয়াছেন “ইহার লক্ষণের সঙ্গে ডেজুজের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু কএকটা রোগীর চিকিৎসায় ইহা ব্যবহার করিয়া কোনও ফল না পাওয়াতে ইহা আর ব্যবহার করি নাই এবং ইহা ব্যবহার না করার দরুণ অসুভাগ্যও করিতে হয় নাই । এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কোন কোন রোগীর রোগের লক্ষণাদি বৃদ্ধি পাইয়াছিল এমনও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে ।”

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । জ্বররোগে অক প্রত্যয়ে অত্যন্ত বেদনা, মাথাধরা বা প্রবল শিরঃপীড়া, অত্যন্ত শীতল জল পানের ইচ্ছা এবং জলাদি পান করিলেই উদরস্থ জলাদি বা পিত্ত বমন বা বমনোৎসর্গ, জ্বরের সময় পিত্তবমন এবং সার্বাত্ম ঘর্ম বা একবারে ঘর্ম না হওয়া ইত্যাদি ইউপেটেরিয়াম পার্ফোলিয়েটামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ইহার কার্যের সঙ্গে ব্রাইওনিয়া, অর্গিকা, ব্যাপ্টিসিয়া, ক্যামোমিলা, চেলিডোনিয়াম্, সিনিসিকিউগা, জেল্‌সিমিয়াম্, ইপিকাকিউএনা, মার্কিউরিয়াম্, নাক্স-বমিকা, পডোফিলাম্, কাইটোলাকা ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন এবং কখন কখন মূল আরোক, ১ ফোঁটা হইতে ৫ ফোঁটা পর্যন্তও, ব্যবহৃত হইয়া থাকে । জ্বররোগে ১ম দশমিক ডাইলুশন এবং মূল আরোকই অধিক উপকারী ।

ইউফর্বিয়াম অফিসিনেলি, -ইউফর্বি-অফিস্

(EUPHORBIIUM OFFICINALE, -EUPHORB.-OFF.)

আফ্রিকা দেশে এই গাছ ভায়ে । ইহার আঠা রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে ডিস্‌সাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । পরিপাক কার্য সম্বন্ধীয় বস্তুর উপর ইহার কার্য ক্রোটন, বাটোকা ইত্যাদি উগ্র রেচক ঔষধের স্তর, বাহার দ্রবণ ভেদ, বমন

ଏବଂ ଓଲାଉଟାର ଛାର ଅନ୍ତାନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଶ୍ରବଣ ପାର । ଯନ୍ତ୍ରିକର ଉପରଓ ଇହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିତେ ମାଓରା ବାସ, ସାହାର ନକ୍ଷତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରିକେ ରକ୍ତାଧିକ୍ୟ ବା ରକ୍ତାବରୋଧ ହେବା ଭରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତତାର ଲକ୍ଷଣାଦି ଶ୍ରବଣ ପାର । ଡାକ୍ତର ହେମ୍ପେଲ୍ (Dr. Hempel) ବଲେନ “ଯଦି ଅନ୍ତାନ୍ତ ଲକ୍ଷଣର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯନ୍ତ୍ରିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବାର ଶ୍ରାବଣିକ ଲକ୍ଷଣାଦି ଶ୍ରବଣ ନା ପାର, ତବେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାସ୍ତବ୍ୟ କରା ଉଚିତ ନହେ । ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନା ହେ, ଯନ୍ତ୍ରିକେ ରକ୍ତାଧିକ୍ୟ ବା ଉହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ହେ, ଯନ୍ତ୍ରିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବାର ଲକ୍ଷଣାଦି ଶ୍ରବଣ ନା ପାର, ଶ୍ରବଣ ନା ହେ, ତବେ ମାକହୁଲୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଲକ୍ଷଣାଦି ଶ୍ରବଣ ମାହିଲେଓ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାସ୍ତବ୍ୟ ନହେ ।” ଡାକ୍ତର ଉପରଓ ଇହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିତେ ମାଓରା ବାସ, ସାହାର ନକ୍ଷତ୍ର ବିକଟ ଏବଂ ବିସର୍ପେର ଛାର (Erysipelatous) ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣ ମାହିଲା ବାସ୍ତବ୍ୟ ।

ସାଧାରଣ ଶ୍ରାବଣିକ ଲକ୍ଷଣ ।

ଯନ୍ତ୍ରିକ । ଡାକ୍ତରୀ, ଯନ୍ତ୍ରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ; ଡାକ୍ତର; ଡାକ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ (ବେଲ୍, ହାମ୍ମେଲ୍, ଓଲିଭାର୍, ଟ୍ରାମ୍ମେଲ୍) ଏବଂ ଉହାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯନ୍ତ୍ରିକେ ରକ୍ତାଧିକ୍ୟ ବା ରକ୍ତାବରୋଧର ଲକ୍ଷଣାଦି ଶ୍ରବଣ ମାଓରା (ବେଲ୍) ଏବଂ ନାଝି କ୍ରମଗାମୀ ଓ ଅନିୟମିତ ଗତିବିଶିଷ୍ଟ ।

ଯନ୍ତ୍ରିକ । ମାଝାହିଲେ ବା ବାହାରିବୁତେ ଚାଲିଲା ବେଝାହିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତର ଶ୍ରାବଣାବରୋଧ; ଶ୍ରାବଣ ଚାଲିଲା ଧରାର ଛାର ବେନା ।

ଡାକ୍ତର । ଡାକ୍ତର ଶ୍ରାବଣ କାମଝାନୀ ଏବଂ ଉହାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତର ଦିଆ କଲ ମଝା, ଡାକ୍ତର ଆଲୋକ ଲାଗେ ବା ଆଲୋକ ମଝା ହେ ନା (ଏକଲ୍, ବେଲ୍, ଯାକ୍, ମାଲ୍) ।

କର୍ମ । କାନେ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ହେଉଲା, ହାଟି ମିଲେଓ କାନେ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ହେଉଲା ।

ନାସିକା । ବାସ୍ତବ୍ୟ ହାଟିଦେଓରା ଏବଂ ନାକ ଦିଆ ତରଳ ଶ୍ରାବଣ ନିର୍ଗମନ ।

ଯନ୍ତ୍ରିକ । ମାଲେ ବିସର୍ପେର ଛାର ଶ୍ରାବଣାବରୋଧ କ୍ରୀତି ଏବଂ କ୍ରୀତି ହାନେ ଯନ୍ତ୍ରିକର ଛାର ବଢ଼ ହରିଜା ବର୍ଣ୍ଣର କଲ୍ତାନି ପୂର୍ବ କୋକାର ଛାର ହୁଡ଼ି ।

ଯନ୍ତ୍ରିକର ଓ ଗଲାର ମଧ୍ୟ । ଡାକ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରାବଣ ଶ୍ରାବଣ ବେନା

এবং উহাতে চিড়িকমারী, বাহার দরুণ মনে হয় বেন আক্রান্ত স্থান ছিঁড়িয়া বাইবে; মুখে অতিরিক্ত পরিমাণে লাগের সন্ধার (চারনা, মার্ক্, আরোড); গলার মধ্যে জালা বাহা পাকস্থলী পর্য্যন্ত রিস্ত হর (আর্স, ক্যাঙ্ক, ক্যাপ্, মার্ক-কর) ।

পাকস্থলী এবং উদর । শীতল জলাদি পানের ইচ্ছা (একন্, আর্স, ব্রাই); উদগার উঠা; বারবার হিকা; বমনোরোগ এবং বমন; পাকস্থলীতে জালাহুতব (আর্স, ক্যাঙ্ক, ক্যাপ্, মার্ক-কর); পাকস্থলীর আক্কেপিক-সঙ্কোচন এবং পেটকানড়ানি, পেটে পিঠে লাগিয়া থাকা; পেটে গড়্গড়, কল কল শব্দ হওয়া এবং তৎপর গুহবার দিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণ (জালোঙ্ক, কলোস্, লাইকোপ্); উদরে অতিরিক্ত পরিমাণে দূষিত বায়ুর সন্ধার হেতু আক্কেপিক রকমের প্রবল শূল বেদনা (কলোস্) ।

মল । অধিক পরিমাণে ভেদ এবং বমন; মল পরিমাণে অধিক, উদরাময়ের জ্বায় তরল; মল আমাশয়ের জ্বায় শ্লেষ্মা, পচা এবং জলের জ্বায় পাতলা; কাইরের জ্বায়, হরিদ্রার আভাযুক্ত বা কাদার জ্বায় মলভেদ (বেল, ক্যাঙ্ক-কার্ক, হিপ্-সাল্ফ, পডোফ্); কোষ্ঠবদ্ধ ।

শ্বাস যন্ত্র । গলার মধ্যে বা বুকের মধ্যে খুশ্খুশী বা হুড়্হুড়ীর দরুণ শুক খুশ্খুশে কাশি; শ্বাস কষ্ট; বুকের বাম পার্শ্বে হঠাৎ বিধানের জ্বায় বেদনা ।

নাড়ী । নাড়ী ক্ষুদ্র, অনির্ঘটিত গতি বিশিষ্ট এবং ক্রান্তগামী ।

চর্ম । গায় বিসর্পের জ্বায় (Erysipelatous) প্রদাহ; হরিদ্রাবর্ণের দিরাম পরিপূর্ণ বড় বড় ফোঁকা; গায় সাংঘাতিক আকারের প্রদাহ; গায় ফোঁকার জ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ; বিকচ (Measles) এবং পচা পূর্ব সন্নিহিত বা বা ক্ষত (আর্স, ল্যাক্); গায় ক্ষতকারক চুলকানি ।

জ্বর । সমুদয় শরীরে শীতবোধ এবং কম্প; চর্ম শুষ্ক এবং উষ্ণ (একন্, ব্লেগ্); গায় শীতল ঘর্ম (ক্যাম্ফার, বিরেট্-আক্) ।

ব্যবহার । সামান্য আকারের ওলাউঠা এবং ওলাউঠার পূর্ববর্তী প্রবল উদরাময়; পাকস্থলী এবং অন্ত্রের প্রদাহ; তরুণ আকারের উন্নততা; বিসর্প (Erysipelas); বিকচ ইত্যাদি অন্ত্রের ইউক্কিরিয়াম অফিসিনেলী ব্যব-

হার্ভ্য। ডাক্তার চ্যাপম্যান (Dr. Chapman) বলেন যে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া তিনি একটি আক্ষেপিক কাশি আক্রান্ত রোগীকে আরাম করিয়াছেন। কাশির সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর মধ্য হইতে বৃকের পার্শ্ব পর্য্যন্ত স্থচী বিধানের ভায় বেদনা ইহার একটি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। তাঁহার মতে আক্রান্ত স্থানে জ্বালাযুক্ত উষ্ণাভব সম্বলিত গালের লাল প্রদাহের পক্ষেও এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। আমেরিকাতে ইউফোরিয়াম করোলেটা (Euphorbium Corollata) শিশুগণের ওলাউঠায় বিস্তৃতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার হেম্পেল (Dr. Hempel) বলেন যে, গোড়া ঘায়ের চিকিৎসায় ইহার বাহু প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। উরু এবং উরুর সন্ধির হাড়ের সন্ধিতে জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং মুচ্ছার্ত্তব এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। ইহার কার্যের সঙ্গে বিরেট্রাম্ আল্‌বাম্, কল্‌চিকাম্, ইলেটেরিয়াম্, টার্টার এমিটিক্, আসিনিক, ক্যাম্‌ফার, ক্রোটন ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহার্য্য। বাহু প্রয়োগের জন্য মূল আরোক, ৫ হইতে ১০ ফোঁটা, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইবে। ইহার মাত্রা সম্বন্ধে লেখক স্বয়ং বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না, কারণ, তিনি ইহা অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই।

যাটোফা কার্কাস,-যাটোফ্

(JATROPHA CARCAS, -JATROPH.)

ব্রাজিল, গুয়েট্, ইণ্ডিস্ এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে এই গাছ জন্মে। ইহার বিচি যথানিয়মে সুগার অব্ নিক্ মিশাইয়া ইহার গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আরোকও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে চাউল খোয়া জলের

শ্রায় ভেদ ও বমন হয়। অতএব ইহা ওলাউঠাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চাউল খোয়া জলের শ্রায় প্রচুর পরিমাণে ভেদ, মল শুষ্ক হইয়া যায়। যেন প্রবল শ্রোতের শ্রায় নির্গত হয়; সমুদয় বিষয়ে বৈরাগ্য বা অমনোযোগ এবং বেদনা যন্ত্রণাদিরও যেন জ্ঞান থাকে না; অত্যন্ত অনিবার্য পিপাসা; অধিক পরিমাণে ডিমের লালের শ্রায় জলবৎ পদার্থ বমন; পাকস্থলীতে আক্কেপিক বেদনা; একটি বোতল হইতে জল ঢালিয়া ফেলিবার সময় যেরূপ হয়, দান্তের পূর্বে পেটের মধ্যে সেক্রপ গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হওয়া বাহা দান্তের পরও থাকে; পা এবং পায়ে পাতায় প্রবল আকারের খিল ধরা; সমুদয় শরীর ঠাণ্ডা; সমুদয় শরীরে ঠাণ্ডা চট্ চটিয়া শব্দ; ঠাণ্ডা জলে হাত দিয়া রাখিলে লক্ষণাদির উপশম ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমানে ওলাউঠা রোগে এই ঔষধ ব্যবহার্য। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের উপর ইহার কার্য অনেকটা ক্রোটনের শ্রায়। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে ওলাউঠা রোগে ষাট্রোফা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না, কেবল উষ্ণ রক্তের উদরাময়েই ইহা ব্যবহার্য। এতদ্দেশে লক্ষণ বিশেষে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ওলাউঠার চিকিৎসায় অনেক সময় বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক এবং ৩য় বা ৬ষ্ঠ ক্রমের গুঁড়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া,-ক্যাল্ম্

(KALMIA LATIFOLIA,-KALM.)

এই গাছের পাতা যথা নিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা একটি বিষাক্ত ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ ক্রিয়া। হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দ্রুত হৃৎপিণ্ডের নিয়মিত কার্য করার শক্তি কমিয়া যায় এবং তদ্রূপ হৃৎপিণ্ড আস্তে আস্তে স্পন্দন করে। পেশীর উপরও ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাহার দ্রুত শরীরের স্থানে স্থানে বাতের বেদনার শ্রায় বেদনা অস্বভূত হয়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । মাথাধোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা ।

চক্ষু । চক্ষুর সম্মুখে পার্শ্বীয় ডানা বাঁড়ার জ্বর ধড়ফড়ানী ; চক্ষে বেদনা, চক্ষু ঘুরাইলে বাহার বৃদ্ধি হয় (ড্রাই) ; চক্ষুর চতুঃস্পার্শ্ববর্তী স্থান এবং চক্ষুর পাতা শক্ত হয় বা উহা নোমান বায় না (রাষ্টক্স) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, বাহা ডাইন পার্শ্বই অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে এবং বাহার দরুণ আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনার উদ্ভেদ হয় ; হৃৎপিণ্ডের বাতরোগে মুখাকৃতি অত্যন্ত উবেগযুক্ত ।

পাকস্থলী । বমনোবেগ ; চক্ষে যেন সমুদয় বস্তুই কাল দেখায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে চাপা রোধ ; উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হেতু ঝাঁসকষ্ট এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের বেদনার জ্বর বেদনা ; পাকস্থলীর মধ্যে চাপাবোধ, উপুড় হইয়া বাকিয়া বসিলে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং সোজা হইয়া বসিলে বাহার উপশম হয় ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন পাকস্থলীর নিয়মিক দিয়া কোন পদার্থ চৈলিয়া বাহির হইবে ; পাকস্থলীতে খিল ধরার জ্বর বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদগার দ্বারা দূষিতবায়ু নিঃসরণ, হৃৎস্পন্দন, পাকস্থলীতে বেদনা এবং বমন ও হৃৎস্নায়ুশূল বা হৃৎবেদনা ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র আলবুমেনযুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পা ইত্যাদি নিয়মকে বেদনা ।

শ্বাসযন্ত্র । বায়ুনলের মধ্যে স্ফুড় স্ফুড় করা ; ঝাঁসকষ্ট ; বুকের নিম্ন ভাগে স্ফুটী বিধানের জ্বর বেদনা ; বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগ দিয়া হৃৎকাহ্নি পর্য্যন্ত খোঁচাবিবার জ্বর বেদনা (কালী-কার্ক) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যতে বেদনা (একন্, রাষ্টক্স) ; ঝাঁসকষ্ট এবং বুকে বেদনা ; হৃৎস্নায়ুশূল বা হৃৎবেদনা (Angina Pectoris) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের উবেগ ও ঝাঁসকষ্ট (একন্, আর্দ) ; হৃৎপ্রদেশে বাতের বেদনার জ্বর বেদনা (রাষ্টক্স, স্পাইজেল) ; নাড়ী মুহুগতি বিশিষ্ট এবং দুর্বল, অনিয়মিত প্রতিবিশিষ্ট, ক্ষতগামী, কিন্তু দুর্বল ; হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি, হৃৎকপাটের অপ্রচুরতা

অথবা বাত রোগের পর উহা পুরু হওয়া; হৃৎপিণ্ড হইতে বাম বক্ষ পর্যন্ত
খোঁচাবিধার স্থায় বেদনা, বাহ্যিক দ্রবণ হৃৎপিণ্ডে ভ্রমণক দ্রব্দপানির
উদ্বেক হয়; হৃৎপিণ্ডের বাতরোগ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ। বাম বাহতে বেদনা (একন্, রাস্ট্র); বাম-
বাহতে চাপাবোধ; সন্ধিগুলি ঠিক, লালবর্ণ এবং শীত; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে
বাতের বেদনা; কুঁচ্কির নিকটবর্তী সন্ধি হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত শ্বা-
শুলের স্থায় বেদনা।

ব্যবহার। হৃৎপিণ্ডের অস্থখ; বাতরোগ; হৃদস্তাবরক বিলীপ্রদাহ
(Endocarditis); হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি; হৃৎকপাটের অস্থখ; পেশীবাত;
শ্বাশূল ইত্যাদি অস্থখে ক্যালমিয়া ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় শরীরে বাতের বেদনার ন্যায়
বেদনা; উপুড় হইয়া বসিয়া থাকিলে বেদনাদির বৃদ্ধি, অথচ ঐ অবস্থায়ই
থাকিতে ইচ্ছা হয়; সোজা হইয়া বসিলে বেদনাদির উপশম; প্রথম
রাত্রিতে শয়ন করার পর বেদনাদির বৃদ্ধি; বেদনাদি অনিশ্চিত সময়ের
অন্ত বাপিয়া থাকে এবং কখন যে উহার উপশম হয় তাহারও নিশ্চয়তা
থাকে না; শ্বাশূলের পর আক্রান্ত স্থানে অবশবোধ; বাতের বেদনা ভক্ষ
হইলেও উহার সঙ্গে অর বর্তমান থাকে না ইত্যাদি ক্যালমিয়ার কতকগুলি
বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। একোনাইট, বেলাডোনা, ডিজিটালিস,
ছিপার সাল্ফিউরিস, স্পাইজেলিয়া, রাস্ট্র ইত্যাদির কার্যের সঙ্গে
ক্যালমিয়ার কার্যের সাদৃশ্য আছে। ডাক্তার হেরিং (Dr. Hering) বলেন
যে, হৃৎপিণ্ডের অস্থখে স্পাইজেলিয়ার পর ক্যালমিয়া ব্যবহারে বিশেষ
উপকার দর্শে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট, বেলাডোনা।

ডাইলুশন বিচার। ডাক্তার বেজ (Dr. Bayes) ৩য় দশমিক
ক্রমের আরোক ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। বাত জনিত হৃদস্তাবরক
বিলী প্রদাহে (Rheumatic Endocarditis) যেক্ষ এই ঔষধের মূল
আরোক, ৩ ছোঁটা মাত্র ব্যবহার করিয়া একটি রোগীর চিকিৎসার বিশেষ

ফল পাইয়াছেন । ২য় এবং ৩য় ক্রমের আরোক দ্বারা কোনও উপকার না পাওয়াতেই মূল আরোক উক্ত মাত্রায় ব্যবহার করা হইয়াছিল ।

ল্যাক্তান্থিস, টিক্টোরিয়া,—ল্যাকন্যাঙ্ক

(LACHNANTHES TINCTORIA, -LACHNANTH.)

আমেরিকার জলা বা কাদাবিশিষ্ট স্থানে এই গাছ জন্মে । কাঁচা গাছ দিয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেরূকা মজ্জার উপর ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায় । মস্তিষ্কের জ্ঞান উৎপাদনের সহায়কারী অংশ (Sensorium) এবং পেশীতেই ইহার কার্য অধিক প্রবল, যাহার দরুণ রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মূল । সামান্ত কারণেই চটিয়া যাওয়া ; প্রলাপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু উজ্জল (বেল, ট্রায়মন্) ।

মস্তক । মাথার, বিশেষতঃ কপালে, ঘৃণ্ণুশ্বে বেদনা; কপালে ছিঁড়িয়া ফেলার স্থায় বেদনা যাহা বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া ডাইনদিকে বিস্তৃত হয় ; মাথার হাড় স্পর্শ করিলেই বেদনার উল্লেখ হয় ; মাথার উপরিভাগ ঘন স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছে এবং উপরের দিকে বৃদ্ধি হইতেছে এরূপ অনুভূত হয় ।

চক্ষু । চক্ষুর সম্মুখে ঘেন হরিজীবর্ণের বা সাদা দাগ তাসে ; চক্ষু উজ্জল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ (বেল, ট্রায়মন্) ; বাগির কণাদি প্রবিষ্ট হইলে, বেরূপ হয়, চক্ষে সেকরূপ চাপাবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে সাদা মেঘার সঞ্চার ; চক্ষুর উপরের পাতার স্পন্দন (আগারিকান্), চক্ষু শক্ত করিয়া বুজিলে বাহ্যিক বৃদ্ধি হয় ; চক্ষে ঝাপসা দেখা ।

কর্ণ । কানের মধ্যে চুলকানি বা কুটকুটানি বা হুড়হুড়ী, হাতের আঙ্গুল কানের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে বাহ্যিক উপশম হয় এবং আঙ্গুল

বাহির করিয়া আনিলে বাহার পুনরায় বৃদ্ধি হয় ; কানের মধ্যে গানের জার শব্দ হওয়া ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে চক্রাকারে লাল দাগ পড়ে (সাল্‌মোনিয়া) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ ও চক্ষু উজ্জল (বেল) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে । সমুদয় দাঁতের গোড়ার বেদনা, উষ্ণ প্ররোগে বাহার বৃদ্ধি হয় । গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কণহারা কাশি ; আহারবহা গলনালীর উপরিভাগে ক্ষীত হওয়ার জায় অহুত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাড় শব্দ হয় বা উহা নোয়ান যার না ও মাথা একদিকে বাঁকিয়া পড়ে ; ডিপথিরিয়া (Diphtheria) ; গলার মধ্যে শুষ্কবোধ এবং তৎপর উহাতে টাটানি বা বেদনা ।

পাকস্থলী এবং উদর । মাংসে অরুচি (অর্বিকা, কার্কো-বেল্‌, গ্রাক্‌, পাল্‌স্‌) । দূষিত বারুর সঞ্চায় হইলে বেরুপ হয়, উদরে অনবরত সেক্রপ গড়্‌, গড়্‌, কল কল শব্দ হওয়া ও পেট গুলিয়া উঠা (আলোজ্‌, লাইকোপ্‌) ।

মল এবং মলদ্বার । বারবার মলত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহবার দিয়া প্রচুর পরিমাণে দূষিত বারু নিঃসরণ ।

শ্বাসযন্ত্র । শুষ্ককাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে বেদনা ; বৃকে ডাইন স্তন এবং কণ্ঠস্থির নীচে স্তীর্ষিধানের জায় বেদনা ; বৃকে উক্সাহুতব (একন্‌, আর্স্‌, সাল্‌মোনিয়া) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । নাড়ী মুহু এবং অনিয়মিত গতিবিশিষ্ট (ডিজিট) ; হৃৎপ্রদেশে উক্সাহুতব ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবা শব্দ হয় বা উহা নোয়ান যার না (রাস্টক্‌) ; অস্থি স্থান ভ্রষ্ট হইলে বেরুপ হয়, ষাড়ে সেক্রপ বেদনা বোধ ; কোমর এবং শুষ্ক ধারের ঠিক উপরিভাগে জ্বালাহুতব ।

চর্ম্ম । শরীরের নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণের জায় ক্ষুদ্রী (গ্রাক্‌) ; উরুদেশ, পা, পায়ের পাতা, বাহু ইত্যাদিতে চুলকানি, কুট্‌কুটানি এবং হস্ত কুটানের জায় অহুত হয় (একন্‌, আর্স্‌, আটিকা ইউরেন্স্‌) ।

নিদ্রা । নিদ্রাপূর্ণতা, অস্থির বা ভয় নিদ্রা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টদায়ক স্বপ্ন দেখা ; সহজৈবু না হওয়া ।

জ্বর । গার একবার পরমবোধ এবং উহার পরক্ষণই শীতবোধ ; পায়ের পাতা এবং হাতের তালুতে জ্বালাবোধ (সাল্‌ফ্‌) ; শরীর গরম এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল লালবর্ণ ; উষ্ণাবস্থার পর উভয় গাল চক্রাকারে লালবর্ণ হয়, ডাইন গালেই যাহা অধিক অমুভূত হয় (সানুনেরিরা) ; প্রচুর পরিমাণে ঘৰ্ম, বিশেষতঃ রাত্রি হুই প্রহরের পর ; শীতলাবস্থায় চৰ্ম্ম আর্দ্র এবং চট্‌চটিয়া আঠা ।

ব্যবহার । ডিপথিরিয়া ; মস্তিষ্ক এবং কসেৰুকা মৰ্জ্জাপ্রাণহ ; জীবাতে বেদনা বা শক্ৰ জীবা (Wry-neck) ইত্যাদি অন্থে ল্যাক্সাহিস্ ব্যবহার্য্য । লণ্ডন নিবাসী ডাক্তার আলাবোন্ (Dr. Alabone) এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া যক্ষাক্রান্তের চিকিৎসায় বিশেষ কল পাইয়াছেন এবং ডাক্তার এইচ্‌, নান্‌কিবেল্ (Dr. H. Nankivell) তাঁহার উক্ত মতের পোষকতা করিয়াছেন । ডাক্তার নান্‌কিবেল্ বলেন “যে প্রকার যক্ষাক্রান্তের দ্বিতীয় এবং তৃতীয়াবস্থায় ফুফুস অধিক পরিমাণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ধ্বংসকার্য্য কিছুকালের জন্ত স্থগিত থাকে, এবং বৈকালে বা সন্ধ্যার সময় শরীরের সস্তাপ 100.5° ফারণ্‌হিট্‌ ডিগ্রীর অধিক না হয়, সে প্রকার যক্ষাক্রান্তে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে ।” তিনি এই ঔষধের মূল আরোক ৩ হইতে ৫ কোঁটা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আগারিকাশ্, বেলাডোনা, সিকুটা, সিমিসিকিউগা, ক্যান্‌ফার, হায়োসায়েমাস্, ল্যাকেসিস্, ট্রামোনিয়াম্ ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সঙ্গে ল্যাক্সাহিসের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ইহার মূল আরোকই ১ হইতে ৫ কোঁটা মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধ লেখকের কোনও অভিজ্ঞতা নাই, কারণ, তিনি উহা ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ।

ল্যাক্টুকা বিরোগা ।

(LACTUCA VIROSA, —LACT. VIR.)

এই গাছের সমুদয় অংশ কাঁচা অবস্থায় সংগ্রহ করিয়া বথানি নিম্নে ২০-
ডিগ্রী ওয়ার প্রেক্সিটিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং মায়ু মণ্ডলীর উপর ইহার কার্য্য
অতি প্রবল । ইহা নাড়ীর গতি হ্রাস করে এবং তদ্রূপ ঘূর্ণ হয় । আফিমের
ভ্রায় ইহা মস্তিষ্ক ক্রিয়া রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়াকে উত্তেজিত করে না । শরীরের
অত্যন্ত অংশেও ইহার কার্য্য আছে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সর্ব্বদা চটয়া থাকি; চিড়্ চিড়্, থিট্ থিট্ করা; কোন প্রকার
মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা; মন গোলমেলে হইয়া যায়; কোন বিষয়ে চিন্তা
করিতে অশক্তি (জেন্স, নাজ্-বন্, ফন্-আস) ।

মস্তক । মাথার গোলমেলে বোধ; মাথাঘোরা; ঘূর্ণ ঘূর্ণে মাথাধরা ।

চক্ষু । চক্ষুর তারি অত্যন্ত বিস্তৃত (বেল্, হায়োস্, ট্রানন্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । পাকস্থলী যেন পশ্চাৎদিকে আকৃষ্ট এবং
তদ্রূপ পাকস্থলীতে সামান্য বেদনা, যাহা প্রচাপনে বৃদ্ধি হয়; পাকস্থলীতে
উষ্ণাহত্ব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ এবং গলার মধ্যে জল উঠা,
জিহবার গোড়ার কোন প্রকারের স্বাদের অভাব, যাহার পর পাকস্থলীতে
এবং গলার মধ্যে বরফের ভ্রায় ঠাণ্ডাবোধ হয়; পাকস্থলীর মধ্যে অঁটাবোধ
এবং তৎপর হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত উদ্বেগ । উদরে পূর্ণবোধ, বিশেষতঃ ডাইন
দিকে, যাহার দক্ষণ নিম্নাঙ্গ প্রস্থানের ব্যাঘাত জন্মে এবং উদগারে বা
হার দিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণে যাহার উপশম হয় ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রের অতিরিক্ত সঞ্চার (আম্, ফন্-আস) ।

শ্বসিয়ন্ত্র । অনবরত আক্ষেপিক কাশি, যাহার দক্ষণ মনে হয় যেন
বুক ফাটিয়া যাইবে, মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে হৃৎস্রষ্টীর দক্ষণ যাহার উত্তেক
হয় এবং গলার মধ্যে ফাঁপড় করার ভ্রায় বোধ হওয়ার দক্ষণ যাহার উত্তেক
হয়; মধ্যে মধ্যে কণ্ঠহারী শুষ্ককাশি, যাহার দক্ষণ মাথার পশ্চাৎভাগ এবং

বুক ঝাকিয়া উঠে; বৃক্ক অঁটাবোধ হওয়ার দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং তদরূপ অত্যন্ত কষ্টান্বিত হয় (একন); বৃক্কের নানা স্থানে খিলধরা বা চাপিয়া ধরার ভায়ে বেদনা; বৃক্কের বাম পার্শ্বের উপরিভাগে চিন্তিনে, ঘুশ্‌ঘুশে এবং বাটিয়া ধরার ভায়ে বেদনা; বাম পার্শ্বের খাট পাজরার হাড়ের নীচে স্ফুটী বিধানের স্তায় প্রথর বেদনা ।

নিদ্রা । নিদ্রাবেশ; তৃপ্তি জনক নিদ্রা; স্নাত্তিতে অজ্ঞানবৎ নিদ্রা; স্নাত্তিতে অস্থির নিদ্রা ।

ব্যবহার । ইহা হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসায় কম ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার আলেন্ (Dr. Allen) বলেন, অনবরত আক্কেপিক কাশি, যাহার দরুণ মনে হয় বেন বুক ফাটিয়া যাইবে; শ্বসনর পশ্চাৎভাগে হুড়্‌হুড়ী বা কুট্‌কুটানি বা গলার মধ্যে ফাঁপড় করার ভায়ে অস্থিত হওয়ার দরুণ এই কাশির উদ্রেক হইলে ল্যাক্টুকা বিরোসা বিশেষ উপকারী । ডাক্তার হিউজেস (Dr. Hughes) মতে ইহা বক্ত এবং ফুফুসের কোন কোন প্রকার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, মস্তিষ্কের দুর্বলতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ বা ঘুমের অত্যন্ত ইচ্ছা ইত্যাদি অস্থে ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ; শরীরে অস্বাভাবিক রক্তের হাল্‌কাবোধ; সামান্য কল্প ইত্যাদি এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ওপিয়াম্, কফিয়া ।

ডাইলুশন বিচার । এই ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কিছুই স্থিরকৃত হয় নাই ।

লরোসিরেসাম্ প্রুনাস্, -লরোস্

(LAUROCERASUS PRUNUS, -LAUROC.)

পারস্ত দেশ এবং আসিয়া মাইনরে এই গাছ জন্মে । পরিপক্ব কাঁচা পাতা যথা নিয়মে প্রফ্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেরিকা মজ্জার উপর ইহার কার্য অতি প্রবল । ইহা হাইড্রোসারেনিক্ অ্যাপিডের জ্বাৰ মস্তিষ্কের পক্ষা-
ঘাত উৎপাদন করে ।

সাধারণ প্রাকৃতির লক্ষণ ।

মন । অচেতনতা এবং স্পর্শ জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিনাশ (ওপিয়াম) ।

মস্তক । অবসন্নতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ঘোরা ; মাথার সমুদয় অংশেই অবসন্নকারক বেদনা ; কপালে ঠাণ্ডা বোধ (অর্গিকা) ॥ মাথার উপরিভাগে ঠাণ্ডাবোধ (ক্যাক্-কার্ক, কস), বাহার দক্ষণ মনে হয় যেন মাথায় ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে এবং বাহ্য গ্রীবায় মধ্য দিয়া নিম্নদিকে পৃষ্ঠদেশে যেন নামিতেছে বসিয়া অহুত হয় ।

চক্ষু । একখানি অত্যন্ত পাতলা কাপড়ের মধ্য দিয়া তাকাইলে ঘেরাপ হয়, চক্ষে সরুপ কাপ্সা দেখা (কষ্ট, হারোস্, কস, মার্ক্, পিটোল্, সাংল্ফ) ; চক্ষু বোলা এবং স্থির ভাব বিশিষ্ট, বিকৃত (বেল্, হারোস্, ট্রায়মন্) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল নীলের আভাযুক্ত, ধূসরের আভাযুক্ত হরিজ্ঞা বর্ণ এবং যেন বসিয়া যায় ; মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন এবং আক্ষেপ (সিকুটা) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁতলাগা (বেল্, সিকুটা, হারোস্, ইগ্নেন্স, নাক্স-বন্, ইনাস্) ; মুখে কেণাউটা (সিকুটা, ককিউল্, স্ক্রাম্, হারোস্, নেজা) ; বাকরোধ (ডাক্, জেল্, কষ্ট, নেজা) । কোন জ্বাৰ গিলিতে অশক্তি (বেল্, হারোস্, ট্রায়মন্) ; গলার মধ্য এবং আহাৰ বহা গলনালীতে আক্ষেপিক সঙ্কোচন (বেল্, হারোস্, ট্রায়মন্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । উদরস্থ আহাৰ জ্বাৰাদি বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি । নাভি হইতে কোমরের পশ্চাৎদেশে ডেগার জ্বাৰ কোন একটা ভারি পদার্থ হঠাৎ পড়ার জ্বাৰ অহুত হয়, কথাবন্দা বা কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রমের দক্ষণ বাহ্য উৎপন্ন হয় ।

শ্বাসযন্ত্র । বৃক্কের আক্ষেপিক রকমের অস্থ (ইগ্নেন্স) ; শ্বাসকষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যেন ছুর যেন নিশ্বাসে ফুফুস যথোচিতরূপে বিকৃত হইবে না (আসাকিটিডা, ক্রোটন্) ; নিশ্বাস প্রস্থানে অত্যন্ত কষ্টাশ্রুতব এবং

ভদ্ররূপ ফাঁপড়বোঁস ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যস্থিত পর্দা। সমূহ শুকাইয়া গেলে বেরূপ হয়, বুকের মধ্যে সেরূপ বশ্শবশ্ শব্দ হওয়া ; হৃৎপ্রদেশে স্থলীবিধানের ভ্রায় বেদনা (ক্যাল্‌ম্, ক্যালী-কার্ক্) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী যুগ্মগতি বিশিষ্ট (ডিক্টিট্, লাক্সাহ্) ।

নিদ্রা। নাকে গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ঘোরনিদ্রা ; নিত্রাগুতা (আস্, ওপিয়াম্, সাল্‌ক্) ।

ব্যবহার । সংজ্ঞাশ রোগ ; বিশেষ বিশেষ ইন্ধিরের পক্ষাঘাত ; জননেন্ধিরের পক্ষাঘাত ; হৃৎকূপের পক্ষাঘাত ; হাত পায়ের পক্ষাঘাত ; কোরিয়া (Chorea) ভ্রায় আক্ষেপ ; আক্ষেপের দরুণ আক্রান্ত অঙ্গের পর্যায় ক্রমে সন্ধোচন এবং বিস্তৃতি (Clonic spasms) ; মূগীরোগ ইত্যাদি-অস্থখে লরোসিরেসাস্ ব্যবহার্য্য। যে প্রকার ওলাউঠাতে রোগীর শরীর নীল বর্ণ হয়, ঝাঁস কুচ্ছ হয় এবং পক্ষাঘাতের লক্ষণাদি দৃষ্ট হয়, ডাক্তার-জারের (Dr. Jahr) মতে সে প্রকার ওলাউঠাতে লরোসিরেসাস্ ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । জীবনীশক্তির হ্রাস এবং প্রতি-ক্রিয়ার অভাব (ক্যাপ্‌, কার্কো-বেজ্) ; অস্থখের বেদনা, যন্ত্রণাদি রোগী বড় টের পায় না ; সমুদয় শক্তির অতি শীঘ্র-শীঘ্র হ্রাস (আস্, ক্যাম্‌ফার, সিকেল্‌ কণ্টাম্) ইত্যাদি এই ঔষধের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। ডাক্তার গারেঞ্জি (Dr. Guerenzy) বলেন, শৈশবাবস্থার অস্থখে সামান্য নড়াচড়াতেই রোগীর শরীর নীল বর্ণ হওয়া বা নীলবর্ণের ভাব বুদ্ধি হওয়া, অথবা পাকস্থলী এবং অঙ্গের অস্থখে গিলিবার সময় আহারবহা গলনালীতে গড়্-গড়্ শব্দ হওয়া লরোসিরেসাসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ।

সমন্বিত বিশিষ্ট ঔষধ । ব্যারাইটা কার্কোনিকা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্কোনিকা, হাইড্রোসারেনিক্‌ আসিড্‌, লাইকোপডিয়াম্‌, নাক্স-বমিকা, বেলাডোনা, ওপিয়াম্‌, ফক্ষরাস্‌, পাল্‌মেটিল্লা, রাস্‌টেক্‌, সিমিয়া, সাল্‌ফার, বিরেট্রাম্‌ আল্‌বাম্‌ ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সঙ্গে লরোসিরেসাসের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্সার, কফিরা, ইলিকাক, ওপিয়াম ।
অধিক মাত্রায় লরোবিরেসাম্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে আমোনিরাম্ এবং
কফির গাঢ় কাত সেবা ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য়, ৬ষ্ঠ বা ১২ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত
হইয়া থাকে ।

লেপ্টাণ্ড্রা, -লেপ্ট

(LEPTANDRA, -LEPT.)

আমেরিকার ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সের সমুদয় স্থানেই এই গাছ জন্মে ।
কাঁচা শিকড় যথা নিয়মে প্রস্তুত্ স্পিরিটে ডিজাইরা ইহার মূল আরোক
প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহার শুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে । শুঁড়াকে লেপ্টা-
ণ্ড্রিন (Leptandrin) বলে । যথা নিয়মে জুগার অব্ দিল্কে মিশাইরা
ইহার মিশ্র শুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ডাক্তার হেল্ (Dr Hale) বলেন
কাঁচা শিকড়ে গাছের সমুদয় অংশের গুণই থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । বহুত এবং অল্পের উপরই ইহার বিশেষ কার্য
দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দ্রবণ উহার নিঃসরণ ক্ষতির কার্যের বৃদ্ধি হয় ।
প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত দুর্বলযুক্ত আল্ কাতরার ভায় কাল গোলাপীর ভায়
ভেদ এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।
পিত্তাধিক্য হেতু শিরঃশীতা এবং পিত্তের বিকৃতিবস্থার দ্রবণ যে প্রকার
অস্বাধ হয়, তাহাকে যদি উক্ত প্রকারের কাল্‌চে ভেদ হয়, তবে এই ঔষধ
বিশেষ উপকারী । একতাই পুরাতন আত্মারের উদরাময় এবং আমাশয়
রোগে এই ঔষধ প্রয়োগে কখন কখন উপকার পাওয়া যায় । ব্রাইওনিয়া,
আইরিস্, পডোফিলাম্, চারনা এবং আসিনিকের কার্যের সঙ্গে লেপ্টাণ্ড্রার
কার্যের সাদৃশ্য আছে । ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোকই সচরাচর
অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন সময় লেপ্টাণ্ড্রিনের ১ম, ২য়
বা ৩য় ক্রমের শুঁড়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

লিলিয়াম টাইগ্রিনাম,-লিলিয়াম

(LILIAM TIGRINUM,-LIL.-TIG.)

চীন এবং জাপান দেশে এই গাছ জন্মে। অনেক সময় বাগানেও এই গাছ রোপন করা হয়। উহার ফুল এবং বিচি যথা নিম্নে ২০° ডিগ্রী ওয়ার এক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। জী-জননেন্দ্রিয় এবং হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দ্রুত জরায়ুর উত্তেজনা, উহাতে রক্তাধিকা বা রক্তাবরোধ এবং উহাতে কতক পরিমাণে পুরাতন আকারের (Sub-acu'a) প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু নানা প্রকারে স্থানান্তরিত হয়। গৌণ কার্য (Reflex action) দ্বারা ইহা হৃৎপিণ্ডের কার্যের অবসরতা উৎপাদন করিয়া হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনার লক্ষণ, হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি অস্বাভাবিক উৎপাদন করিয়া থাকে। জরায়ু যেন নীচের দিকে যোনিদ্বার দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে জরায়ুতে একরূপ অস্বাভাবিক হওয়া এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মানসিক অবসরতা; কান্দিবার ইচ্ছা, ভীতি এবং সমুদ্র বিষয়েই আশঙ্কা (নাঙ্গ-মক্, পাল্‌স্, কস্); রোগী (জীলোক) তাহার মুক্তির বিষয় অনবরত ভাবিয়া সর্বদা অস্থির থাকে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর অস্বাভাবিকতা; কোন বিশেষ কর্তব্য কর্ম করিতে হইলে স্বেচ্ছা হয়, সর্বদা স্বেচ্ছা ভাড়াভাড়া করা এবং উক্ত কার্য করিতে অক্ষম হওয়া; সর্বদা অভিযোগ দেওয়া, মারা এবং অসুখ বিষয়ে চিন্তা করার ইচ্ছা ও এই প্রকার মানসিক অবস্থা হইলেই জরায়ুর উত্তেজনা কমিয়া যায়।

মস্তক। মাথা ধরা, বিশেষতঃ উহা যদি জরায়ুর অস্বাভাবিকতা দ্বারা (কলোক্, সিহিসিক্); কপালে, চক্ষুর ঠিক উপরিভাগে ঘূর্ণঘূর্ণ বেদনা।

চক্ষু। নিকটবর্তী বস্তু দেখিবার শক্তির হ্রাস বা অভাব; চক্ষুর হাইপার মিট্রোপিয়া (Hypermetropia) নামক রোগ।

পাকস্থলী এবং উদর। বমনোন্মেষ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে

জ্যাক ভুলিবার সময় গলা দিয়া প্লেয়া নির্মম; জ্বা শূভতা (আলান্, আস্, ক্যাক্-কার্ক্, চাবনা, নাক্স-মক্); মাংস খাওয়ার অভ্যস্ত ইচ্ছা; পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্যে খালি খালি বোধ (ইগ্নেন্দ, হাইড্রাট্, সিপিরা)। উদর ক্ষীণ এবং বিস্তৃত (ক্যাক্-কার্ক্, চাবনা, হাইকোপ্, নাক্স-বন্); উদরের মধ্যস্থিত সমুদ্র বজ্র যেন নিম্নের দিকে টানিয়া বা কপিরা ধরিয়াছে একরূপ অসুস্থ হইয়া, বাহ্য বৃকের মধ্যে যন্ত্রাদি পর্য্যন্তও যেন বিস্তৃত হইয়া এবং বাহ্য দক্ষণ রোগী তাহার উদর উপরের দিকে টেলিয়া ধরিয়া রাখিতে বাধ্য হয় (বেল্, প্রাটিনা, সিপিরা); যেন উদরায়ন হইবে একরূপ অসুস্থ হইয়া (আলোজ্); প্রস্রাব করার সময়ও অনেক সময় গুহ্বার দিয়া মল বাহির হইয়া পড়ে।

মল এবং মলদ্বার।* মলদ্বারে অভ্যস্ত চাপাবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারবার বাহ্যে যাওয়ার ইচ্ছা; প্রাতঃকালে উদরায়ন (আলোজ্, কমেক্স, সাল্ফ্); মল তরল, পিত্তবৃত্ত (পডোক্); মল কাল্চে, দুর্গন্ধযুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যস্ত বাহ্যের বেগ, বাহ্য দক্ষণ রোগী এক মিনিটও বাহ্যে না বাইরা থাকিতে পারে না; দাক্তের পূর্বে পেট কামড়ানী এবং কষ্টদায়ক কৌণ্ডাড়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্ব চাপাবোধ; দাক্তের পর গুহ্বদ্বারে জ্বালা এবং চিড়িকমারা (আস্, ক্যাহ্); কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রযন্ত্র। দিনের বেলা বারবার প্রস্রাব করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রনাগীতে অভ্যস্ত জ্বালা এবং চিড়িকমারা (ক্যাহ্, ক্যানাবিন্-স্টাট্); সূত্রাধারে অনবরত চাপাবোধ; অনবরত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে মাত্র কএক ফোঁটা মূত্র নির্গল হয়; মূত্রত্যাগের পর মূত্রনাগীতে জ্বালা এবং চিড়িকমারা (একন্, ক্যাহ্)।

জননেন্দ্রিয়। স্ত্রীলোকের জরায়ু প্রদেশে ভারি এবং চাপা বোধ, বাহ্য দক্ষণ যেন হয় জরায়ু বোধে যাঁহা কিছু আছে তাহা যেন সমুদ্রই যোনিদ্বার দিয়া নিম্ন দিকে টেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে (বেল্, নাক্স-মক্, প্রাটিনা, সিপিরা), হাত দিয়া যোনি চাপিয়া ধরিলে বাহ্য উপশম হয়; ডিম্বকোষ প্রদেশে অভ্যস্ত প্রথর বা তীক্ষ্ণ বেদনা (বেল্, সিমিসিক্); জরায়ুতে স্রাবশূন্যের ভার বেদনা, বাহ্য দক্ষণ রোগী তলপেট স্পর্শও করিতে দেয়

না এবং বাহ্যিক দরুণ পেটের উপর গায়ের কাপড়ের ভার বা সামান্য ঝাঁক নিও সহ্য হয় না ; জরায়ু সমুখপানে সরিয়া বা বাঁকিয়া পড়ে ; নিম্নদিকে সজোরে ঠেলিয়া নাহিলে ঘেঁরুপ হয়, জরায়ুতে সেকরূপ অহুত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাম ডিম্বকোষ এবং বাম স্তনে বেদনা ; যোনিদ্বারে অত্যন্ত চুলকানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানে পূর্ণবোধ ; বাম ডিম্বকোষ প্রদেশে চল ফুটানের জ্বাশ বেদনা বা যাতনা ; শ্বেতপ্রদব এবং তন্দ্ররূপ উজ্জল হরিদ্রা, জালা উৎপাদক এবং ক্ষতকারক ক্লেদ নিঃসরণ (আলাব, আর্স, ক্রিয়াজ্) বাহ্য কাপড়ে লাগিয়া শুকাইলে কটাবর্ণ হয় ।

বক্ষ এবং হৃৎপিণ্ড । হৃৎপ্রদেশে চাপিয়া ধরার জ্বাশ ঘৃণ, ঘৃণে বেদনা (আরোড্, ক্যাক্ট্) ; বুকের বাম পার্শ্বে অত্যন্ত ভীক বা প্রধর বেদনা (ক্রিয়াজ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ধড়ফড়ানী (স্পাইজেল্) ; হৃৎপিণ্ডের মধ্যে নোচড়াইয়া ধরার জ্বাশ বেদনা (আর্গিকা, ক্যাক্ট্) ; অথবা হৃৎপিণ্ডে একবার ঘাটিয়া ধরা এবং একবার শিথিল হওয়ার জ্বাশ যাতনা ; হৃৎপিণ্ডের ধড়ফড়ানি বা হৃৎস্পন্দন (নেট্রাম্-মিউর) ।

পৃষ্ঠদেশ । শুষ্ক দ্বারের ঠিক উপরিভাগের হাড়ে ঘৃণ, ঘৃণে বেদনা (ইক্সুলাস) ; শুষ্ক দ্বারের ঠিক উপরিভাগে বেন উপর দিকে ঠেলিয়া উঠার জ্বাশ অহুত হয় ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠাণ্ডা এবং চট্‌চটিয়া আঁঠা বাহা মন উত্তেজিত হইলেই অধিক হয় ; হাত পায়ের পাতার তালুতে আগাবোধ ; ডাইন কুঁচ্কি বা উকুর সন্ধিতে বেদনা বাহা উক্কেণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; পক্ষাঘাতে ঘেঁরুপ হয়, হাত এবং হাতের আঙ্গুলে সেকরূপ কুট্‌কুটানি ।

ব্যবহার । জীলোকের ডিম্বকোষের উত্তেজনা, প্রদাহ অথবা উহাতে দ্রাব্যগুলের জ্বাশ বেদনা ; হিষ্টিরিয়া ; জরায়ুর কতক পরিমাণে পুরাতন (Sub-acute) প্রদাহ ; জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়া বা সরিয়া পড়া ; জরায়ু সমুখ পানে সরিয়া বা বাঁকিয়া পড়া ; জরায়ু পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া বা সরিয়া ও নোচড়াইয়া পড়া ; শ্বেতপ্রদব ; হৃৎপিণ্ডের স্নায়বিক অহুত ; উদরাময় ; চকুর পাতার স্পন্দন ইত্যাদি অহুত নিম্নলিখিত ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । দ্রবর্ণতা, শরীর কম্পন ; চলিলে

বেদনার বৃদ্ধি, অথচ চলা বন্ধ করিলে বেদনা এত অসহ্য হইয়া পড়ে যে উহার দরুণ রোগী (পুরুষ) পুনরায় চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় ; শরীরের কোন কোন স্থানে বেদনা ; শরীরের স্থানে স্থানে স্থান পরিবর্তক বেদনা (পাল্‌স্‌) ; শরীরের স্থানে স্থানে দপ্‌দপানি, যাহার দরুণ মনে হয় যেন সমুদ্র রক্তবহা নাগীতেই দপ্‌দপ্‌ কবিতোছে ; যন্ত্রাদির স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য করার শক্তিহীন হওয়ার দরুণ রাজিতে যাতনাদির বৃদ্ধি এবং দিনের বেলা, বিস্তৃত বায়ুতে, সর্ব্বদা কাজ কর্ণে নিযুক্ত থাকিলে এবং উষ্ণ ঘরে অল্পখের উপশম ; জরায়ু নিম্নদিকে যোনি দ্বারা দিয়া ঠেলিয়া নামিতেছে একরূপ অসহ্য হওয়া এবং তদরুণ যোনি চাপিয়া ধরিতে বাধ্য হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বকোষ, জরায়ু এবং যোনি দ্বারাদির ক্ষীণতা ও বেদনা লিলিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । লিলিয়ামের মানসিক লক্ষণের সঙ্গে প্রাটিনার লক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য আছে এবং জরায়ুর উপর ইহার কার্য্যের সঙ্গে হেলোনিয়াসের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন ইহার কার্য্যের সঙ্গে ক্যাফটাস্‌, ক্যাস্টারিস্‌, সিমিসিকিউগা, নাক্স-বমিকা, পডোফিলাম্‌, পাল্‌সেটিল্লা, সিসিয়া এবং স্পাইজেলিয়ার্‌ কার্য্যও অনেক সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । হেলোনিয়াস্‌, নাক্স-বমিকা ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম এবং ২য় দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের মূল আরোকও ১ ফোঁটা মাত্রাঙ্গ, ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ।

লোবিলিয়া ইন্ফ্লোটা, -(ভারতবর্ষীয় তামাকু, -লোবিলিয়া

(LOBELIA INFLATA, -(INDIAN TOBACCO), -LOB-INF.)

এই গাছের সমুদ্র অংশ যথানিয়মে প্রফ্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । আবার কেহ কেহ ইহার শুকনা গাছ যথানিয়মে ইথারে (Ether) ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত কবিবার ব্যবস্থা

দিয়া থাকেন । আবার কেহ কেহ শুকনা গাছের শুঁড়ার সঙ্গে বধা নিয়মে সুগার অব্ মিক্ মিলাইয়া ইহার মিশ্র শুঁড়াও প্রস্তুত করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেরিকা মৰ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ু বিশেষতঃ নিউমোগ্যাস্ট্রিক স্নায়ু ব উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, বাহার দরুণ স্নায়ুগুলি অবসন্ন এবং শিথিল হয় এবং তদ্রূপ বৃক্কে কষ্টবোধ হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং গিলিবার ব্যাঘাত জন্মে ও উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরোর্ত্ত প্রদেশে কষ্টবোধ, বমনোদ্বেষ্ট এবং বমন হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা (ইগ্‌নেস্, লাইকোপ্, পাগ্‌স্) ; মূহূর্ত্তন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট (আস্‌) ।

মস্তক । মাথাধোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষ্ট (আলাম্, আন্টি-জুড্) ; কপালের চতুঃপার্শ্বেই চাপিয়া ধরার জ্বায় ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনা বা ভারিবোধ বাহা কপালের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে ; মাথার পশ্চাৎদেশের বামদিকে চাপিয়া ধরার জ্বায় বেদনা, রাত্রিতে এবং নড়াচড়াতে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখদিয়া প্রচুর পরিমাণে লাল পড়া (আয়োড্, আইরিস্, মাক্) ; মুখে বিস্ত্রী শ্বাদ, জিহবার অগ্রভাগ এবং গলার মধ্যের পশ্চাৎভাগেই বাহা অধিক অনুভূত হয় । মনে হয় যেন আহার বহা গলনালী নিম্নদিকে হইতে উপরদিকে সঞ্চুতিত হইয়া রাহিয়াছে ; মনে হয় যেন পাকস্থলীর মধ্যে ডেলার জ্বায় কোন পদার্থ লাগিয়া বা চাপিয়া রাহিয়াছে (বেল্, ল্যাক্) ।

পাকস্থলী । ক্ষুধাশূন্যতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে জ্বালাযুক্ত শ্বাদ (আস্‌) ; পাকস্থলীর অনুরোগ এবং পাকস্থলীর মধ্যের সঙ্কোচন ; উদগার দ্বারা বায়ু নিঃসরণ (কার্বো-বেজ্, চারনা, ফস্) ; অনবরত প্রবল বমনোদ্বেষ্ট (আন্টি-টার্ট্, ইপিকাক্, ডিজিট্) ; প্রাতঃকালে বমনোদ্বেষ্ট বাহা এক ঢোক জল গিলিলেই দূরীভূত হয় ; বমনোদ্বেষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে অকথ্য বেদনা, কষ্টানুভব ; বৃক্কে জ্বালা এবং উহার

সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়া অল উঠা ও পাকস্থলীতে কষ্টানুভব (আস্) ; উদরোচ্চ প্রদেশে হ্রস্বলবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে কাঁটা এবং কষ্টবোধ (আস্) ; পাকস্থলীতে আলবোধ (আস্, ক্যাঙ্ক-কার্ক, ক্যাঙ্ক, মেজিরিয়াম) ।

শ্বাসযন্ত্র । অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, বৃকে কাঁটাবোধ হওয়ার দরুণ বাহার উদ্রেক হয় (আস্, কস) ; শ্বাস কষ্ট ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রে গোলাপের ভায় লাল তলানী পড়ে এবং তলানীতে ইউরিক আসিডের ক্রিষ্টাল (Uric Acid Crystals) থাকে ।

ব্যবহার । অনেকানেক অন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষতঃ শ্বাস যন্ত্রের অন্ত্রের সঙ্গে, বমনোদেগ এবং বমন ; অসীর্ণ ; পাকস্থলীতে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন ; অন্ত্রের এক অংশ অত্র অংশে প্রবিষ্ট হইয়া লাগিয়া বা বদ্ধ হইয়া থাকা (Intussusception of the bowels) ; বদ্ধ অন্ত্র বৃদ্ধি (Incarcerated Hernia) ; শুষ্কহার এবং ঘোনিষায়ের মধ্যবর্তী স্থান (Perineum) এবং জরায়ুর মুখের কঠিনতা ; হৃপিংকফ বা কাশি ; বায়ুনল প্রদাহ ; আকস্মিক কাশি ; ফুংড়ী কাশি ; ইগানী কাশি ; হৃৎসারশূল বা হৃদযদনা (Angina Pectoris) ; হিষ্টিরিয়া ; বাতরোগ ; সবিরাম বা পাঙ্গা-জর ; বৃক জালা ; অগ্নরোগ ; ফুফুসের ক্ষুদ্র বায়ুনলীর বিস্তৃতি (Emphysema of the lungs) ইত্যাদি অন্ত্রের লোবিলিয়া ইন্ফেটা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত বলক্ষর এবং প্রান্তিবোধ ; মাথায় গরম এবং পূর্ণবোধ ও উহাতে কখন কখন কন্কনানি ; অনবরত কষ্টদায়ক স্বপ্ন দেখা ; চক্ষে এক বস্তুর সমুদয় অংশ দৃষ্ট না হইয়া কেবল কতক অংশ দৃষ্ট হয় ; গলায় মধ্যে চুলকানি, জালা এবং শুষ্কবোধ ; একটী কাঁটা মারিয়া রাখিলে বেক্রম হয়, পাকস্থলীর মধ্য দিয়া যেকোনও পর্য্যন্ত সেরূপ অনুভূত হয়, বাতা ডাইন এবং বামদিকে বিস্তৃত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মোচড়া-নের ভায় অনুভূত হয় ; ডাইন পাখের কৃত্রিম পাঁজরার ছাড়ের ধারে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে বেদনা, বাহা উদরোচ্চ প্রদেশের মধ্য দিয়া বাম কক্ষাস্থির চতুর্দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বেদনার আক্রমণের পর আক্রান্ত স্থান বেশ অসাড় হইয়া যায় ; উদরের ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি, বাহার দরুণ শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যা বাত জন্মে ; অতিরিক্ত পরিমাণে মূত্রত্যাগ ; পুরুষের জননেত্রিয়ে অত্যন্ত

কষ্টদায়ক ডায়াবোদ; সমুদয় শবীরে কুট্‌কুটানি বাহা হাত পায়েৰ আঙ্গুল পৰ্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; ঠাণ্ডা লাগিলে, বিশেষতঃ ঠাণ্ডা জলে স্নান কৰিলে, অস্থিৰে বৃদ্ধি : শেষ বেলা বা সন্ধ্যাৰ সময় অস্থিৰে বৃদ্ধি ইত্যাদি লোবি-
লিয়া ইন্‌ফেণ্টাৰ কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । লোবিলিয়া ইন্‌ফেণ্টাৰ কাৰ্য্যেৰ সঙ্গ
আণ্টিমোনিয়াম্‌ টাৰ্টাৰিকাম্‌, ডিজিটালিস্‌, ইপিকাকিউএনা এবং টেবে-
কামেৰ কাৰ্য্যেৰ বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন ইহাৰ কাৰ্য্যেৰ সঙ্গ
আসিনিক্‌ এবং বিৱেট্‌টাম্‌ আল্‌বামেৰ কাৰ্য্যেবও সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ইপিকাকিউএনা ।

ডাইলুশন বিচাৰ । ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশনেই সচরাচর
অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইপানি কাশিতে মূল আরোক এক ফোঁটা
মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায় । ২১৩টী রোগী
ইপানি কাশির চিকিৎসায় এই ঔষধেৰ মূল আরোক ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যব-
হার করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে । গা বমী বমী করা, অনবরত
শ্বাসরোধ হওয়া, ঠাণ্ডা লাগিলে বা সামান্য শারীরিক পরিশ্রমে ইপানিৰ বৃদ্ধি
ইত্যাদি লক্ষণ উক্ত কএকটি রোগীতেই বর্তমান ছিল । ইপানি কাশিতে
লেখক এই ঔষধেৰ মূল আরোক ১ ফোঁটা মাত্রায় সচরাচর ব্যবহার করিয়া
বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন ।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্বোনিকা, - কার্বোনেট্‌ অব্‌

ম্যাগ্নেসিয়া, - ম্যাগ্ন-কার্ব্‌

(MAGNESIA CARBONICA, - CARBONATE OF MAGNESIA, - MAG.-CARB.)

কোন এক বিস্মৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত কার্বোনেট্‌
অব্‌ ম্যাগ্নেসিয়া ক্রয় করিয়া উহা যথা নিয়মে সুগার অব্‌ মিষ্টকর সঙ্গে
মিশাইয়া ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শততমিক
ক্রমেৰ গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ইহাৰ ৪র্থ শততমিক ক্রমেৰ আরোক
প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । অস্ত্রের মৈথ্রিক কিল্লী এবং স্ত্রী-জননৈন্দ্রিয়ের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দ্রুত অস্ত্রের উত্তেজনা এবং মৈথ্রিক প্রদাহ ও স্ত্রীলোকের রজঃস্রাব সম্বন্ধীয় অন্তঃস্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । মাথাৰ চাপিয়া ধরার জায় বেদনা ; মাথার রক্তাধিক্য ; মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া (গ্রোফ্, মাক্, নাইট্-ক্-আস্, নেট্রাম্-মিউর, ফস্, সিলিয়া) ; মাথার শুক রকমের ফুসুড়ী বা টেটার (Totter), তিলিলে এবং বৃষ্টির দিনে বাহা চুলকায় ।

চক্ষু । প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতার পাতায় লাগিয়া থাকে (ক্যাল্-কার্ক্, লাইকোপ্, মাক্, গাল্-স্, গাল্-ফ্) ।

কর্ণ । কানে কম শুনা ।

মুখমণ্ডল । স্নাত্তিতে গালের হাড় ছিঁড়িয়া ফেলা, খনন করা বা ছিদ্র করার জায় বেদনা, বিশ্রাম কালীন বাহার বৃদ্ধি হয় এবং বাহার দ্রুত রোগী ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় ।

মুখগহ্বর । স্নাত্তিতে দাঁতের গোড়ায় বেদনা, বাহার দ্রুত রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় ; বিশ্রাম কালীন দাঁতের গোড়ায় বেদনা অসহ্য হইয়া পড়ে ; ঠাণ্ডাতে দাঁতের গোড়ায় বেদনার বৃদ্ধি ; গর্ভাবস্থায় দাঁতের গোড়ায় বেদনা ; মুখনিয়া রক্তমিশ্রিত থুথু উঠে ; মুখে তিক্ত বা টক স্বাদ (চাখনা, নাস্-বন্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । কল এবং টক জ্বালাদি খাওয়ার ইচ্ছা (অস্টি ক্রুড্, অস্টি-টার্ট্, চাখনা, হিপ্-গাল্-ফ্, ফস্, আস্, বিরেট্-আল্) ; মাংস খাওয়ার ইচ্ছা (এবিস্-ক্যান্) ; কাঁচা জ্বা খাওয়ার অনিচ্ছা ; অত্যন্ত প্রবল পিপাসা, সন্ধ্যাকালেই পিপাসার বৃদ্ধি হয় ; পাকস্থলীতে সঙ্কোচক বেদনা । উদর স্ফীত এবং বিস্তৃত ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গুল্মদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ এবং দূষিত বায়ু নিঃসরণের দ্রুত উদরের স্ফীতি এবং বিস্তৃতির অনেক উপশম হয় ; উদরের সমুদয় অংশেই কামড়ানী, কর্তনব্য বেদনা এবং গড়্-গড়্, কল কল শব্দ হওয়া ও তৎপর সবুজ রঙের তরল ভেদ, কিন্তু কোঁথপাড়া বর্তমান থাকে না ।

মল এবং মলদ্বার । স্থলীবিধিরা থাকিলে বেক্রপ হয়, গুল্মবারে সেক্রপ বেদনা বা বাতনা (আলোজ); মল সবুজবর্ণের কেশার দ্বার অথবা জমাট ঘোষের দ্বার ডেলা ডেলা সাদা পদার্থ বিশিষ্ট; কোষ্ঠবদ্ধ (আমন-মিউর, আলাম্, ব্রাই, নাক্স-বন্, ওপিরাম্) ।

জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পর এবং অতি অল্প পরিমাণে রজঃস্রাব; দিনের বেলা অপেক্ষা রাত্রিতে রজঃস্রাব অধিক হয়; গাঢ়, চট্‌চটিয়া আঠা, জালা উৎপাদক আলকাতরার দ্বার কাল রজঃস্রাব ।

নিদ্রা । শেষ রাত্রি ২ বা ৩ টার পর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং তৎপর আর ঘুম হয় না ।

চর্ম্ম । সমুদয় শরীরে চুলকানি ।

জ্বর । রাত্রিতে অত্যন্ত আত্যন্তরিক 'উষ্ণতা এবং বর্ধ; গায়ের কাপড় কেলিতে অনিচ্ছা ।

ব্যবহার । উদরাময়, বিশেষতঃ শিশু এবং ছোট বালক বালিকা-গণের; অঙ্গীর্ণ; কোষ্ঠবদ্ধ; শূল বেদনা; রজঃস্রাব ষটিত অনুথ (অর্থাৎ স্বল্প রজঃস্রাব বা গোপে রজঃস্রাব); অতিরিক্ত রজঃস্রাব বাহা রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিলেই অধিক হয়; গর্ভাবস্থায় দন্তশূল; চক্ষে ছানি পড়া (Cataract) ইত্যাদি অনুথে ম্যাগ্নেসিয়া কার্বোনিকা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সমুদয় শরীরে বাতের বেদনার দ্বার বেদনা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ক্লান্তিবোধ, বিশেষতঃ বসিয়া থাকা সময়ে শায়ের পাতার; অনেককণ বসিয়া থাকিলে, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়ে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অনুথবোধ; বিশ্রাম কালীন বা বিছানায় শয়ন করিলে, (দাঁতের বেদনাদির), রাত্রিতে, বসিয়া থাকা কালীন, ঠাণ্ডা বাতাসে অনুথের বৃদ্ধি এবং নড়াচড়াতে অনুথের উপশম ইত্যাদি ম্যাগ্নেসিয়া কার্বোনিকার কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ম্যাগ্নেসিয়া কার্বোনিকার কার্যের সঙ্গে আর্সিনিক, আলোজ, ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা, ক্যানোমিগা, গ্রাফাইটিস, লাইকোপডিয়াস্, নাইট্রিক আসিড্, নাক্স মফাটা, কঙ্করাস্, সিপিগা, সাইলিসিয়ার কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যামোমিলা, পাল্‌গেটোলা, মার্কিউরিয়াস্,
নাক্স-বম্, ক্রম্ ।

ডাইলুশন বিচার । হানিম্যানের মতে ইহার ৬ষ্ঠ শততরিক
ক্রমের আরোক ব্যবহার্য্য । আমরাও ৬ষ্ঠ ক্রম সচরাচর অধিক ব্যবহার
করিয়া থাকি ।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়াটিকা, -মিউরিয়েট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়া, -ম্যাগ- মিউর

(MAGNESIA MURIATICA; MURIATE OF MAGNESIA, -MAG.-MUR.)

কোন এক বিষমত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত মিউরিয়েট্
অব্ ম্যাগ্নেসিয়া ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে ২০° ডিগ্রী ওবার্ণক্ স্পিরিটে
মিশাইয়া ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । ২য় এবং
ততোধিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে রেক্টকাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত
হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । গ্যাংলিয়োনিক্ সিস্টেম্‌গলের (Ganglionic System
of nerves) উপর ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় । প্রৈক্ষিক কিল্লোর
উপরও ইহার স্থানিক কার্য্য করার ক্ষমতা আছে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সর্ব্বদা চিড়্, চিড়্, খিট্, খিট্ করা এবং বিমর্ষতাব ।

মস্তক । মাথায় ভারিবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা টালা, বাহ্যিক
দুরুণ রোগী টলিয়া পড়িবার উপক্রম হয় ; কপালে আঁটা এবং চাপাবোধ ;
সজ্জার সময় বা প্রথম রাত্রিতে শয়ন করিলে কপালের ছই পার্শ্বে কাম-
ড়াণ বা বোঁচড়াইয়া ধরা বা নিঃড়াণের জ্বার বেদনা, বাহ্যিক দুরুণ মনে
হয় যেন মাথাঘোরা এবং অচেতনতা শীঘ্রই আবন্ত হইবে, হাত দিয়া
প্রবল প্রচাপনে বাহ্যিক উপশম হয় ; কপালের ডাইন পার্শ্বে ছিঁড়িয়া ফেলা

বা সূচী বিধানের জায় বেদনা, যাহা চক্ষু পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং চাপিয়া ধরিলে যাহার উপশম হয়; মাথা ঢাকিয়া বাঁধিয়া রাখিলে মাথা বেদনার উপশম হয় (সাইলিসি) ।

চক্ষু । চক্ষু প্রদাহযুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর স্বেতাংশ লাল বর্ণ হওয়া ও উহাতে ভয়ানক জ্বালা বোধ এবং রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা (কাক্-কার্ক, লাইকোপ্, মার্ক্, রাস্ টক্স, পাল্, সাল্) ।

কর্ণ । কানেব মধ্যে চিড়িকমারা বা দন্দপানি ।

নাসিকা । সর্দি, যাহার দরুণ কখন কখন নাসারন্ধ্র ক্লব হইয়া থাকে, কখন বা নাকদিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ স্লেয়া নির্গত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার চিমাবোধ ও স্বাদ এবং আত্মাণ শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ হয়; নাক এবং নাসারন্ধ্রে মধ্যবর্তী উপস্থির আবরক চর্ম লালবর্ণ এবং ক্ষীত হয়; নাসারন্ধ্রে টাটানি বা জ্বালাযুক্ত বেদনা; নাকের মধ্যে মাম্ভী (চুম্ভী) পড়ে, যাহার দরুণ নাক স্পর্শ করিলে বেদনার উদ্রেক হয়; নাসারন্ধ্রের মধ্যে ক্ষত ।

মুখমণ্ডল । মুখ মণ্ডল শিটা, হরিদ্রার আভাসযুক্ত; মুখমণ্ডলে ফুসুড়ী (বাগোলা-টুক) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মনে হব যেন উপরের মাড়ীর ঠিক মধ্য ভাগস্থিত ইন্সিজার্স (Incissors) নামক দাঁত স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা হইয়াছে; দন্তমাড়ি ক্ষাত হয় এবং উহা হঠাৎ সহজেই রক্ত পড়ে; মুখের মধ্যে অনবরত সাদা ফেণার জ্বায় থুথু উঠে । গলায় মধ্যে শুক এবং ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বায় অল্পভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ; গলায় থেকুর দিতে দিতে গলায়িয়া গাঢ় চট্‌চট্‌িয়া মাঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন রক্ত মিশ্রিত স্লেয়া নির্গত হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা থাকে বটে, কিন্তু রোগীর কোন নির্দিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা থাকে না; প্রবল পিপাসা (একন্, আর্ম্, ব্রাই, বেল্, রাস্ টক্স); পাকস্থলী হঠাৎ মুখের মধ্যে জ্বল উঠে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোবেগ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই বমনোবেগ (ক্যালেন্ড্, নাক্স-বন্, পিটোন্, পাল্) ; পাকস্থলী হঠাৎ আহারবহা গণনালাতে

যেন গোলার আয় কোন পদার্থ চেলিয়া উঠিতেছে একপ অল্পভূত হয় (আলাক), উদগার উঠিলে বাহার উপশব্দ হয় : ক্ষত হইলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁতলিয়া গেলে ঘেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেকূপ বেদনা । স্পর্শনে বা চলিয়া বেড়াইলে যকূতে বেদনা, ডাইন পার্শ্ব শয়ন করিলে যাগার বৃদ্ধি হয় ; যকূত কঠিন এবং বড় হয় ; রাত্রিতে উপবে কনিয়া ধরার আয় বেদনা ; উদরে খিল ধরার আয় বেদনা ।

মল । মল অপ্রচুর, কঠিন এবং অতি কষ্টে আস্তে আস্তে মলবার দিয়া নির্গত হয় ; মল ভেড়ার মলের আয়, শুটলে (আলাম্, ক্যাণী-কার্ক্, ওপিয়াম্) ; নেড়মল শুষ্কতারের বাহির হইলেই ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় ; পুৰাতন আকারের উবরাময়ের বারবার অক্রমণ ।

মূত্রযন্ত্র । উদরের পেশীগুলি নাচের বিকে চাপিয়া ধরিলেই কেবল মূত্র নির্গত হয় ; ফোঁটায় ফোঁটায় মূত্র নির্গত হয় এবং মূত্রত্যাগের পর মনে হয় যেন মূত্রাধারে আরো মূত্র সঞ্চিত রহিয়াছে ।

জননেন্দ্রিয় । নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে স্কালোকের প্রচুর রজঃস্রাব (ক্যাক্-কার্ক্, নাগ্-বম্) ; রজঃস্রাবের সময় মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরে বেদনা এবং মানসিক অবসন্নতা ; জরায়ুতে থিলধরা, যাহা উকদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; মলত্যাগের পর, বা জরায়ুতে থিলধরার পরই ক্ষেতপ্রদর নিঃসরণ ।

শ্বাস যন্ত্র । প্রাতঃকাল এবং নক্সাব সময় শুককাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে জ্বালা এবং টাটনি ; রাত্রিতে অক্কেপিক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে হুড়্-হুড়া (হারোল্) ; বুকের মধ্যে আঁটা এবং কনিয়া ধরার আয় অল্পভূত হয় ।

হৃৎপিণ্ড । বসিয়া থাকিলে হৃৎস্পন্দন, চলিলে বা নড়াচড়াতে যাহা থাকে না ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই বাহুতে অবশবোধ ; পায়ের পাতায় ঘর্ষ ।

নিদ্রা । দিনের বেলা অত্যন্ত ঘুম পায় ; অনেক রাত্রি না হইলে ঘুম পায় না ; গরমবোধ হওয়া এবং পিপাসার দরুন ঘুম হয় না ; চক্ষু

বুজিলেই অস্থিরতা ; ঘুম দ্বারা কোন প্রকারের তৃপ্তি অহুত হয় না ; অতএব প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে রোগী অত্যন্ত শ্রান্তি অনুভব করে ।

জ্বর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শীতবোধ, বাহ্য বিছানায় শয়ন করিলেই দূরীভূত হয় ।

ব্যবহার। আক্কেপিক এবং হিষ্টিরিয়া রোগ জনিত অস্থখ ; মাথা ধরা ; নাস্তিশূল ; শিশুগণের দাঁত উঠিবার সময় অস্থখ ; পাকস্থলী এবং যকৃতের অস্থখ ; যকৃতের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা ; জরায়ুতে খিলধরা ; কোষ্ঠ বদ্ধ ; শ্বेतপ্রদর ; অতিরিক্ত রক্তঃস্রাব ইত্যাদি অস্থখে ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়্যাটিকা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। ব্যবহার আক্কেপের আক্রমণ এবং হিষ্টিরিয়া জনিত দুর্গলতা (অনাকিটিডা) ; সন্ধ্যার সময় বা প্রথম রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া চক্ষু বুজিলে সমুদয় শরীরের দুর্গলতা, বাহ্য মনে হয় যেন পাকস্থলী হইতে আরম্ভ হয় ; বসিলেই লক্ষণাদি আরম্ভ হয় এবং নড়াচড়াতে বা শারীরিক পরিশ্রমে এবং বহির্লোকে অস্থখের উপশম ইত্যাদি ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়্যাটিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ বাহ্যাদিগের হিষ্টিরিয়া এবং জরায়ুর অস্থখ আছে, তাহাদিগের পক্ষে এবং শিশুগণের দাঁত উঠার সময় অস্থখে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সমন্বিত বিশিষ্ট ঔষধ। ব্যরাইটা কার্বোনিকা, ব্রাইডনিয়া, ক্যাকেরিয়া কার্বোনিকা, ক্যানোনিয়া, গ্রাকাইটিস, ক্যাগা কার্বোনিকা, লাইকোপডিয়াম, নাইট্রিক্‌ অ্যাসিড, নাস্ট-বানিকা, পালনেটিয়া, সাল্ফার ।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যামোমিলা ।

ডাইলুশন বিচার। ডাক্তার বেজের (Dr. Bayes) মতে এই ঔষধের ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য । লেখকও উক্ত দুই ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া বোধোচিত ফল পাইয়া থাকেন ।

মার্কিউরিয়াস্-বিনায়োডেটাস্,-বিনায়োডাইড্ অব্ মার্কারি,-মার্ক্-বিন্

(MERCURIUS BINIODATUS,-BINIODIDE OF MERCURY,-
MERC.-BIN.)

কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে রেড্ আয়োডাইড্ অব্ মার্কারি (Red Iodide of Mercury) ক্রয় করিয়া যথানিয়মে উহাতে সুগার অব্ মিক্ মিশাইয়া ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত ইহার গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথানিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। অত্যন্ত প্রকারের পারা বা পারা ষট্টি ঔষধের ত্রায় ইহাও গলার মধ্যের গ্রন্থি এবং শৈল্পিক বিল্লী আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহার কার্যের সঙ্গে আয়োডিনের কার্যের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্বদা মনের অবসন্নতা এবং কাদিবার ইচ্ছা (ইগ্‌নেস্, নেট্রাম্-মিউর, নাস্-মক্, পাল্‌স্, রাস্-টক্স্)।

বস্তুক। মনে হয় যেন একগাছি রসি দিয়া কপাল কসিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে (মার্ক্); মাথার ঠিক উপরিভাগে উচ্চাশ্রব এবং চিড়িক্-মারা বা দপ্পপানি।

কর্ণ। উভয় কানের মধ্যে চুলকানি (ব্যারাইটা-কার্ক্, হিপ্-সাল্‌ফ্, সাল্‌ফ্); কর্ণমূল এবং উহার নিকটবর্ত্তী অত্যন্ত গ্রন্থির ক্ষতি (আয়োড্)।

নাসিকা। সর্দিলাগা; নাক উষ্ণ এবং ক্ষীণ; অত্যন্ত হাঁচি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে তরল শ্লেষ্মা নির্গমন (এক্‌ন, মার্ক্, সাক্সুনেরিয়া); নাক দিয়া হরিজাবর্ণের বা রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; নাকের পশ্চাৎভাগের অসুখ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাশ্রব ছাড়া উঠিয়া যাওয়ার ত্রায় আলা-শ্রব; নাকের হাড়ের অসুখ; টার্বিনেটেড্ নাসিক হাড় (Turbinated Bones) ক্ষতি; গলার ক্ষেকুর দিলে নাসিকার পশ্চাৎদেশ হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়; নাকের পাতায় মীম্বুড়ী (চুমটী) পড়ার ত্রায় ক্ষুধী।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । যুগ্ম ভাঙ্গিলে ওষ্ঠে চট্‌চট্‌িয়া আঁটা বোধ ; মুখে প্রচুর পরিমাণে লাগ উঠা এবং নিয়মাদির দাঁতে কন-
কনানি(মার্কি) । গলার মধ্য এবং নাকের প্লেয়ার স্ফার, গলার ক্ষেকুর দিলেই
যাহা নির্গত হয় ; ডেলার স্তায় কোন একটা পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ
হয়, গলার মধ্যে সেক্রপ অম্লভূত হয় (বেল) এবং বারম্বার গলায় ক্ষেকুর দিয়া
উহা বাহির করিবার ইচ্ছা ; গলায় ক্ষেকুর দিলে গলা দিয়া সবুজের আভাষুক্ত
কঠিন প্লেয়া নির্গত হয় ; টন্সিল্ (Tonsils) এবং হস্তাহিব নিয়মিত লাগ
নিঃসারক গ্রন্থির ক্ষাতি এবং উহাতে অভ্যস্ত বেদনা ; গলার মধ্যে ভাসান
রকমের ক্ষত এবং ডিপ্‌থিরিয়ার স্তায় পর্দাবিশিষ্ট পদার্থের স্ফার (নাই-
ট্রিক্‌আস) ।

মূত্রযন্ত্র । অতিরিক্ত পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া (এপিস্, আপোসাই
নাম্) ; পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের আবরক চর্মে (Prepuce.) সমুখ ভাগের
কঠিন ক্ষাতি এবং উহার ঠিক মধ্যভাগে বেদনাহীন গরমীর ঘা ; বাম
অণ্ডকোষের নাংস বিশিষ্ট ক্ষাতি বা আব (Sarcocoele) ; গরমীর ব্যারাম ;
বাগী, যাহা হইতে অনেক কাল, এমন কি অনেক বৎসর পর্য্যন্তও কল্‌তানি
পড়ে ; গরমীর ঘা, যাহা সহজে শুকায় না ।

শ্বাসযন্ত্র । বুকের মধ্যদিয়া একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত
আঁটা বোধ ; ডাইন স্তনের নীচে আঁকড়াইয়া ধরার স্তায় বেদনা ।

চক্ষু । গায় কোঙ্কার স্তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রুড়া, যাহার ত্বা প্রদাহযুক্ত
হয় এবং স্পর্শনে অভ্যস্ত বেদনায়ুক্ত হয় ; গায় চুলকানি বিশিষ্ট ক্ষুদ্রুড়া,
যাহাতে মামড়ী (চুমটী) পড়ে, কিন্তু উহা হইতে পুঁথ বহিরা পড়ে ; গরমীর ঘা
(মার্ক্‌, নাইট্রিক্‌ আস) ; পুরুষাঙ্গে কঠিন আকারের গরমীর ঘা ।

ব্যবহার । সর্দি ; টন্সিল্‌ প্রদাহ (Tonsillitis) ; ডিপ্‌থিরিয়া ;
গরমীর ব্যারাম জনিত অস্থ, বাগী ; কঠিন আকারের গরমীর ঘা ; ক্ষত
এবং কঠিনতা ; গ্রন্থির ক্ষাতি ; বায়ুনল সম্বন্ধীয় সর্দি বা প্লেয়া কোঙ্কার
স্তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রুড়া বিশিষ্ট প্রদাহ ; গণ্ডমাগা জনিত চক্ষু প্রদাহ ; চক্ষুর
যোজক ঝিল্লী প্রদাহ ; পুরাতন আকারের গোণ উপদংশ জনিত হাড়ে হাড়ে
বেদনা ইত্যাদি অস্থে বিনায়োডাইড্‌ অব্‌ মার্কিারি ব্যবহার্য্য । ডাক্তার

হার্টম্যান্ এবং ডাক্তার য়ার (Drs. Hartmann and Jahr) বলেন যে, প্রাথমিক আকারের (Primary) হউক, বা গৌণ আকারের (Secondary) গরমীর ব্যারামট হউক, বাহ্যতে মার্কিউরিয়াম্ সলিউবিগিস্ বা মার্কিউরিয়াম্ বাইবাস্ দ্বারা উপকার না দর্শে, সেপ্রকার গরমীর ব্যারামে বিনায়োডাইড্ অব্ মার্কিারি সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । বেলাডোনা, ল্যাকেসিস, মার্কিউরিয়াম্, মেজিরিয়াম্, নাইট্রিক্ আসিড্, ক্যালো বাইক্রমিকাম্, আয়োডিয়াম্, ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টার, আর্সিনিক, বেলাডোনা, ক্যান্ফার, চারনা, কফিরা, হিপার সাল্ফার, ওপিয়াম্, ফুফরাস্, স্পঞ্জিয়া, সাল্ফার, নাইট্রিক্ আসিড্, মেজিরিয়াম্, আয়োডিয়াম্, ল্যাকেসিস্ ।

ডাইলুশন বিচার । গরমীর ব্যারাম বা গরমীর ব্যাবাম জনিত অস্থখে ইংলণ্ড এবং আমেরিকা নিবাসী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এই ঔষধের ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া ১ বা ২ গ্রেইণ্ মাত্রায় ব্যবহা করিয়া থাকেন । উক্ত রোগে লেথকও ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ্ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন । ইহার ৬ষ্ঠ, ১২ এবং ৩০ ক্রমের আরোকও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

মার্কিউরিয়াম্ করোসাইবাস্, -ক্লোরাইড্ অব্ মার্কিারি,-
করোসিব্ সাবলিমেট্,- মার্ক-কর

(MERCURIUS CORROSIVUS, -CHLORIDE OF MERCURY, -CORROSIVE
SUBLIMATE, -MERC.-CORR.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদৃত করোসিব্ সাবলিমেট্ ক্রয় করিয়া বথানিয়মে রেকটফাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার মূল আরোক বা নিম্ন নিম্ন আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহার সঙ্গে যথা নিম্নে স্ফোর অব্ মিক্ মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহার কার্য্যও প্রায় অন্যান্য প্রকারের পারার

কার্যের জার বটে ; কিন্তু ক্রোরোসিবি, সাবলিমেটের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ আছে বাহা অত্যন্ত প্রকারের পারায় নাই । ইহা একপ্রকার ক্ষতকারক উত্তেজক বিষ বিশেষ । শৈল্পিক ঝিল্লীর উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল ধ্বংসকারক, বাহার দরুণ উক্ত ঝিল্লীগুলি প্রদাহযুক্ত হইয়া পচিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় । স্নায়ক ঝিল্লী (Serous Membranes), বিশেষতঃ অম্মাবরক ঝিল্লীই (Peritoneum) ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা বিবাক্ত হইয়া যে প্রকারের প্রদাহ, বা বা ক্ষত হয়, উহাকে পচান এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মনের অবসন্নতা এবং নিরুৎসাহের ভাব (ইগ্নেন্স, পাল্‌স) ; সর্বদা থিট্‌ থিট্‌, চিড্‌ চিড্‌ করা (ব্রাই, ক্যাম্‌, নাল্‌-বম্‌) ; জ্ঞানের হ্রাস ; কোন ব্যক্তি কথা বলিলে রোগী বক্তার পানে তাকাইয়া থাকে এবং বক্তা বাহা বলে সে উহার কিছুই বুঝিতে পারেনা ; নিদ্রানুতা এবং প্রলাপ (বেল্‌, ওপিয়াম্‌) ।

মস্তক । মাথা এবং মুখ মণ্ডলে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গালে আগ্নাত্তব (একন্‌, বেগ্‌) ; কপালে প্রবল বেদনা (পাল্‌স্‌, সাল্‌নেরিয়া) ; মাথার হাড়ের আবরক কঠিন পর্দার কসিয়া ধরায় জ্বর বেদনা ।

চক্ষু । চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত (ফাইসট্‌) এবং উহাতে কোন প্রকারের স্পর্শ বা আলোক জ্ঞান থাকে না (ওপিয়াম্‌) ; চক্ষে আলোক এক-বারেই সহ্য হয়না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া উগ্র জ্বালা উৎপাদক জল পড়ে (আর্স্‌, ইউফ্রেস্‌, লেডাম্‌) ; চক্ষুর যোজক ঝিল্লি লাল বর্ণ হয় ; চক্ষুর গোলকের পশ্চাৎ ভাগে বেদনা, বাহার দরুণ মনে হয় যেন চক্ষুর গোলক তৈলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে ; চক্ষুর পাতা উপরের দিকে উল্টান, ক্ষীণ লালবর্ণ, ক্ষতযুক্ত এবং উগাতে চিড়িকমারা ; চক্ষুর পাতার প্রান্তে মাম্‌ড়ি (চুম্‌টী) পড়ে বা উহাতে ফোয়ার জ্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুস্কুড়ী বাহির হয় (মার্ক্‌, সাগ্‌ফ্‌) ; অল্প তরল পদার্থ পূর্ণ ফোয়ার জ্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রী মথলিত চক্ষুর যোজক

কিল্লীর গণ্ডমালা জনিত প্রদাহ (Phlyctenulae); কর্নিয়াতে গভীর ক্ষত; চক্ষুর আইরিসের প্রদাহ, বিশেষতঃ গব্যমীর ব্যারাম জনিত (Syphilitic Iritis), বাহ্যিক দরুণ রাক্তিতে বেদনা যাতনাদির বৃদ্ধি হয়; চক্ষুর রেটিনা প্রদাহ (Retinitis Albuminuria) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রতে ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা ও চক্ষুর কোটিরের চতুষ্পার্শ্বস্থিত হাড়ে বেদনা; কর্নিয়ার ফোড়া এবং আইরিস্ প্রদাহে পূর্ব নিঃসরণ; আত্মভ্রুর শিশুগণের চক্ষু-প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া ক্ষতকারক ক্লেদ নিঃসরণ, বাহ্যিক শিশুর মাতার গব্যমীর ব্যারাম জনিত খেত প্রদাহের দরুণ উৎপন্ন হয় ।

কর্ণ । কানের মধ্যে ভয়ানক দগ্ধদগ্ধি বা চিড়িকমারা ।

নাসিকা । নাসিকা লালবর্ণ এবং ক্ষীত (বেল্, মার্ক্); সর্দি এবং তদ্রূপ নাকদিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল স্রোতা নিঃসরণ; নাসারন্ধ্রের মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বর জ্বালা এবং চিড়িকমারা (আইন-মিউর, সিপা, হাইড্রাট্) ।

মুখমণ্ডল । মুখাকৃতি শিটা এবং উদ্বিগ্ন যুক্ত; মুখমণ্ডল ক্ষীত, লাল-বর্ণ, টল-টলে; ওষ্ঠ কাল, অত্যন্ত ক্ষীত এবং অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত, শুষ্ক এবং কাটায়ুক্ত (আস্); মাড়ি শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং উহা টাটার; মুখমণ্ডল শোধের জ্বর ক্ষীত, মলিন বা শিটা এবং মূত্র কোষের ব্রাইটস্ ডিজিজ্ (Bright's Disease) ।

মুখগহ্বর ও গলার মধ্য । দাঁত নড়ে, উহাতে বেদনার উদ্বিগ্ন হয় এবং উহা পড়িয়া যায় (মার্ক্); মাড়ি এবং দাঁতে টাটানি; মাড়ি ক্ষীত এবং তল-তলে ও উহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে এবং যেন দাঁতের গোড়া হইতে আল্গা হইয়া যায় (কার্বো-বেজ, সিষ্টাস্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); জিহ্বা সাদা গাঢ় স্রোতা দ্বারা লেপযুক্ত (আন্টি-ফুড্), অথবা শুষ্ক এবং লালবর্ণ (বেল্, রাস্টক্), অত্যন্ত ক্ষীত (বেল্); পুড়িয়া গেলে যেরূপ হয়, মুখগহ্বর সেকপ শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত এবং উষ্ণ (এপিস্); মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যের ব্রৈগ্নিক কিল্লিতে দূষিত পদার্থের সঞ্চার এবং উহাতে ক্ষত; মুখে অত্যন্ত চট্-চটিয়া আঠা লাগের সঞ্চার বাহ্যিক অতি কঠে নির্গত হয় (ক্যালী-বাই); মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে লাগ পড়ে; লোন্তা আদ্যবিশিষ্ট লাগ পড়া (আন্টি-ফুড্,

সাল্‌ফ্‌), অথবা অত্যন্ত তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট লাল পড়া ; জিহ্বা নিচু করিলে যত বেদনার উদ্বেক হয়, গিলিতে বেদনার তত উদ্বেক হয় না। গলাব মধ্য অত্যন্ত ক্ষীত এবং প্রদাহযুক্ত, যাচার দরুণ গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং বোগী ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয় (বেল্‌) ; গলাব মধ্য এবং আচারবহা গলনালীতে জালিয়াত প্রবল বেদনা (আস্‌, ক্যাস্‌, ক্যাপ্‌স্‌), বাহ্যিক সামান্য চাপ পড়িলেই যাহার বৃদ্ধি হয় ; আল্‌জিহ্বা ক্ষীত এবং লম্বা (মার্ক্‌) এবং কাল্‌চে লালবর্ণ হয় ; গলাব মধ্যের বহির্দেশ এবং উচার গ্রন্থি অত্যন্ত ক্ষীত ।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত প্রবল পিপাসা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীতল জল পানের ইচ্ছা (একন্‌, আস্‌, ব্রাই) ; জলাদি পান বা জলাদি গিলিবার সময় উচা নাক দিয়া, বারম্বার বাহিব হইয়া পড়ে ; অত্যন্ত কষ্টদায়ক কঠবম্বী এবং বমন ; অনবরত সবুজ বর্ণের পিত্ত বমন (আইরিস্‌) ; রক্তের ডিটযুক্ত পদার্থ বমন ; উদরোদ্ধ প্রদেশ অত্যন্ত ক্ষীত এবং বিস্তৃত (আস্‌, বেল্‌, ব্রাই, নাক্স-বম্‌, লাইকোপ্‌), বাহ্য সামান্য স্পর্শন এবং প্রচাপনেই অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায় । যকৃত প্রদেশে সূচীবিধানের ভ্রায় অম্লভূত হয় (একন্‌, আস্‌, ক্যাক্‌-কার্ক্‌, চায়না, কোনায়াম্‌, চেগিডন্‌, মার্ক্‌, ক্যালী-কার্ক্‌, নেটোম্‌-মিউর, নাক্স-বম্‌, সিপিরা, সাল্‌ফ্‌) ; উদর অত্যন্ত ক্ষীত এবং বিস্তৃত ও সামান্য স্পর্শনেও অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায় (একন্‌, পেম্‌, কুপ্রাস্‌) ; মোতড়াইয়া পড়িলে বা ধৌত্‌লিয়া গেলে সেকুণ হয়, উদরে সেকুণ বেদনা (মার্ক্‌, ফেরাম্‌), সিকাম্‌ প্রদেশে (Ceccal Region) এবং সরস্বত্রেই যাহা অধিক অম্লভূত হয় ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্ক এবং শুষ্কভাবে অনবরত জালা (আস্‌, ক্যাস্‌) ; শুষ্কদ্বার দিয়া ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া পদার্থ বহিয়া পড়ে, যাহার দরুণ শুষ্কদ্বার ক্ষত হয় (কার্কো-বেজ্‌) ; ক্রমাগত অত্যন্ত কষ্টদায়ক কৌপপাড়া এবং উহার সঙ্গে উদরে শূল বেদনার ভ্রায় কর্তনবৎ বেদনা ; দান্তের পর শুষ্কদ্বারে এবং মূত্রাধারে অত্যন্ত কষ্টদায়ক জালাভূতব এবং শূল, যাহার দরুণ বারম্বার কৌপ পাড়িতে ইচ্ছা যায় ; বারম্বার মলভাগ, মল কেবল

রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা (ক্যাঙ্ক্); মল কাইয়ের ভায়, মলিন সবুজবর্ণ, পিত্তযুক্ত এবং দুৰ্গন্ধযুক্ত (আস্), চট্ চট্য়া আঠা ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাধারের শূল এবং উদ্ভরণ বারম্বার মূত্রতাগের ইচ্ছা (ক্যাঙ্ক্, ক্যাম্প্, কল্চ্); মূত্রাববোধ (একন্, হায়োস্, ট্রাইমন্); বারম্বার প্রস্রাব করা; মূত্র কোঁটার কোঁটার নির্গত হয় এবং মূত্র নির্গত হওয়ার সময় অত্যন্ত যাতনা (একন্, বেল্, ক্যাঙ্ক্); মূত্র পরিমাণে অল্প এবং রক্ত-মিশ্রিত; মূত্র আল্‌বুমেন্ মিশ্রিত (অস্মিমিষাম্, কন্, ফাইটোল্, স্লাইমাম্) সাদা কোমল স্ফাব ভায় পদার্থ, শ্লেষ্মাব ভায় পদার্থ, অথবা কাল্‌চে মাংসের ভায় শ্লেষ্মার অংশ বিশিষ্ট; প্রমেহ রোগ এবং মূত্রনালী দিয়া প্রথমতঃ পাতলা এবং তৎপর গাঢ় সবুজবর্ণ আভাযুক্ত ক্লেব নিঃসরণ, রাত্রিতে বাহার বৃদ্ধি হয় (মার্ক্) এবং প্রস্রাব করার সময় মূত্রনালীতে জ্বালা এবং চিড়িক মারা (ক্যানািসিস্-স্ত্রাট্) ।

জননেদ্রিয় । পুরুষাঙ্গ এবং অণ্ডকোষ অত্যন্ত ক্ষীণ (আস্); পুরুষাঙ্গে পচাযুক্ত গরমীষ ঘা, যাহা হইতে পাতলা গর্দাব ভায় ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া পদার্থ বিশিষ্ট পূর্ব নির্গত হয় । স্ত্রীলোকের যোনির ভয়ানক প্রবল প্রদাহ; স্তনের বোঁটার চতুর্দিকের গ্রন্থির ক্ষীণতা ।

শ্বাসযন্ত্র । স্বরভঙ্গ বা স্বরশূন্যতা; বায়ুশ্বলেব মধ্যে জ্বালা, কঠন-বৎ এবং হলকুটানের নাশ বেদনা; বুকের মধ্য দিয়া আঁটাবোধ; হাপা-নির লক্ষণ সম্বলিত সর্দি (অস্মিমিষাম্), শ্বাসকষ্ট; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া রক্তের ছিট সম্বলিত শ্লেষ্মা নির্গমন; বুকের মধ্য দিয়া সূতী বা খোঁচা বিধার ভায় বেদনা (ডাইন পার্শ্ব) ।

নাড়ী । নাড়ী ক্ষুদ্র, অসম (Intermittent) এবং অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে (ক্যানী-কার্ক্, নেট্রাম্-মিউব) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অঙ্গসর্বোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব কম্পন; উরু বা কুঁচ্কির সন্ধিতে সূতী বিধানের ভায় বেদনা ।

নিদ্রা । বারম্বার হাঁইতোলা এবং গা ভাঙ্গা; রাত্রিতে নিদ্রা-শূন্যতা; ঘুমেরদ্বায়ে চমকিয়া উঠা (আস্, বেল্, হায়োস্, ট্রাইমন্) ।

জ্বর । সামান্য পারাবিক পৰিশ্রমেই শীতবোধ (ক্যাক্-কার্ক্,

হিপ-সাল্‌ফ্‌, লাইকোপ্‌, কস্‌, সাইলিসি); শরীর ঠাণ্ডা এবং উহাতে প্রচুব পরিমাণে ঘর্ম্ম হওয়া, বিশেষতঃ কপালে (ক্যাম্ফার, বিরেট-আর্স্‌); চর্ম্ম অত্যন্ত উষ্ণ (একন্‌, আর্স্‌, বেল্‌, ব্রাই); গায় চট্‌চটিয়া আঠা ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম (আর্স্‌, ক্যাম্ফার, মার্ক্‌)।

ব্যবহার । গরমীর ব্যারাম বা প্রমেহ রোগ জনিত চক্ষু-প্রদাহ (Syphilitic or Gonorrhoeal Ophthalmia); শিশুগণের চক্ষু-প্রদাহ; চক্ষুর আইরিস্‌ প্রদাহ (Iritis); চক্ষুর রেটিনার প্রদাহ (Retinitis); সর্দি এবং নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গমন; মুখ দিয়া লাল পড়া; দাঁতেব গোড়া এবং ঠোঁটে ঘা; মূত্থের মধ্যে ঘা; টন্সিল্‌ প্রদাহ (Tonsillitis); গাল গহ্বরের প্রদাহ; শরীরের স্থানে স্থানে পচাতুক্র ক্ষত বা ঘা; বক্রত প্রদাহ; রক্তমাশয় বাহাতে কেবল রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাই ভেদ হয় ও বাহাতে স্বাভাবিক মনের লেশ মাত্র থাকে না; মূত্রাধারে শূল, যাহার দকণ বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়; মূত্র কোষের ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ্‌ (Bright's Disease); প্রমেহ রোগ; প্লুর্নবাহে গরমীর ঘা; বাগী; ইপানিব লক্ষণ সম্বলিত সর্দি; বায়ুনল প্রদাহ; গ্রন্থির ক্ষতি; আক্কেপ বা কন্‌বাল্‌সন্‌ (Convulsions); শোথ; কোন কোন প্রকার পুরাতন আকারের পালাজর বাহাতে স্নাত্তিতে হাড়ের মধ্যে বেদনা থাকে; পিতামাতার গরমীর ব্যারাম জনিত শিশুগণের গরমীর ব্যারাম (Hereditary Syphilis); রক্ত মিশ্রিত তরল ভেদ; মূত্রকৃচ্ছ্র; অণ্ডকোষাধারের ক্ষতি; ক্রীলোকের বোনির প্রদাহ এবং উহাতে পচালাগা; পর্ভাবস্থায় ক্রীলোকের মূত্রে আবুমেন্‌ থাকা জনিত অস্থখ; অন্ত্রাবরক বিলীপ্রদাহ (Peritonitis); গ্রন্থির সন্ধির উপস্থিতে ক্ষত; গরমীর ব্যারাম জনিত অস্থি বৃদ্ধি; শিশুগণের গণ্ডমালা জনিত মাথায় ফুফুড়া এবং শরীরের স্থানে স্থানে বিকচ (Eczema) ইত্যাদি অস্থখে মার্কিউরিয়াম্‌ করোসাইভাম্‌ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । চাঁৎ হইয়া হাঁটু ওটাঁইয়া শরন করা; অত্যন্ত দুর্বলতা এবং শরীরের কাঁপনি (ক্যাক্‌-কার্ক্‌, চায়না); শরীরের স্থানে স্থানে স্পন্দন এবং লক্ষোচন (সিকুটা, ইগ্‌নেস্‌); গ্রন্থির ক্ষতি (ব্যারাইটা-কার্ক্‌, ক্যাগ্‌-কার্ক্‌, গ্রাফ্‌, আয়োড্‌); গ্রন্থির আবরক কঠিন পর্দায় (Periosteum) কসিয়া ধরার শ্রায় বেদনা (নাইট্রিক্‌-আম্‌);

সার্বজনিক শোথ (আস্, এপিদ্, আপোসাইনাম্); বার সচরাচর পচা ধরে, বা আক্রান্ত স্থানে ছিদ্র হয় (আস্); আমাশয়ের মলে কেবল আম এবং রক্ত থাকে, উহাতে স্বাভাবিক মলের লৈনও না থাকে ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রকৃচ্ছ, বর্তমান থাকে, মূত্র লালবর্ণ এবং মূত্রত্যাগের সময় মূত্রনাগীতে অত্যন্ত জ্বালাব উদ্ভেদ হয়। মার্কিউরিয়াম্ করোসাইবাসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । একোনাইট্, আর্সিনিক্, বেলাডোনা, ট্রাইওনিয়া, সিগা, নাইট্রিক্ আসিড্, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্, সাল্ফার ।

প্রতিষেধক ঔষধ । হিপার সাল্ফিউরিস্, নাইট্রিক্ আসিড্, সাইগিসিরা । এতদ্ভিন্ন অধিক মাত্রার বিবাক্ত হইলে ডিমের লাল ব্যবস্থা ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পিতা মাতার গরমীর ব্যারাম জনিত শিশু-গণের অস্থিতে ২য় বা ৩য় ক্রমের গুঁড়া, $\frac{1}{2}$ গ্রেইণ মাত্রায়, বিশেষ উপকারী । কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, রক্তামাশয়ে কোন কোন রোগীর পক্ষে ৩য় বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া, $\frac{1}{2}$ গ্রেইণ মাত্রায়, ৩য় বা ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক অপেক্ষা অধিক উপকারী । লেখক স্বয়ং অনেক রক্তামাশয়াক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় এই ঔষধের গুঁড়া ব্যবস্থা করিয়া আরোক অপেক্ষা অধিক উপকার পাইয়া থাকেন । এই ঔষধের ১২, ১৫, ১৮, ৩০, ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই ঔষধের ২০০ ডাইলুশন, $\frac{1}{2}$ কোঁটা মাত্রায়, ১ মাত্রা সেবন করাইয়া লেখক তিন বৎসরের পুরাতন আকারের রক্তামাশয়াক্রান্ত ৬ বৎসর বয়স্ক একটা বালককে আরাম করিয়াছিলেন । রোগীর পিতা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর ভয়ানক বিরোধী ছিলেন । তাঁহার পুত্র একরূপ আরোগ্যলাভ করার দরুণ তিনি হোমিওপ্যাথির এত পক্ষপাতি হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহার পরিবারের মধ্যে কাহারো ব্যারাম হইলে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ভিন্ন আলোপ্যাথিক চিকিৎসককে কখনও ডাকেন না এবং তাঁহার আশ্রয় বন্ধুগণকেও হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসা করাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া থাকেন ।

মিলিফোলিয়াম্, -মিলিফ্ (MILLEFOLIUM, -MILLEF.)

ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বাগান এবং মাঠময়দানে এই গাছ জন্মে। ইংলণ্ডে ইহা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাছের সমুদয় অংশ যথানিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। কণেকণা মর্জ্জা সঞ্চীয় দ্বায়ু দিয়া কৈশিক শিবার (Venous Capillaries) উপবই ইহার কার্য্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বস্তি কোটরস্থিত কৈশিক শিবার উপরট ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ বস্তিকোটরস্থিত যন্ত্র সমূহ হইতে রক্তস্রাব হয়। ইহা যে কেবল বস্তিকোটরস্থিত যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে এমত নহে, ইহা নাসিকা এবং ফুফুস হইতে রক্তস্রাবও নিবারণ করিয়া থাকে। ইহার রক্তস্রাব হামামেলিনের রক্তস্রাব হইতে অধিক প্রবল। ইহা শৈল্পিক ঝিল্লীও আক্রমণ করিয়া থাকে, যাহার দরুণ আক্রান্ত শৈল্পিক ঝিল্লীতে সামান্ত প্রকারের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, পাকস্থলী এবং উদরে বেদনা, উদরাময় এবং মূত্র ধারণে অশক্তি বা অসাড়ি বা অনিচ্ছা পূর্বক মূত্র নির্গমন ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (একন্, বেল্); মাথায গোলমেলে বোধ এবং ঘৃণ্ ঘৃণে মাথা বেদনা; মাথা এবং মুখ মণ্ডলের ধমনীতে সামান্ত রক্তের দপ্পদপানি; মাথার ঠিক উপরিভাগে ঘৃণ্ ঘৃণে বেদনা; একটা জুঁ আঁটিয়া মারিয়া রাখিলে যেক্রপ হর, কপালেব ডাইন পার্শ্বে সেক্রপ অস্থিত অনুভূত হয়।

চক্ষু। মনে হয় যেন চক্ষের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণ রক্ত সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে; চক্ষের মধ্যদেশে নাকের গোড়ী বা কপালের পার্শ্বে নগ্নাস্ত ছুরিসিধানের ছায় চাপ পড়া।

কর্ণ। কান যেন বন্ধ হইয়া বহিয়াছে একপ অনুভূত হয়।

নাসিকা । নাক দিয়া রক্ত পড়া (একন্, বেল, ব্রাই, হামামেলিস), এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা বা বৃকে রক্তাধিকা বা রক্তাবরোধ ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলে গরমবোধ, যাহাব দরুণ মনে হয় যেন মাথার রক্ত উঠিতেছে । নিম্নমার্জিতে ছিঁড়িয়া ফেলার ভ্রার বেদনা ।

মুখগহ্বর । বাত জনিত দন্তশূল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মার্জিতে অজুখ ; পিপাসা ; মুখ শুকাইয়া যাওয়া ।

পাকস্থলী এবং উদর । উদগার উঠা ; ক্ষুধা পাঠিলে ঘেরুপ হয়, পাকস্থলীতে সেরুপ চর্কনবৎ বা খনন করাব ভ্রার অজুত হয় (ইগ্নেস, পাল্‌স, সাল্‌ফ) ; পাকস্থলীতে পূর্ববোধ ; পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ (আস্, ক্যাস্, আইবিস্, সাল্‌ফ), যকৃত প্রদেশে বেদনা ; দূষিত বায়ু সঞ্চিত বা বদ্ধ হইয়া থাকিলে ঘেরুপ হয়, উদরে সেরুপ পূর্ববোধ ; উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত ; শুষ্কতার দিয়া চর্কময়ুক দূষিত বায়ু (Platus) নিঃসরণ ।

মূল । শুষ্কতার দিয়া রক্তশ্রাব বা রক্ত মিশ্রিত মলাদি ভেদ ; কৌণ পাড়া ; উদরাময় ; প্রবল শূল বেদনা ; অর্শরোগ এবং তদরুপ শুষ্কতার দিয়া প্রচুর রক্তশ্রাব (ইরিজারগ, ইউকেলিপ্‌ট, হামামেলিস) ।

মূত্রযন্ত্র । যকৃত মূত্রত্যাগ (আস্, ক্যাস্, কন্, টিরিবিছ) ; বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ; অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্বক মূত্রত্যাগ ; মূত্রাধারের জড়তার দরুণ মূত্রাধারের শৈথিল্যিক রোগ ।

জননেদ্রিয় । স্ত্রীলোকের হয় রক্তঃরোধ, নতুবা প্রচুর বা অতিরিক্ত যজঃশ্রাব ; জবাযু হইতে রক্ত শ্রাব (একন্, বেল, ইরিজারগ, হামামেলিস, সিকেল) ; শারীরিক পরিশ্রমেব পর জবাযু হইতে রক্তশ্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে বক্তাধিকা বা রক্তাবরোধ হেতু শিবঃপীড়া ; স্বৈত প্রদর ; সন্তান প্রসবের পর জবাযু হইতে হয় অতিরিক্ত ক্রেদ (লোকিয়া, Lochia) নিঃসরণ, নতুবা লোকিয়া নিঃসরণ একবারে বন্ধ হয় ।

শ্বাসযন্ত্র । কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া উজ্জল লালবর্ণ রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন (কেরাম, হামামেলিস) ; বৃকে কষ্টাশুভব ; যক্ষা কাশে হ্রঃস্পন্দন (একন্) ; অর্শের রক্তশ্রাব বদ্ধ হইয়া বৃকে বেদনা বা কষ্টাশুভব ; রক্তঃরোধ হইয়া বৃকে বেদনা বা কষ্টাশুভব (ব্রাই, হামামেলিস,

পাল্‌স্‌) ; বারু উপনলে স্নেহাৰ অতিরিক্ত সঞ্চায় ; কুক্কুসে ছুরি বিধানের জ্বাৰ বেদনা এবং উহাতে হৃৎকূটান, মোচড়াইয়া পড়া বা থেত্‌লিয়া যাওয়ার জ্বাৰ বেদনা ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । অত্যন্ত হৃৎস্পন্দন এবং গলা দিয়া রক্ত মিশ্রিত স্নেহা নিৰ্গমন ; কাশিলে হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ীর ভয়ানক আন্দোলন, নাড়ী ক্রতগামী এবং সঙ্কচিত হওয়া ।

নিদ্রা । ক্লান্তিবোধ না হইলেও বারম্বার হাই উঠা ।

ব্যবহার । নাসিকা, কুক্কুস, অন্ন এবং শ্রীলোকের জননেস্ত্রির দিয়া প্রবল রক্তস্রাব ; প্রবল শারীরিক পরিশ্রম অথবা যন্ত্রাদির জড়তার দরুণ যদি উক্ত প্রকারের রক্তস্রাব হয় তবে ; বক্ষাকাল ; যন্ত্রাদির জড়তার দরুণ শৈল্পিক রোগ ইত্যাদিতে মিলিফোলিয়ায় ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছুরিবিধান, কামিরা ধরা এবং ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা ; রক্তাবরোধ ; রক্তস্রাব ; যন্ত্রের জড়তার দরুণ স্নেহা নিৰ্গমন (হেলোনিয়াম্‌) ; পড়িয়া বাইয়া বা বা অস্ত্র কোন কারণে লা হইলে উক্ত ঘা হইতে সহজেই প্রচুর রক্ত পড়া ; অধিক ভারি জ্বাৰ উঠাইলে বা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে রক্তস্রাব, সঞ্চায় সময় এবং রাত্ৰিতে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং দিনের বেলায় বাহার উপশম হয় ইত্যাদি মিলিফোলিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । হামামেলিস্‌, ইপিকাকিউএনা, ট্রিলি-
রাম্‌, সেনিসিয়ো অরিয়াম্‌ ।

প্রতিষেধক ঔষধ । এরাম্‌ ম্যাকুলেটাম্‌ ।

ডাইলুশন বিচার । ডাক্তার হিউজ্‌ (Dr. Hughes) ১২ দশমিক ডাইলুশন সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন । রক্ত যন্ত্রের পক্ষে মূল আরোক ৬ ফোঁটা মাত্রায় বিশেষ উপকারী । লেখক এই ঔষধের ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন । পড়িয়া বাইয়া জ্বাৰ হইতে রক্তস্রাবে মূল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া ২০টা রোগীর চিকিৎসায় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে ।

মফাশ,-(মৃগনাভি,-কস্তুরী),-মফ্

(MOSCHUS,-MUSK,-MOSCH.)

মৃগনাভি (কস্তুরী) কাছাকে বলে তাহা বোধ হয় এতদ্ব্যপেক্ষে সকলেই জানেন। ভোটান হইতে এতদ্ব্যপেক্ষে ইহার আয়দানি হইয়া থাকে। ইহা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম তাহা নির্ণয় করা কতকটা কঠিন ব্যাপার। অতএব ইহা কোন এক বিখ্যাত লোক বা ঔষধালয় হইতে ক্রয় করা উচিত। যথা নিয়মে ইহার সঙ্গে মৃগার অব্যমিক্ মিলাইয়া ইহার মিশ্র ঙ্গড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১ ভাগ কস্তুরী, ২০ ভাগ রেক্টকাইড্ স্পিরিটে মিলাইয়া ইহার মূল্য আরো ক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া, ব্যবহার ইত্যাদি। অনেক কাল হইতেই কস্তুরী জায়বিক মণ্ডলীর প্রবল উত্তেজক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া আনিতেছে। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া এবং জননেঞ্জিয়ের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। যাতার দরুণ শিরঃস্রীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ পূর্ণবোধ ও নিদ্রার ভাব হইয়া থাকে। ইহার জ্বাণের দরুণই রোগের অনেকটা আশু উপশম হয়। হিষ্টি-রিয়ার আক্রমণ এবং জায়বিক হৃৎস্পন্দনের আক্রমণেও পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, হিষ্টিরিয়া রোগের আক্রমণের সময় রোগী একবারে চেতনাশূন্য হইয়া পড়িলে ইহা সেবনে রোগের আক্রমণ একবারে সারিয়া যায়। যে সকল ব্যক্তির হিষ্টিরিয়া রোগ রহিয়াছে কস্তুরীর গন্ধে তাহাদিগের রোগের আক্রমণ হইতে দেখা গিয়াছে। অতএব হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইলে হিষ্টিরিয়া রোগের আক্রমণের পক্ষে যে কস্তুরী একটি অত্যন্ত উপকারী ঔষধ তাহা বোধ হয় অস্বীকার করা বাইতে পারে না। যে প্রকার হৃৎপিণ্ডের অস্থির বাস্তবিক (Organic) মতে, কেবল জায়বিক মাত্র, হৃৎপিণ্ডের সেরূপ অস্থির কস্তুরী দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। জায়বিক শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের আকস্মিক ঙ্গড়া কাশি, হিষ্টিরিয়া জনিত হাঁপানি এবং হিকাতেও ইহা উপকারী। ডাক্তার গারেন্সি (Dr. Guereux) বলেন যে, রোগের আক্রমণের সময় হাত পা ইত্যাদি ঠাণ্ডা হওয়া এই ঔষধের একটি

বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যো পরিগণিত। হিষ্টিরিয়া রোগের আক্রমণের সময় অনেক রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হয়; অর বিকারাদি রোগের পতনাবস্থায়ও (Collapse stage) রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হয়। অতএব উক্ত অবস্থা জ্বলিতে কস্তুরী বিশেষ উপকারী। একত্র আলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণও উক্তাবস্থায় অত্রাণ্ড উত্তেজক ঔষধের সঙ্গে কস্তুরী ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আরুর্সেনিক চিকিৎসা প্রণালীতেও উক্তাবস্থায় কস্তুরী ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ইহার কার্যের সঙ্গে আস্থা, আসাফিটিডা, ক্যাপ্টারিয়ান, বেলেরিয়ান, ক্যান্ফার এবং নাক্স মফাটাব কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, ইহার গন্ধেই উপকার পাওয়া যায়। অতএব ইহার ২য় বা ৩য় ক্রম অপেক্ষা উচ্চ ক্রমের জারবোক বা গুঁড়া, অর্থাৎ যাহাতে কস্তুরীর গন্ধ না থাকে, সে সকল ক্রম, ব্যবহারে বিশেষ ফল না পাওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। লেখকও ডাক্তার হিউজের উক্ত মতের পোষকতা করিতে অনিচ্ছুক নহেন, কারণ, তিনিও এরূপ বিশ্বাস করেন।

মিরিকা সেরিফেরা,-মিরিকা

(MYRICA CERIFERA,—MYRICA)

এই গাছের শিকড়ের ছাল দিয়া যথা নিয়মে মূল আর্যক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন “ম্যাসাচুসেট্‌স্ হোমিওপ্যাথিক সমিতির (Massachusetts Homoeopathic society) ৭ জন সভ্য এবং ডাক্তার জি, এন্স, ওয়াকার (Dr. G. S. Walker) শুল্ক শরীরে এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। উক্ত সমিতির সভ্যগণ এই ঔষধ খাইয়া বিশেষ কিছু অহুত্ব করেন নাই। ডাক্তার ওয়াকার বিশেষ সাহস সহকারে এই ঔষধ খাইয়া দেখিয়াছেন। ইহা খাইয়া তিনি দুইবার ভয়ানক আকারের কামল রোগের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার চর্ম পিঙ্কলের স্থায় হরিদ্রাবর্ণ; যকৃত এবং উদর প্রদেশে পূর্ণবোধ-মূল হরিদ্রাবর্ণ, কেণাযুক্ত, পরিমাণে অল্প; মল তরল, দুর্গন্ধযুক্ত, কাদার রসবিশিষ্ট, পিঙ্কশূন্য; অত্যন্ত দুর্বলতা এবং নিদ্রালুতা, প্রায় অর্ধ অচেতনার স্থায় ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। এই অবস্থার পড়োফিলাম্, লেপ্টাণ্ড্রা, নাক্স-বমিকা এবং মার্কিউরিয়াম্ সেবনে কোনও উপকার দর্শে নাই। অবশেষে ডিজিটালিস্ দ্বারা উপকার দর্শিয়াছিল। এই ঘটনার ইহাই প্রতীত হয় যে, মিরিকা দ্বারা বিষাক্ত হইলে যকৃতের পিত্তনিঃসারক নালীর (Bile-duct) শৈল্পিক রোগ হয়। অল্প মাত্রায় সেবনে অধিক মালার সেবনের বিপরীত ফল হয় কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ডাক্তার সার্প (Dr. Sharp) তাঁহার একটি বকুকে ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আঁরোক, ১ কোঁটা মাত্রায়, প্রাতে এক মাত্রা এক রাত্রিতে এক মাত্রা, একরূপ করিয়া ১ সপ্তাহ কাল খাওয়াইলেন। এই ঔষধ-বিনি খাইয়াছিলেন, ঔষধ খাওয়া কালীন এক সপ্তাহ কাল তাঁহার স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক ভেদ হইয়াছিল। তাঁহার মল স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক কিকা উজ্জল হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছিল। ক্যামোমিলা সেবনেও উক্ত প্রকারের অবস্থা ঘটয়া থাকে। অভ্যেব কামল রোগে উক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলে মিরিকা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।”

শৈল্পিক বিস্তী, প্রধানতঃ পরিপাক সম্বন্ধীয় শৈল্পিক বিস্তীর উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দক্ষণ উক্ত শৈল্পিক বিস্তীর স্লেয়া জনিত অমুখ-উৎপন্ন হইয়া থাকে। যকৃতের উপর ইহার কার্য সর্বাপেক্ষা প্রবল, যাহার দক্ষণ যকৃতের নিসেবনের সঞ্চার হ্রাসিত থাকে এবং তদক্ষণ কামল রোগ (নেবা, -Jaundice) এবং তজ্জনিত অস্থান্ন অমুখও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতির লক্ষণ।

মনঃ। নিরুৎসাহ; মানসিক অবসরতা; সর্বদা থিট্ থিট্, চিড়্ চিড়্ করা; কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট না হওয়া; সর্বদা মন কেমন কেমন করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ।

মস্তক। মাথাধোর, উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার ভাব, মাথার

চিমাবোধ ও মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে মাথা এবং মুখ মণ্ডলে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বিগ; কপাল, কপালের দুই পার্শ্ব এবং ঘাড়ের বেদনার উদ্রেক হইয়া শুম ভাঙ্গিয়া যায়; চক্ষুর মধ্য এবং উপরে ভারিবোধ ।

চক্ষু । চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ এবং উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; চক্ষু ভারিবোধ; ঘুম ভাঙ্গিলেও চক্ষুর উক্ত প্রকারের অবস্থা; পুস্তকাদি পাঠ করার সময় চক্ষু সহজে ক্লান্ত হয় এবং জ্বালা করে (কন্স, রুটা, দিপিয়া); চক্ষুর পাতায় ভারিবোধ (কোনাগাম্, জেল্‌স্) ।

মুখমণ্ডল । মুখ মণ্ডল হরিদ্রা বর্ণ, কামল রোগের স্থায় (টেলি-ডন, চায়না); মুখ মণ্ডলে পূর্ববোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণবোধ ও দণ্ডপানি, বহির্জ্বাসূত বেড়াইবার পরই যাহা অধিক হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা পৃক, হবিদ্রার আভাযুক্ত কালচে, শুষ্ক মানডিব (চুনটীর) স্থায় লেপযুক্ত, বাহার দ্রুণ জিহ্বা সঞ্চালন প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে; মুখে পচা বিস্ত্রী স্বাদ, বাহার দ্রুণ রোগী থাইতে পারে না; মুখে তিক্ত, বমনোৎপাদক স্বাদ; গাল গহ্বরের বিস্ত্রী এক প্রকার চট্‌চটিয়া আঠা পদার্থ দ্বারা আবৃত; মুখ গহ্বরের উপবিভাগে (তালুতে) শুষ্ক নামড়ি পড়ে, বাহা জ্বলে ভিজে না এবং দিগলিত করিতে পারা যায় না; মুখগহ্বর শুষ্ক; পিপাসা, জল পানে যাতাব ক্লমিক হাঁস বা উপশম হয় । গলার মধ্যে রসির স্থায় শৈথিল্য সঞ্চার, বাহা সহজে উঠে না বা নির্গত হয় না; গলার মধ্য এবং নাসিকার মধ্য এক প্রকার তর্জকযুক্ত চট্‌চটিয়া আঠা পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ, বাহা সহজে উঠে না বা পড়ে না (আমন-কার্ক, নাইট্রিক-আস্, ফাইটোন); আহারবহা গমনাতীত উপবিভাগে শুষ্ক বোধ এবং টাটানি, বাহার দ্রুণ মনে হয় যেন গলার মধ্য কাটিয়া যাইবে এবং কোন দ্রব্য গিলিতে পারা যাইবে না ও অবশেষে গিলিতে অশক্তি হইয়া পড়ে; আহারবহা গমনাতীত উপবিভাগে চট্‌চটিয়া আঠা ফেণাযুক্ত শৈথিল্য সঞ্চার, সঙ্কোচে গলার থেকুব দিলেও বাহা নির্গত হয় না এবং বাহার দ্রুণ মুখে বিস্ত্রী স্বাদ হয় ও তদ্রুণ আহারের ব্যাঘাত জন্মে ।

পাকস্থলী এবং উদর । ভাঙাতাড়ি আহার করিলে ঘেঁরুণ হয়,

পাকস্থলীতে সেক্রণ পূর্ণ বোধ, অথচ ক্ষুধা থাকে (চায়না, লাইকোপ্); ক্ষুধা বা রুচি থাকে না; আহারে অরুচি বা অনিচ্ছা; পাকস্থলীতে পূর্ণ, চাপা, হ্রস্ব এবং পড়িয়া যাওয়া বা পেটে পিঠে লাগার ভ্রাস অনুভূত হয়। বক্রত প্রদেশে ঘৃশ্ ঘৃশে বেদনা এবং পূর্ণ বোধ; নিজ্রাবেশ; হ্রস্বতা; মল ছাইয়া বা কাদার রঙ্গ বিশিষ্ট; কামল রোগ; পেট কামড়ানি; উদরে গড়্-গড়্, কল কল শব্দ হয়; বারম্বার বাহ্যেব বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত না হইয়া কেবল কতক পরিমাণে দূষিত বায়ু নির্গত হয়; পেটে এক প্রকারের অস্থব বোধ, বাহার দ্রুণ মনে হয় যেন উদরাময় আরম্ভ হইবে।

মল। শুষ্কতার দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ; মল তরল, গোলাপির ভ্রাস এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোষপাড়া এবং নাড়ি প্রদেশে খিল খদ্য ভ্রাস অনুভূত হয় (কলোস); মল ফিকা বরিজা বর্ণ, ছাইয়া বা কাদার রঙ্গ বিশিষ্ট (ক্যাক্-কার্ক্, ডলিকস্, হিপ্-সাল্ফ্, পডোক্); কামলরোগ।

মূত্র। মূত্র বিয়াব (Beer) নামক সুরার রঙ্গ বিশিষ্ট, কেশান্ত; মূত্রে গোলাপীর আভাযুক্ত কটাবর্ণের ভলানি পড়ে; মূত্র পরিমাণে অল্প।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপিণ্ডেব কার্য্য করার শক্তি বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু নাড়ী প্রতি মিনিটে ৬০ বারের অধিক স্পন্দন করে না; নাড়ী হ্রস্ব এবং অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশে ঘৃশ্ ঘৃশে রকমের কন্কনানি এবং কদম্বা ধরার ভ্রাস বেদনা, অলসবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা।

নিদ্রা। নিজ্রা ভাব; মাথাঘোবা; অর্দ্ধ চেতনা; অস্থিরনিদ্রা, অথবা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ভাল ঘুম হয় এবং ঘুম ভাঙিলেই যেন সমুদ্র অনুধের শক্তি হয়।

জ্বর। ঘরের বাহিরে গেলে শীতবোধ; কোমরের স্থানে স্থানে সামান্য রকমের কন্কনানি; শরীরের সামান্য উত্তেজনার অবস্থা এবং অরবোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে শীতবোধ; যেকদণ্ডের মধ্য দিয়া

আগা গোড়া উষ্ণাশুভব এবং তৎপর শীতবোধ ও সামান্য বর্ষ্য; মুখবগ্নস্ফীত, লালবর্ণ এবং টলটলে।

চর্ম্ম। শরীর কামল রোগের জ্বর হরিদ্রাবর্ণ; পোকায় কামড়াইলে; বেরূপ হয়, শরীর সেরূপ চুলকায়।

ব্যবহার। ঐন্দ্রিয়িক ঝিল্লী, মুখগহ্বর, আহারবহা গলনালী, যকৃতের পিত্তনিঃসারক নালী ইত্যাদির স্বেদাধ্বনিত অম্লত্ব; যকৃতের অম্লত্ব; কামল রোগ ইত্যাদিতে মিরিকা সেরিকেরা ব্যবহার্য। ডাক্তার ফারিংটন (Dr. Farrington) বলেন যে, ইহা সমুদয় শরীরকে ভয়ানকরূপে আক্রমণ করে এবং শরীরের অভ্যন্তর দুর্বল বা বিকারের অবস্থায়, কামলরোগ থাকুক, আর না থাকুক, শরীরের দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে ঐন্দ্রিয়িক ঝিল্লী বিকৃতিবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জিহ্বা, মুখগহ্বর এবং আহারবহা গলনালীর উপরিভাগে অল্পপরিমাণ চট্‌চট্টিয়া আঠা মাম্‌ড়ী উৎপাদক পদার্থের সঞ্চয় হইলে, এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। লেখকের ১৬ দিবস বয়স্ক আতুড়ের একটি পুত্র সন্তানের কামল রোগ হয়। কামল রোগের বত রকম ঔষধ আছে ত্রীমুক ডাক্তার মহেক্স জাল সরকার, এম. ডি. মহাশয় তাহার সমুদয়ই ব্যবস্থা করিয়া কোনও ফল না পাইয়া তিনি অবশেষে মিরিকা সেরিকেরা ব্যবস্থা করিলেন। ইহা দ্বারাও কোনও ফল দর্শিত না। এরূপ লেখকও ৭৬টী রোগীর চিকিৎসায় এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল পান নাই। কিন্তু ভৈষজ্য তবে বেরূপ পাঠ করা যায়, তাহাতে কামল রোগে এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শিত হইবে অধিক সম্ভাবনা।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সামান্য রকমের স্নায়বিক উত্তেজনা এবং অস্থিরতা ও উহার পরফণি গা বমীবমী, করা এবং দুর্বলবোধ; সমুদয় পেশীতে বেদনা ও টাটানি এবং তদ্রূপ উহা সঞ্চালনে অশক্তি; অলসবোধ এবং মানসিক অবসন্নতা ইত্যাদি এই ঔষধের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। ডিজিটালিস, চেলিডোনিয়াম, পডোফিলাম্।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য় এবং ৩য় ক্রমের আরোক ব্যবহার্য।

কোন কোন চিকিৎসক ইহার মূল আরোকও ব্যবহা করিয়া থাকেন।
লেখক ইহার ১ম হইতে ৬ষ্ঠ ক্রম এবং মূল আরোকও ব্যবহার করিয়া দেখি-
য়াছেন। ঐহার মধ্যে মূল আরোকে রোগের লক্ষণাদি বৃদ্ধি পায়।

ইনাথ্রি ক্রোকোট, -ইনাথ্র.

(*ENANTHE CROCATA*, -*ENANTH.*)

এই গাছের শিকড় গধানিয়মে প্রক্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল
আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসেবকা মজ্জা সহজীয় স্নায়ুগু-
লীতে ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ মূগীবোগের জ্বর আক্ষেপ এবং
মেডাল অবলংগেটা (*Medulla Oblongata*) ও উগ্রা নিকটবর্তী অংশের
প্রদাহ এবং কোম্পলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা এক প্রবল বিষাক্ত ঔষধ
মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। উগ্র প্রণাপ (বেল্, ক্যাছ্, ট্রাইমন), যাহার দরুণ মনে হ্রস্ব
যেন রোগী মদ্যপান করিয়াছে (ওপিয়াম্) ; উন্নততা ; হঠাৎ চেতনা রহিত
হওয়া (বেল্, ওপিয়াম্)।

মস্তক। প্রবল মাথাঘোরা এবং তদরূপ পড়িয়া যাওয়া ও উহার
সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বগ, বমন, অজ্ঞানবৎ মূর্ছা এবং আক্ষেপ বা কন্বাল-
সন্দ ; মাথার প্রবল বেদনা ; সংজ্ঞা রোগের জ্বর অবস্থা ; বাকরোধ
এবং অচেতনতা ; মুখমণ্ডল ক্ষীণ এবং টল্টলে ও নীলের আভাষিত ;
চক্ষুর তারি বিস্তৃত ; শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত ; দাঁত
লাগা (বেল্) ; আক্ষেপের পর যোর অচেতনতা।

চক্ষু। চক্ষুর তারি বিস্তৃত (বেল্, হায়োস্, ওপিয়াম্, ট্রাইমন) ;
চক্ষু উপর এবং মধ্যদিকে উণ্টান।

নাসিকা । নাক দিয়া রক্তস্রাব ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলের পেশীর তাড়াতাড়ি আক্কেপিক স্পন্দন (আগারিকাশ্, বেল্, সিকুটা, নাক্স-বম্ ইগ্নেস্) ; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ এবং উহার শিরাদির ক্ষীতি, শিটা এবং শীতল, ভয় উৎপাদক এবং উদ্বেগযুক্ত ; দাঁতলাগা, বাহার দ্রুণ মাড়িতে মাড়িতে অত্যন্ত শক্তভাবে আঁটিয়া থাকে (আবিসিহ্, সিকুটা, ইগ্নেস্, হায়োস্, লরোস্, নৈজা, নাক্স-বম্) ; মুখমণ্ডলে গোলাপী রঙের ফুসুড়ী ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা ক্ষীত এবং মুখের বাহির হইয়া পড়ে এবং সামান্য কার্য্যকৃত (Furred ; মুখে ফেগাউঠা (সিকুটা, কুগ্রাম্, হায়োস্, লরোস্) ; মুখে রক্তমিশ্রিত স্লেয়ার স্ফার ; মুখগহ্বর শুষ্ক এবং উষ্ণ ; বাকরোধ । গলাব মধ্যে ভয়ানক আঁটিবোধ এবং জ্বালা ।

পাকস্থলী এবং উদর । হিক্কা ; পাকস্থলীর জ্বংপিণ্ডের নিকট-বর্ত্তী অংশের বেদনা এবং উহার সঙ্গে বমন বা বমনোদ্বেগ ; উদর অত্যন্ত ক্ষীত এবং বিস্তৃত ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শূল বেদনার স্রাব বেদনা ।

মল । অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মল নির্গমন ; উদরাময় ।

শ্বাসযন্ত্র । নিশ্বাস প্রাশ্বাস আক্কেপিক ; নিশ্বাস প্রাশ্বাস কষ্টকর, ঘন ঘন, গোঁ গোঁ, ষড়্ ষড়্ শব্দ বিশিষ্ট ; অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস, আক্কেপিক কাশির লক্ষণ বাহার ব্যাঘাত জন্মে ; নিশ্বাস প্রাশ্বাস অনেক সময় অস্বাভাবিক হইয়া না ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে বেদনা ; নাড়ী কুহ, দুর্বল, অনিয়মিত গতিবিশিষ্ট এবং লুপ্তপ্রায় ।

জ্বর । শরীর অত্যন্ত শীতল এবং শরীরের স্বাভাবিক সত্তাপের অভাব । প্রচুর ঘর্ম্ম ; দুর্বলযুক্ত ঘর্ম্ম ।

ব্যবহার । মৃগী রোগের আক্কেপ ; শৈশবাবস্থা এবং গর্ভাবস্থার মৃগীরোগের আকার বিশিষ্ট আক্কেপের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । মৃগীরোগের স্রাব আক্কেপ ; ভয়ানক আকারের আক্কেপ হইয়া তৎপর বোর অচেতনতা এবং বোর নিদ্রা ; আক্কেপের সঙ্গে সঙ্গে মাথাধোরা, পাগলামি, বমনোদ্বেগ বা বমন, অচেতনতা, চক্ষুর তারা বিস্তৃত, চক্ষুর গোলক উপরদিকে উল্টান ; হঠাৎ আক্কেপের

আক্রমণ, দাঁতনাগা, জিহ্বা কামড় পড়া এবং তৎপর সম্পূর্ণ অচেতনতা ; আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল ক্ষীত এবং টল্‌টলে ও নীলের আভাযুক্ত ; নাক মুখ দিয়া রক্তমিশ্রিত ফেণা নির্গমন ; নিশ্বাস প্রবাস আক্ষেপিক ; স্পর্শ-জ্ঞান রহিততা ; নাড়ী দুর্বল এবং অত্যন্ত বলক্ষয় ; জলে সমুদয় লক্ষণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি ইনাই ক্রোকেটার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আগারিকাশ, দিক্টা, এথুজা, ট্র্যামো-নিয়াম, হাইড্রোম্যেনিক্‌ আসিড্‌ ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় ডাইলুশন ব্যবহার্য্য ।

পিটোলিয়াম,-পিট্রোল্‌

(PETROLEUM,-PETROL.)

কোন এক বিস্তৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত পিট্রোলিন্‌ নাম্‌ ক্রয় করিয়া যথানিয়মে সেক্টকাইড্‌ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার নিশ্ব আবেক প্রস্তুত করিতে হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । চৰ্ম্ম এবং শৈথিল্যিক কিল্লীর উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল । ইহা চৰ্ম্ম ও শৈথিল্যিক কিল্লীকে উত্তেজিত করে, বাহার বিষয় নিম্নে বিশেষরূপে বিবৃত হইতেছে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । রোগী অত্যন্ত উগ্র, চটা, খিট্‌খিটে এবং সহজেই বিরক্ত হয় (ক্যাম্প, নাম্‌-বন্‌) ; অত্যন্ত ভয়ানক এবং তদ্রূপ সামান্য কারণেই ভয় থাওয়া (নাম্‌-বন্‌, ওপিয়াম্‌) ; চেতনামূখ হওয়া ; সর্বদা চিড়্‌ চিড়্‌, বক্‌ বক্‌ করা এবং কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অনিচ্ছা ; প্রণাম ; রোগী মনে করে যেন কোন এক ব্যক্তি তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, অথবা সে যেন দ্বিগুণ হইয়াছে, অথবা তাহার একটা অঙ্গ যেন দ্বিগুণ হইয়াছে ।

মস্তক । মাথা হেট করিয়া উপড় হইলে বা বগা অবস্থা হইতে

দাঁড়াইলে মাথাঘোরা (বেল্) ; মাথায ঢিমা এবং ভারিবেধ ; রাগের দরুণ শিরঃপীড়া, অথবা উপবাসের পর প্রাতঃকালে মাথাধরা ; কপালে চাপিয়া ধরার ভায় ঘৃশ্-ঘৃশে বেদনা ; একখানি নীসা চাপাইয়া রাখিলে যেক্রপ হয়, মাথার পশ্চাৎদেশে সেক্রপ চাপা এবং ভারিবেধ ; মাথার পশ্চাৎদেশে ঘৃশ্-ঘৃশে রকমের দগ্ধপিবা বেদনা ; মাথার চুল পড়িয়া যার (গ্রাফ্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, কস্, সিপিয়া) ; মাথায় কল্-তানি, বিশিষ্ট বিকচ (Uzema), মাথার পশ্চাৎদেশেই বাহা অধিক হয় (ট্রাইকোপ্, সিপিয়া) ; মাথার আর্জ্, চুলকানি বিশিষ্ট বিকচ, চুলকাইলে বাহা অত্যন্ত জ্বালা করে এবং টাটার (গ্রাফ্, লাইকোপ্, মার্ক্) ।

চক্ষু । চক্ষু সকালনে চক্ষে জ্বালা এবং চাপাবোধ (কুটা) ; চক্ষু প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চুলকানি ও স্ফীতি বিধানের ভায় যাতনা ; কৃষ্টি হীনতা ; মনে হয় যেন চক্ষু একখানি পাতলা কাপড় দ্বারা ঢাকা রহিয়াছে (কষ্ট্, পাল্‌স্) ; চক্ষুর পাতায় চুলকানি, যাহার দরুণ রোগী চক্ষুর পাতা রগড়াইতে বাধ্য হয় ।

কর্ণ । কানের মধ্যে প্রদাহ এবং বেদনায়ুক্ত ক্ষীতি ; কানে কন্ড শব্দ ; কানে সোঁ সোঁ, টনটন এবং কেড়্ কেড়্ শব্দ হওয়া (বেল্, চায়না) ; কানের পশ্চাৎভাগে কল্-তানি বিশিষ্ট ক্ষত (ক্যাক্-কার্ক্, গ্রাফ্) ।

নাসিকা । নাকদিয়া রক্তপড়া (একন্, বেল্, ব্রাই, হ্যামোমেনিস্) ; নাকের মধ্যে অধিক পরিমাণে স্লেম্মার সঞ্চার ; নাসিকার অগ্রভাগের চুলকানি ।

মুখগহ্বার এবং গলার মধ্য । নাড়ির ক্ষীতি ; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত (অ্যান্টি-ক্লড্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্) ; মুখে জ্বল্জ্বল (হিপ্-সাল্‌ফ্, অ্যায়োড্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, মার্ক্, নাক্স-বম্) ; মুখে চটচটিয়া টক, তিক্ত স্বাদ (অ্যাস্, ব্রাই, পাল্‌স্) ; মুখে স্লেম্মার সঞ্চার (অ্যায়োড্, মার্ক্) ; ওষ্ঠের কোণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার ভায় ক্ষুদ্রী । ভ্রূহাতির নিম্নস্থিত গ্রন্থির (Sub-maxillary glands) ক্ষীতি (ব্যারাইটা-কার্ক্, ক্যাক্-কার্ক্, নেট্রাম্-কার্ক্, রাস্‌টক্স্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । মলত্যাগের পর চৰ্ষ্টক্কা ; শিপাসা

এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ার (Beer) নামক মদ্য পানের স্পৃহা (ককিউল, পাল্‌স্‌) ; উষ্ণ এবং টক উদ্‌গার উঠা ; অপরাহ্ন বা সন্ধ্যাকালে বুক জ্বালা ; শ্রাতঃকালে অনবরত বমনোদ্যোগ এবং গা বমী বমী করা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে জল উঠা ; নৌকা বা গাড়ীতে যাতায়াতে নৌকাদির আন্দোলনে বমন বা বমনোদ্যোগ (ককিউল, নাক্স-মক্স) ; প্রবল বমন (অ্যান্টি-টার্ট, ইপিকাক্স) ; পাকস্থলীতে ভারি এবং চাপাবোধ (নাক্স-মক্স) । উদরে কর্তনবৎ প্রবল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্যোগ ও উদবাময় ।

মল । দিনের বেলা উদরাময় এবং দান্তেব পূর্বে উদবে বেদনা ; মল কঠিন বাহ্য অতি কষ্টে নির্গত হয় ; চট্‌চটিয়া আঁঠা মল ভেদ ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রভ্যাগের পর অনবরত মূত্র গড়াইয়া পড়া (কষ্ট, ট্রায়মন্‌) ; বারম্বার অল্প পরিমাণে মূত্রভ্যাগ ; মূত্র নালাতে জ্বালাহুতব ।

জননেন্দ্রিয় । অপ্রকোষাবধারে চুলকানি এবং ভিজাবোধ (সাইলিসি) । স্ত্রীলোকের বোনির বহির্দেহ ভিজা এবং উহাতে জ্বালা, টাটানি এবং চুলকানি ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে রজঃস্রাব ; রজঃস্রাবের স্রবণ যোনিদ্বার চুলকায় ; স্তনের বোটা চুলকায় এবং মনে হয় যেন উহাতে ভাতের ফেণের গ্ৰাঘ কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বরভঙ্গ (কার্কো-বেজ্‌, কষ্ট, ফন্‌, সাল্‌ক্স) ; রাস্ত্রিতে গুহকালি (কোনায়াস, হায়োস্‌, পাল্‌স্‌, সাল্‌ক্স) ; রাস্ত্রিতে বুক কষ্টাহুতব ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় ভারিবোধ এবং বেদনা ; পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরে বেদনা ; বসিয়া থাকিলে গুহ্রাবের ঠিক উপরিভাগের ঘাড় বেদনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । বাহ্য অত্যন্ত হর্ষলতা ; স্পর্শ করিলে হাতের নখে ধৌতলিয়া ঘাওয়ার গ্ৰাঘ বেদনা ; আঙ্গুলের আগা খস্‌খস্‌, ফাটায়ুক্ত এবং উহাতে ঘাটিয়া ধবার গ্ৰাঘ বা কর্তনবৎ বেদনা এবং উহা লালবর্ণ, ছাল উঠিয়া ঘাওয়ার গ্ৰাঘ জ্বালাযুক্ত হয়, সর্বদা ভিজা থাকে ও উহাতে সর্বদা পুঁক মাগ্‌ড়ী (চুমটা) পড়ে । পায় চুলকানি, জ্বালা এবং কলতানি বিশিষ্ট ফুস্‌ড়ী ; পায়ের গোড়ালী অত্যন্ত ক্ষীণ, লালবর্ণ,

বেদনাযুক্ত এবং উহাতে স্থলী বিধানের দ্বারা অম্লভূত হয় ও ফোঁকা পড়ে ।
পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার দ্বারা ক্ষত (আগারি-
কাশ, নাইট্রিক্-আস্, জিক্‌স্) ; পায়ের কড়ায় জ্বালা এবং স্থলীবিধানের
দ্বারা অম্লভূত হয় ; পায়ের আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থানে ফুসুড়ী (ক্যাক্-কার্ণ্,
ক্যাম্‌ফার, নাক্‌স্, নাইট্রিক্-আস্, পিপিরা) ; পায়ের পাতায় প্রচুর ঘর্ষ
(সাইলিসি) ; রাত্রিতে পায়ের পাতায় তলার খিলখরা (সাল্‌ফ্) ।

চর্ম্ম । চর্ম্ম অম্লভূত ; সামান্য আঘাতেই ক্ষত এবং বিস্তৃত হয়
(বোরাক্‌, ক্যাম্‌, হিপ্-সাল্‌ফ্, গ্রাফ্, সাইলিসি, সাল্‌ফ্) ; পুরাতন
আকারের কল্‌তানি বিশিষ্ট বিকচ (Eczema), বাহার দৰ্শন আক্রান্ত স্থানে
ক্ষত হওয়া বা ছাল উঠিয়া যাওয়ার দ্বারা অম্লভূত হয় (গ্রাফ্) ; সমুদয়
শরীরের চর্ম্মই টাটায়, বাহ্যিক দৰ্শন পায়ের কাপড়ও অম্লভূত হয় এবং উহার
দৰ্শন ঘাতনার উদ্বেগ হয় (বেল্) ; গায় ক্ষত এবং ক্ষত হইয়া ফুটানের দ্বারা
বেদনা ও উহাতে অতিরিক্ত মাংস বৃদ্ধি (Proud Flesh) হয় (কার্বো-
বেজ্, নাইট্রিক্‌ আস্) ; অনেক সময় গায় গভীর ক্ষত হয় বাহার প্রোক্ত
উচ্চ থাকে ।

কাবহার । ক্রোধ এবং বিরক্তি জনিত অম্লভূত ; বিকচ (Eczema) ;
নাদের দ্বারা ফুসুড়ী (হাৰ্পিস্, Herpes) ; লোনা জল ব্যবহার করার দৰ্শন
গায় ফুসুড়ী ; হাত পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার দ্বারা
বা ; পাকস্থলীর অম্লভূত ; জলপথে নৌকা জাহাজাদিতে চালবার সময় বমন
বা বমনোদ্বেগ (Sea-sickness) ; গর্ভাবস্থায় বমন বা বমনোদ্বেগ (Mor-
ning sickness) ; গর্ভাবস্থায় চাক্ষুস্কৃত আহার দ্রব্যে অক্লান্ত ; বোগলে দুৰ্গন্ধ-
যুক্ত ঘর্ষ ; পায়ের পাতায় দুৰ্গন্ধযুক্ত ঘর্ষ, বাহার দৰ্শন অনেক সময় ক্ষতও
হইয়া থাকে ; বধিরতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে শব্দ হওয়া ; মূত্রনালা,
অরায়ু, অগ্নি এবং বায়ু উপনলের প্রেক্ষা জানিত রোগ ইত্যাদি অম্লভূত
পিট্টোলিয়ায় ব্যবহায্য । টেষ্ট্রি (Teste) মতে, শিশু বা বালক বালিকাগণের
আমায় রোগে এই ঔষধ হাঁপকাউএনার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ব্যবহারে
বিশেষ উপকার দর্শে । ডাক্তার গারেন্সি (Dr. Guereusy) বলেন যে,
গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পেটের অম্লভূত এই ঔষধ বিশেষ উপকারী । তিনি

আরো বলেন যে, কেবল দিনের বেলা উদরাময় এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেন অসাড় এবং তৎপর শক্তি হয় ; সন্ধির বাতজনিত কঠিনতা এবং চলিবার সময় উহাতে কেড়্ কেড়্ শব্দ হওয়া ; বহির্বিষ্য ভাগ লাগে না ; সানাত্য কারণেই সর্দি লাগে ; গর্ভাবস্থায় চর্বিযুক্ত দ্রব্যে অকতি, পেটের অসুখ এবং তন্দ্ররূপ কেবল দিনের বেলাই উদরাময় ইত্যাদি পিষ্টো্যালিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । বেলান্ডোনা, ব্রাউনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া কার্ণ, ক্যামোমিলা, ককিউলাস্, গ্রাফাইটিস্, ইগ্‌নোমিয়া, লাইকোপক্টিয়া, নাক্স-বমিকা, কক্করাস্, পান্‌গেটিনা, রাস্টেজ্, পিপিয়া, সাইলিসিয়া, সাল্‌কার ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ককিউলাস্, নাক্স-বমিকা ।

ডাইনুশন বিচার । নোকা বা জাহান্নাদিতে বাতায়ান্তের সময় বমন বা বমনোদ্বেগ, গর্ভাবস্থায় বমন বা বমনোদ্বেগ ইত্যাদি অস্থখে ডাক্তার বেজের (Dr. Bayes) মতে ৩য় দশমিক ক্রমের আবেক ব্যবস্থা । ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক সচরাচর ব্যবহার করিয়া আমরা যথোচিত ফল পাইয়া থাকি ।

রেনান্কুলাস্ বাব্বোসাস্,- রেনান্কুল্

(RANUNCULUS BULBOSUS,-RANUNC-BULB.)

ইউরোপের অনেক স্থানেই মাঠ বহুদানে এই গাছ জন্মে । গাছের সমুদয় অংশ যথানিয়মে প্রক্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । চর্ম্ম এবং পৈশিক অংশের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল । বৃকের প্রাচীর আক্রমণ করা এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রকৃতি

মধ্যে পরিগণিত । ইহা বৃকের মধ্যে প্লুরোডিনিয়ার (Pleurodynia) জ্বারঃ
অস্থি উৎপাদন করে । অতএব উক্ত অস্থি এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে চিন্তার বিষয়টী এক-
বারেই স্মরণ থাকে না ; স্থূল বুদ্ধি অথবা রোগী কোন বিষয় বৃদ্ধিতে পারে
না ; সর্বদা চিড়্ চিড়্ করা এবং ঝগড়া করার স্বভাব ।

মস্তক । ঘরের ভিতর হইতে বহির্কায়ুতে গেলে মাথাঘোরা এবং
তন্দ্ররূপ টলিয়া পড়িয়া যাওয়ার ভয় ; মনে হয় যেন মাথা স্বাভাবিক
অপেক্ষা অনেক বড় এবং বিস্তৃত (ম্যাগ্-কার্ক) ; মাথায় রক্তাধিক্য বা
রক্তাবরোধ (একন্, বেল্) ; ডাইন চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা, শয়ন করিয়া
থাকিলে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং চলিয়া বেড়াইলে বা দাঁড়াইয়া থাকিলে যাহার
উপশমন হয় ; কপালে চাপিয়া ধরার জ্বায় বেদনা, যাহা বহির্দেশ হইতে আরম্ভ
হইয়া মধ্যদেশ পানে বিস্তৃত হয় ; প্রায়ই উষ্ণ স্থান হইতে শীতলস্থানে এবং
শীতল স্থান হইতে উষ্ণ স্থানে গেলে শিরঃপীড়ার উদ্রেক বা বৃদ্ধি হয় ।

চক্ষু । চক্ষুর গোণকে চাপাবোধ ; চক্ষুর পাতায় জ্বালা এবং চিড়িক
মারা ; চক্ষু এবং চক্ষুর কোণে জ্বালা, টাটানি এবং চিড়িকমারা ; চক্ষুর
সন্মুখে কৃষ্ণাশ্র জ্বায় দেখায় ।

কর্ণ । কানের মধ্যে স্ফটিকবিধানের জ্বায় অল্পভূত হয় এবং যাহা
সন্ধার সময়ই অধিক অল্পভূত হয় ।

নাসিকা । নাসিকা লালবর্ণ, প্রদাহযুক্ত, ক্ষীত এবং উহাতে কনিয়া
ধরার জ্বায় বেদনা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখে সাদা লাগ উঠা এবং উহারঃ
সঙ্গে সঙ্গে মুখে তামার জ্বায় স্বাদ । গলার মধ্যে অধিক পরিমাণ আঁটাল
শ্লেষ্মার সঞ্চয় ; গলার মধ্য এবং তালুকার প্রদাহ জনিত জ্বালাযুক্ত বেদনা ।

পাকস্থলী এবং উদর । অপরাহ্নে পিপাসার বৃদ্ধি ; বারম্বার
উদগার উঠা ; আক্কেপিক হিকা (হায়োস্, ইগ্‌নেস্) ; অপরাহ্নে বমনোদ্রেক
এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন মাথাঘোরা ; পাকস্থলীর মধ্যে চাপাবোধ

(আস্‌, ব্রাই, পাল্‌স্‌); পাকস্থলী এবং হৃৎপিণ্ডেব নিকটবর্তী পাকস্থলীর মুখে এবং পাকস্থলীতে আলাহুভব। মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁতলিয়া গেলে যেরূপ হয়, উদরের হুই পার্শ্বে সেরূপ বেদনা ; যকৃত প্রদেশে স্থচীবিধানের জ্বায় যাতনা, বাহার দক্ষণ শ্বাসরোধ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ডাইন স্বক্কে উপরিভাগে স্থচীবিধানের জ্বায় যাতনা ; উদরে চিন্‌ চিনে বা কর্তনবৎ বেদনা; খেঁতলিয়া গিয়া ক্ষত হইলে যেরূপ হয়, চাপিলে উদরে সেরূপ টাটানি ।

শ্বাসযন্ত্র । নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং শ্বাস কষ্ট ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে আলাহুভব এবং স্থচীবিধানের জ্বায় তীক্ষ্ণ বেদনা ও দীর্ঘনিশ্বাসের ইচ্ছা এবং অত্যন্ত ক্রন্দন ; বৃকে স্থচীবিধানের জ্বায় যাতনা, নড়া চড়া, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, অথবা নিশ্বাসে বাহার বৃদ্ধি হয় (ব্রাই) ; চামড়ার নীচে ক্ষত হইলে যেরূপ হয়, বৃকে সেরূপ টাটানি (আর্দিকা), আঘাত লাগিলে বা নড়া চড়াতে বাহার বৃদ্ধি হয় (সেনিগা) ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশে বেদনা ; ক্ষুদ্র পীজরা প্রদেশে অবশবোধ এবং উহাতে মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁতলিয়া বা ওয়ার জ্বায় বেদনা ; চলিবার সময় কোমর প্রদেশের ডাইন পার্শ্বে স্থচীবিধানের জ্বায় যাতনা এবং উহাতে সামান্ত রকমের আলাহুভব ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । বাহ্যে বাতের বেদনার আকার বিশিষ্ট আক্ষেপিক বেদনা ; বাহু, হাত এবং হাতের আঙ্গুলে স্থচীবিধানের জ্বায় যাতনা ; আঙ্গুলের কোন কোন অংশে কন্‌ কনানি ; হাতের পাতা এবং আঙ্গুলে ফোড়ার জ্বায় কুস্কুড়ী ; উরুর মধ্য দিয়া আগাগোড়া কসিয়া ধরায় জ্বায় বেদনা ; পূর্কাকে চলিবার সময় পা ইত্যাদিতে অত্যন্ত দুর্বলতা ; দাঁড়াইয়া থাকিলে পায়ের গোড়ালীতে স্থচীবিধানের জ্বায় দগ্ধপানি ।

চর্ম্ম । অনেক রাত্রিতে ঘুম হয় এবং রাত্রিতে বারবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; ঘুম ভাল হয় না ।

ব্যবহার । পেশী এবং সন্ধিবাৎ রোগ, বিশেষতঃ পীজরার হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের পেশীবাৎ ; কুক্ষু সাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pleurisy) ; কৃত্রিম কুক্ষু সাবরক ঝিল্লী প্রদাহ বা প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) ; আমবাৎ ;

টেটার (Tetter) ; পেম্ফাইগাস্ (Pemphigus) ; সাংঘাতিক রকমের ক্ষত বাহা শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত হয় ইত্যাদি অস্থে এই ঔষধ ব্যবস্থা। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, কটিবাত (Sciatica), দাঁদের জ্বাৰ কুস্কুড়ী, বাতজনিত স্নায়ুশূল, বিকচ (Eczema), পাঁজরের হাড়ের মধ্যবর্তী অংশের স্নায়ুশূল ইত্যাদিতে ইহা বিশেষ উপকারী। ডাক্তার আলেন্ এবং নর্টনের (Drs. Allen and Norton) মতে চক্ষুর কোটিবাতের উপরিভাগের স্নায়ুশূলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ডাক্তার বেজ্ (Dr. Bayes) বলেন যে, যে প্রকার ফুফুসাবলক স্নায়ী প্রদাহ (Pleurisy) এবং বক্ষশোথ (Hydrothorax) ভাইন পার্থ আক্রমণ করে, তাহাতে এই ঔষধ উপকারী। জাবার ডাক্তার গ্যারেন্সি (Dr. Guerey) বলেন যে, যে প্রকার শ্বেত প্রদর প্রথমতঃ অতি সামান্য আক্রমণ থাকে এবং তৎপর উগ্র জ্বালা উৎপাদক ও ক্ষত কারক হয়, তাহাতে বেনান্কুলাস্ বাঘোসাস্ বিশেষ উপকারী।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় শরীরে অবশ এবং ভারি বোধ ; মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁৎলিয়া গেলে যেকণ হয়, সমুদয় শরীরে সেক্রপ বেদনা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং পেশীতে খোঁচাবিধা, ছিঁড়িয়া কেলা এবং পেশীবাত বা সন্ধিবাতের জ্বাৰ বেদনা ; বহির্নিঃস্রাব পরিবর্তনে, প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময়, স্পর্শনে, নড়াচড়াতে, পাশ পরিবর্তনে এবং মদ্য পানে অস্থের বৃদ্ধি ইত্যাদি বেনান্কুলাস্ বাঘোসাসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। রাস্টেন্, ক্রিমোটস্, ইউফোবিয়াম্, ক্রোটন, মেজিরিয়াম্, সাবাডিল্লা, ষ্টাফিসেগ্রিয়া, ব্রাইওনিয়া, পাল্‌সেটিল্লা।

প্রতিষেধক ঔষধ। ব্রাইওনিয়া, ক্যান্‌ফার, পাল্‌সেটিল্লা, রাস্টেন্।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য় এবং ৩য় ক্রমের আরোফই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রুম্ পাল্‌মেটাম্,-রুম্বার্ব,-রুম্

(RHEUM PALMATUM,-RHEUBARB,-RHEUM)

চীনদেশ, চাইনিজ টার্টারি এবং তিব্বৎ দেশে এই গাছ জন্মে। ইহার শুকনা শিকড় যথানিয়মে প্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। বৃক্ক এবং অন্ত্রনালীর (Intestinal Canal) উপর ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ পিত্তের সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হয় এবং অন্ত্রের শেলীর কার্যের চাকলা বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ স্বাভাবিক মল ভেদ হয়, কিন্তু উহার দরুণ অন্ত্রে কোন প্রকারের প্রদাহ উৎপন্ন হয় না। মলে অভ্যস্ত টক গুরু থাকা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। শিশু বা বালক বালিকাগণ নানা দ্রব্য চাহে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদে।

মস্তক। শূশ্‌শূশে রকমের অবসরকারক শিরঃপীড়া; মাথায় ভারিবোধ।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলে নীতল ঘর্ম (বিরেট্-আল্‌ব্‌), নাক ও ওষ্ঠের চতুষ্পার্শ্বেই বাহ্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

পাকস্থলী এবং উদর। অনেক প্রকার দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু যাচিত দ্রব্য দিলে তাহা পাইতে রোগীর রুচি হয় না (ক্যাম্‌, সিনা, ব্রাই); বমনোদ্বেগ যেন পাকস্থলী পিষা উদর হইতে আরম্ভ হয় এক্রপ অন্ত্রভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূল বেদনার স্থায় বেদনা; অতিরিক্ত পরিমাণে ঝাইলে বেক্রপ হয়, পাকস্থলীতে সেক্রপ পূর্ববোধ (চায়না, লাই-কোপ্‌, লাক্স-বম্‌, পাল্‌স্‌)। উদরে ভয়ানক আকারের কুর্জনবৎ মূল বেদনার স্থায় বেদনা, যাহার দরুণ রোগী হাঁটু ওটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় (আলোজ্‌, কষ্ট্‌, কলোস্‌, আইরিস্‌); পেট্‌ কামড়ানী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যের বেগ্‌।

মল এবং মলদ্বার । বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না (আম্‌, কোনায়াম্‌, নেট্রাম্‌ কার্ক্‌, নাক্স-বন্‌), নড়া চড়া এবং চলিবার সময় বাহার বৃদ্ধি হয় ; প্রত্যেকবার দান্তের পূর্বে উদরে শূন্য বেদনার স্থায় বেদনা (কলোস্‌, মার্ক্‌) ; আহ্বারের পথ বাহ্যে যাওয়ার ইচ্ছা ; তরল, কাইয়ের স্থায়, টকগন্ধযুক্ত মলভেদ (আর্বিকা, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, পডোফ্‌, সাল্‌ফ্‌) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দান্তের পূর্বে কৌথপাড়া, দান্তের পর শূন্য বেদনার স্থায় আঁটিয়া ধরা বা কর্তনবৎ বেদনা এবং দান্তের পর শীতকম্প (মার্ক্‌) ; প্রেমা মিশ্রিত কটাবর্ণের মলভেদ ও তৎপর অন্ত্যস্ত কষ্টদায়ক কৌথপাড়া এবং গুহ ও গুহদ্বারে ভয়ানক জ্বালাভূতব (আস্‌, সাল্‌ফ্‌) ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক আকারের কর্তনবৎ বেদনা, বাহার লক্ষণ মনে হয় যেন প্রত্যেকবার মলত্যাগের সময় কোমল প্রদেশস্থ মেকদণ্ডের হাড়ের বৃদ্ধি হইয়াছে ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । নড়া চড়ার সময় সমুদয় সন্ধিতে বেদনা ; যে পাশে শোয়া যায়, সে পার্শ্বের অঙ্গ একবারে অবশ বা অসাড় হইয়া যায় ; অনেকক্ষণ ধরিয়া বা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিলে যে রূপ হয়, উরুদেশে সেক্ষণ ক্রান্তিবোধ ; বাম হাঁটুর পশ্চাৎদেশে চাপিয়া বা কসিয়া ধরায় স্থায় বেদনা, পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত বাহা বিস্তৃত হয় ।

নিদ্রা । অস্থির নিদ্রা বা নিদ্রা ভাল হয় না এবং তদ্রূপ বারম্বার বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করা (একন্‌, রাস্টক্‌) ; জ্বঃ উৎপাদক বিষয়ে স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা ; ঘুমের অবস্থায় নিশ্বাসে গৌঁ গৌঁ শব্দ হওয়া ।

ব্যবহার । শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের এবং স্ত্রীলোকের স্নতিকাগারে টকগন্ধ বিশিষ্ট উদরানয়েই কম্‌ অধিক ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শিশুগণের টকগন্ধযুক্ত উদরাময় এবং মল স্বাভাবিক মলের স্থায় আকার বিশিষ্ট, কিন্তু তরল বা অর্ধতরল ; শিশুগণের গায় সর্বদা টক গন্ধ বাহা প্রতিদিন ভাল করিয়া জান করিলেও দূরীভূত হয় না ইত্যাদি এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । আবার ডাক্তার আলেন্‌ (Dr. Allen) বলেন যে, আহ্বারে বীতস্পৃহা বা অকৃতি

কমের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলে, ঠাণ্ডাতে অস্থখের বৃদ্ধি এবং গায় কাপড় দিলে বা উষ্ণতাতে অস্থখের উপশম। শুভপায়ী শিশুগণের দাঁত উঠার সময় অস্থখে ইহা বিশেষ উপযোগী।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। আর্সিনিক, বেল্যাডোনা, ক্যামোমিলা কলোসিঙ্ক, মার্কিউরিয়াম্, নাক্স-বমিকা, পাল্‌সেটিকা ।

ডাইলুশন বিচার। ২য়, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমের আরো কই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

রডোডেণ্ড্রন ক্রিশাস্থাম্,-রডোড্

(RHODODENDRON CHRYSANTHUM,-RHOD.)

এই গাছের শুকনা পাতা এবং ফুলের কুঁড়ি যথানিয়মে প্রক্‌ স্পিরিটে তিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া। পেশী এবং শরীরের আঁশাল অংশের উষ্ণতা হ্রাস কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার দ্রবণ আক্রান্ত অংশের পেশী এবং সন্ধি বাস্তের অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং অণুকোষ ও অণুকোষাধারের উপর ইহার কার্য্য থাকা হেতু, অণুকোষ এবং অণুকোষাধারের প্রবাহ, ক্ষতি এবং কঠিনতা উৎপাদন করিয়া থাকে। ঠাণ্ডা, ঝড়, বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের সময় এবং উহার পূর্বে অস্থখের আক্রমণ বা বৃদ্ধি এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক। প্রাতঃকালে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকা কালীন কপাল এবং কপালের দুই পার্শ্বে বেদনা, মদ্যপানে (নাক্স-বম্, জিঙ্ক্) এবং আত্ম ঠাণ্ডা বাতাসাদিতে বাহার বৃদ্ধি হয় ও বিছানা হইতে উঠিলে বা এদিক ওদিক চলিয়া বেড়াইলে বাহার উপশম হয়; বাম কর্ণের পশ্চাৎভাগে ছিঁড়িয়া ফেলা বা ছিদ্র করার জায় বেদনা ।

চক্ষু। চক্ষু শুষ্ক এবং জ্বালাবোধ, দিনের বেলা উজ্জ্বল আলোকে ও একভাবে অনেকক্ষণ কটমট্‌ করিয়া তাকাইয়া থাকিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

কর্ণ । ডাইন কর্ণের বহির্দেশে প্রবল বেদনা বাহ্য প্রাতিঃকালে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিন অবস্থিতি করে ।

নাসিকা । বাম নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হয় এবং কখন কখন উহার সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ডাইন নাসারন্ধ্রও রুদ্ধ হইয়া থাকে, বহির্কায়ুতে বাহার অনেক উপশম হয় ; দাঁতের গোড়ার কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ভ্রাস বেদনা, ঝড় বৃষ্টিতে বা ঝড় বৃষ্টির পূর্বে বাহার বৃদ্ধি হয় (রাস্টল্) ।

গলার মধ্য । গলার মধ্যে টাচিয়া ফেলা বা ছাল উঠিয়া বাওয়ার ভ্রাস অনুভূত হয়, বাহার দরুণ মনে হয় যেন গলার মধ্য শ্লেমা দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে ।

মল । মল কোমল বাহ্য আন্তে আন্তে নির্গত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বাহ্যের বেগ বা কোঁথপাড়া বর্তমান থাকে (কার্কো-বেজ্, চায়না) ।

মূত্রযন্ত্র । বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রাধারে কসিয়া ধরা ; চামড়ার নীচে ক্ষত হইলে যেরূপ হয়, মূত্রনালীতে সেরূপ বাতনা ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের গুহদ্বার হইতে অণুকোষ পর্য্যন্ত কসিয়া ধরার ভ্রাস বেদনা ; অণুকোষ উপরের দিকে আকৃষ্ট, ক্ষীত এবং বেদনামুক্ত (ক্লিমেটিস) ; অণুকোষ এবং অণুকোষাধার এত বেদনামুক্ত হয় বা টাটগ যে, উহাতে সামান্য স্পর্শও সহ হয় না ; থেঁংলিয়া গেলে যেরূপ হয়, অণুকোষে সেরূপ বেদনা (আর্জেন্ট-নাইট্রিক্, স্পঞ্জ) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে কসিয়া ধরার ভ্রাস বাতনা ; অণুকোষের ক্ষীতি এবং কঠিনতা (একন্, আর্জেন্ট্, কষ্ট্), বিশেষতঃ বাম অণুকোষের এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে কসিয়া ধরার ভ্রাস প্রবল বেদনা বাহ্য উরুদেশ ও উদর পর্য্যন্তও বিস্তৃত হইয়া থাকে ; ডাইন অণুকোষে বাটিয়া ধরা বা স্থচীবিধানের ভ্রাস বাতনা ; অণুকোষের চুলকানি এবং উহাতে ঘর্ষণের বৃদ্ধি (সাইলিসি) ; অণুকোষাধারের শোথ সম্বলিত প্রদাহ (Hydrocele) । ক্রীলোকের ডিম্বকোষে বেদনা, বায়ুর পরিবর্তনে বাহার বৃদ্ধি হয় ; যোনিদ্বারের স্থানে স্থানে জলপূর্ণ থলিয়ার ভ্রাস ক্ষীতি ।

শ্বাসযন্ত্র । প্রাতিঃকাল এবং সন্ধ্যার সময় অবসন্ন কারক শুক কাশি

এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কে কষ্টানুভব ও গলার মধ্যে থলুথলি বোধ ; ভাড়াভাড়া চলিবার সময় বৃক্কে হইতে উদরের বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থায়ী যুগ্মযুগ্ম বেদনা ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । অতি প্রত্যয়ে বিছানার থাকিতে থাকিতে অথবা বিছানা হইতে উঠিলেই ষাড় এবং পৃষ্ঠদেশে বাতের বেদনা ; কোমরের পশ্চাৎ দেশে খেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার জ্ঞান বেদনা, বিশ্রাম কালীন এবং বৃষ্টিতে বাহার বৃদ্ধি হয় (রাস্-টঙ্ক) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের জ্ঞান কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্ঞান বেদনা (একন, কলোস, লেডাম্, পাল্‌ন্স), জলবৃষ্টি এবং বিশ্রাম কালীন বাহার বৃদ্ধি হয় (রাস্-টঙ্ক) ; আঘাত লাগিয়া খেঁতলিয়া গেলে বেদন হয়, সন্ধিতে সেরূপ বেদনা এবং উক্ত সন্ধিতে ছিঁড়িয়া ফেলা বা কসিয়া ধরার জ্ঞান বেদনা ; অস্থির আবরক কঠিন পর্দার (Periostum) কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্ঞান বেদনা, হাত এবং পায়ের বাহ্যে অধিক অনুভূত হয় ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থানে স্থানে উক্ত প্রকারের বেদনা, স্নাত্তিতে, বিশ্রামকালীন এবং বায়ুর পরিবর্তনে বাহার বৃদ্ধি হয় (রাস্-টঙ্ক) ।

ব্যবহার । পেণী এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সন্ধিবাত জনিত অস্থখ ; অণ্ডকোষ এবং অণ্ডকোষাধারের পুরাতন আকারের শোথ সম্বলিত প্রদাহ ; অণ্ডকোষের কঠিনতা ; গ্রীবা এবং বৃকের পেণীবাত ; হাত পায়ের বাতজনিত জ্বরশূল, আহারের সময় এবং উহার পর বাহার বৃদ্ধি হয় ; চক্ষুর গ্লকোমা (Glaucoma) নামক অস্থখ ইত্যাদি অস্থখে রডোডেণ্ড্রন ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । প্রাতঃকালে বিশ্রাম কালীন ; রক্ত বৃষ্টি এবং বজ্রাঘাতের পূর্বে, ঠাণ্ডা আত্মপাতনে অস্থখের বৃদ্ধি এবং আহারের সময় এবং উহার পর অস্থখের উপশম ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । রাস্-টঙ্ক, ক্রিসেটিন্, রেনান্‌কুলাস্, ব্রাইওনিয়া, ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা, কোনায়াস্, লাইকোপডিয়াস্, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স-বমিকা, পাল্‌সেটিল্লা, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, সালফার ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ব্রাইওনিয়া, ক্যাম্ফার, ক্রিসেটিন্, রাস্-টঙ্ক ।

ডাইলুশন বিচার । বাতরোগ বা সুখমণ্ডলের বাতজনিত বেদনা

বা মায়ুশূলে জাৰ্শেনী দেশীয় চিকিৎসকগণ ১ম এবং ২য় দশমিক ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরাও এতদ্দেশে ১ম হইতে ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহার ১২ এবং ৩০ ক্রমও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অণুকোষ এবং অণুকোষাধারের পুরাতন আকারের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতার শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার, এম্, ডি, মহাশয় সচরাচর ৪র্থ দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহৃত করিয়া থাকেন।

রুমেক্স ক্রিস্পাস, -রুমেক্স

(RUMEX CRISPUS, -RUMEX.)

এই গাছের কাঁচা শিকড় যথা নিয়মে প্রক্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। স্নায়িক বিন্দু, লিম্ফ্যাটিক্স (Lymphatics) এবং চর্শ্বের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুন উক্ত যন্ত্রদ্বয়ের স্বাভাবিক নিঃসরণ কম হয় এবং উহার স্পর্শজ্ঞান শক্তির অতিরিক্ত চাক্ষু্য হইয়া উহার অতিরিক্ত বিকৃত রক্তের উত্তেজনা উৎপন্ন হয়, অথচ উক্ত যন্ত্রাদির প্রকৃত প্রদাহ উৎপন্ন হয় না।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। শূণ্ণশূশে সাপাধরা এবং মোচড়াইয়া পড়িলে বা পেঁতুলিয়া গেলে ঘেকুপ হয়, কপালে সেকুপ বেদনা।

নাসিকা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; প্রবল হাঁচি এবং নাসারন্ধ্রে অত্যন্ত কষ্টদায়ক জ্বালা বা চড়্চড়ানো; নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল প্লেয়া নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার হাঁচি দেওয়া (একনু, সিপা, মাজুনেরিয়া), সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে বাহ্যিক বৃদ্ধি হয়।

মূথগহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বা হরিদ্রা লেপযুক্ত (চেলি-

ডন্, চারমা, আয়োড)। গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া বাওয়া বা চাঁচিয়া ফেলার ভায় অমৃত্ত হয় (আমিন্-কার্ক, কার্কো-বেজ, কষ্ট, ফস্, পাল্‌স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যের উপরিভাগে স্লেয়ার সঞ্চার ।

পাকস্থলী । আহায়েব পরই উদরোক্তি প্রদেশে ভারিবেধ (ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্) ; চাপদিলে পাকস্থলীর মধ্যে পূর্ববোধ বাহা গলার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; পাকস্থলীর মধ্য হইতে বুক পর্য্যন্ত খোঁচা বিধার ভায় যাতনা ।

মল । প্রাতঃকালে উদবায় (আলোক, পডোফ্, সাল্‌ফ্) ; মল কটাবর্ণ এবং জলবৎতরল (আস্, ক্যালী-বাই) ; দাত্তের পূর্বে কোঁথ পাড়া এবং উদরে বেদনা ; কোষ্ঠবদ্ধ (আলাস্, ব্রাই, নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, ফস্, সাল্‌ফ্) ।

শ্বাসযন্ত্র । কঠনালীতে চট্‌চটিয়া আঠা স্লেয়ার সঞ্চার (ক্যালী বাই, নাক্স-বম্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারবার গলার কেকুর দেওয়ার ইচ্ছা ও গলায় কেকুর দিলেও বাহার উপশম হয় না ; কঠনালীতে বেদনা (ফস্) ; স্বরভঙ্গ (কার্কো-বেজ, কষ্ট) ; রোগী (ক্লীলোক) মনে করে যেন দে আর নিশ্বাস ফেলিতে পারিবে না এবং তাহার বুকের মধ্যে যেন আর বাতাস প্রবেশ করিবে না ; অনবরত প্রাক্তিজনক শুক কাশি (নাক্স-বম্), পাক-স্থলীর মধ্যে স্ফু-স্ফু-কবার দরুণ বাহার উজ্জেক হয় (হিগ-সাল্‌ফ্, ফস্, সাক্সনোরিয়া, সিমিয়া), চাপ পড়িলে, কথা বলিলে, প্রধানতঃ নিশ্বাসে বুকের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিলে এবং সন্ধ্যার সময়, বিছানায় শয়ন করিলে বাহার বৃদ্ধি হয় (কোনায়াম্, ডিসিয়া, হায়োস্, মেজিরিয়াম্, নাক্স-বম্, পাল্‌স্) ; কঠনালীতে এবং বক্ষাস্থির নীচে টাটানি ও ছাল উঠিয়া বাও-য়ার ভায় অমৃত্ত হয় (আম্‌স্, আমোনিয়া, ফস্, রাস্‌টর্জ্) ; উভয় ফুফুদের সমুখ ভাগে কন্‌কনানি ; বুকের বাম পার্শ্বে জ্বপিতের নিকটবর্তী স্থানে হৃদযন্ত্রের ভায় জালাযুক্ত এবং হলহুটানের ভায় প্রথর বেদনা ; দীর্ঘ-নিশ্বাসে, এবং রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিলে, বাহার বৃদ্ধি হয় ; বুকের বাতরোগ (ব্রাই) ।

জ্ঞান, প্রত্যক্ষ । পাঁচ প্রচুর লাল বা গোলাপী রক্তের ঘন ঘন ফুসুড়ী ।

চর্ম । শরীরের স্থানে স্থানে চুলকানি (প্রাক্, রাস্টিঙ্ক, সাল্‌ফ্), নিম্নাঙ্গে বা গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলেই বাহা অধিক অম্লভূত হয়; গায় হুল ফুটান বা কাঁটা বিধানের ভায় চুলকানি বা কুট্‌কুটানী; গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোঁকর ভায় ফুস্‌ফুস; গায়ের কাপড় ফেলিলে বা গায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে শরীর চুলকায় ।

ব্যবহার । অনবরত কঠিনালী এবং বায়ুনলীয় প্রান্তিজনক প্রবল কাশি, বাহাতে গলাদিয়া কোন প্রকারের স্লেমাই নির্গত হয় না, গলায় চাপ পড়িলে, কথা বলিলে, ঠাণ্ডা বাতাস টানিলে বাহার বৃদ্ধি হয়; প্রাতঃ-কালীয় উদরাময়; শরীর চুলকানি ইত্যাদি অস্থখে রুমেজ্ ব্যবহার্য্য ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ডাক্তার ক্যারল্ ডান্‌হাম্ (Dr. Carroll Dunham) বলেন যে, ঋসযজ্জ রুমেজ্জের কার্য্য ল্যাকেসিস্, বেলাডোনা, কষ্টিকাম্ এবং ফফরাসের ভায় । ঋস যজ্জের উপর ইহার কার্য্যের সঙ্গে স্পঞ্জিয়ারও অনেক সাদৃশ্য আছে । প্রাতঃকালে উদরাময় সম্বন্ধে ইহার কার্য্য অনেকটা এপিস্, হুফর, পডোফিলাম্ এবং সাল্‌ফারের ভায় । এতদ্বিন্ন ইহার কার্য্যের সঙ্গে হিপার সাল্‌ফারের কার্য্যেরও সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই ব্যবহার্য্য ।

রুটা গ্রাবিয়োলেন্স্,-রুটা

(RUTA GRAVIOLENS,-RUTA.)

এই গাছ কাঁচা অবস্থায় সংগ্রহ করিয়া বথানিয়মে প্রক্ স্পিরিটে তিজা-ইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । অস্থির আবরক কঠিন পর্দা (Periosteum), অস্থি সন্ধি এবং উপাস্থির উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার দক্ষণ উক্ত অংশে বাতরোগের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে । চক্ষুর উপরও প্রায় উক্ত প্রকারের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় । জ্বীলোকের অরারূর উপরও ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল । ইহা অরারূতে রক্তাশিক্য এবং অরারূর পৈশিক

অংশের সন্ধান উৎপাদন করে। অভাব ইহা করার হইতে রক্তস্রাব এবং গর্ভস্রাব নিবারণ করে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। মাথার দণ্ডপিয়া বা চাপিয়া ধরার জায় বেদনা; কপালের হাড় স্ট্রী বিধান বা কুসিয়া ধরার জায় যাতনা। যাহা কর্ণের পশ্চাত্তাগের হাড় পর্য্যন্ত ও বিস্তৃত হয়; মাথার চাড়ের আশ্রয়ক কঠিন পর্দা। খেঁংগিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার জায় বেদনা, যাহা কর্ণের পশ্চাত্তাগের হাড় হইতে মাথার পশ্চাত্তাগের হাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চক্ষু। রগড়াইলে নাসিকার নিকটবর্তী চক্ষুর কোণে এবং চক্ষুর নিম্ন পাতায় জ্বালা এবং চিক্রিকমারী; চক্ষু জলপূর্ণ; চক্ষুর নিম্ন পাতায় লিলধরা এবং তৎপর চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়া; চক্ষে জ্বালা এবং কন্কনানী; চক্ষে ঝাপসা দেখা; অনেককণ ধরিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পুস্তকাদি পাঠ বা সরু কাপড়াদি সেলাই করার পর বা অল্প কোন প্রকারে চক্ষুর অতিরিক্ত ব্যবহারের পর চক্ষে উরু প্রকার দেখা, সন্ধ্যার সময়ই যাহা অধিক অল্পভূত হয় (মিরিকা, নেট্রাম্, আস্, নেট্রাম্-মিউর, দিপিয়া, ফস)।

পাকস্থলী এবং উদর। বারম্বার গন্ধহীন উদ্রার উঠা; পাকস্থলীতে জ্বালা বা চর্কনবৎ যাতনা। যুক্ত প্রদেশে চাপিয়া ধরার জায় বা চর্কনবৎ বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র। শ্বাসরোধক কাশি, যাহার দরুণ রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঘুমভাঙ্গিয়া যায়; বক্ষস্থিতে চাপাবোধ; বুকে চর্কনবৎ বেদনা।

গুহু এবং গুহুদ্বার। প্রস্রাব করার সময় গুহের মধ্যে ছিঁড়িয়া ফেলা বা স্ট্রী বিধানের জায় বেদনা, বারম্বার বেগ দেওয়া বা কৌথপাড়া, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্যত হয় না এবং গুহদ্বার বাহির হইয়া পড়ে; মলত্যাগ করার চেষ্টা করিলেই গুহ বাহির হইয়া পড়ে।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র পরিপূর্ণ থাকিলে যেরূপ হয়, মূত্রাধাবে সেক্ষণ পূর্ববোধ এবং তদরূপ বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ও মনে হয় যেন তদ্রূপই

অসাড়ে মূত্র নির্গত হইবে, অথচ বেগ দিলে অতি সামান্য পরিমাণ মূত্র নির্গত হয় ।

জননেন্দ্রিয় । ক্রীণোকের জারায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, ঘাড় এবং স্বন্ধে সেরূপ বেদনা; পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং মেরুদণ্ডে অভ্যন্ত হ্রস্ব বোধ; থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশ এবং গুহ্বারের ঠিক উপরিভাগে সেরূপ বেদনা; মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া নিম্ন দিকে শীতল বোধ ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । মারিলে, পড়িয়া গেলে বা আঘাত লাগিলে যেরূপ হয়, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, সন্ধি এবং হাড়ে সেরূপ বেদনা (আর্গিকা); স্থানজটী হইলে বা থেঁতলিয়া গেলে যেরূপ হয়, পায়ের পাতার সন্ধিতে সেরূপ বেদনা; পায়ের হাড়ে বেদনা, বাহ্যর দক্ষণ সজোরে চলিবার ক্ষমতা থাকে না ।

নিদ্রা । দিনের বেলা নিদ্রাবেশ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা ভাঙ্গিয়া রাজিতে বারবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; ঘুমেরদোরে এলোমেলো স্বপ্ন দেখা ।

চর্ম্ম । সমুদয় শরীরে চুলকানি (গ্রাঙ্ক, রাস্-টক্স), চুলকাইলে বাহ্যর উপশম হয় (সাঙ্ক্) ।

ব্যবহার । থেঁতলিয়া যাওয়া, মোচড়াইয়া পড়া বা অন্তকোন প্রকারের আঘাতজনিত অস্থি বা অস্থির আবরক কঠিন পর্দার (Periosteum) অজ্ঞপ্ত; অস্থির আবরক কঠিন পর্দার প্রদাহ (Periostitis); বাতরোগ; চক্ষুর অতিরিক্ত ব্যবহার জনিত চক্ষুরোগ বা দৃষ্টিহীনতা; (Asthenopia); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব; গর্ভস্রাব; অতিরিক্ত রক্তস্রাব; অস্থি, অস্থির আবরক কঠিন পর্দা এবং উপস্থিতে থেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ভ্রান্ত বেদনা; গুহ্ব বাহির হইয়া পড়া (Prolapsus ani); কোষ্ঠবদ্ধ এবং মলত্যাগের সময় গুহ্ব বাহির হইয়া পড়া ইত্যাদিতে রুটা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । চলিয়া বেড়ানোর পর অত্যন্ত হ্রস্ব বোধ এবং থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেরূপ যাতনা (আর্গিকা); কোমরের পশ্চাৎভাগ এবং কোমরে বেদনা; যে পাশে শয়ন করা যায়, সে পাশের সমুদয় অংশেই মোচড়াইয়া পড়া বা

থেন্সিয়া বাওয়ার ভায় বেদনা (আর্বিকা, ব্যাপ্ট্); বিশ্রামকালীন, বসিয়া, খাকা কালীন; ঠাণ্ডাতে এবং আর্জ বায়ুতে অস্থির বৃদ্ধি ও নড়া চড়াতে অস্থির উপশম ইত্যাদি কুটার বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগ্রণ বিশিষ্ট ঔষধ । জরারূপ উপর কুটার কার্য ক্রোকাশ্ এবং সাবাইনার ভায়। অস্থির সক্তি এবং শরীরের নানা অংশ পরিচালনার সহায়কারী যন্ত্রের উপর ইহার কার্য অনেকটা মেজেরিয়াম্ এবং কাইটোলা-কার ভায়; চক্ষুর উপর ইহার কার্য অনেকটা ইউফ্রেসিয়ার কার্যের ভায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আমোনিয়াম্ কার্বোনি-কাম্, আর্বিকা, ট্রাইওনিয়া, ক্যালকেরিয়া কার্ব, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াম্, ফফরিক্ আসিড, পালসেটোলা, রাস্-টজ্, সিপিয়া, সাইলি-সিয়া এবং সালফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিবেধক ঔষধ । ক্যাক্সার।

ডাইলুশন বিচার । হানিমান ২য় ডাইলুশন ব্যবহার করিতেন। এই ঔষধের ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশনই লেখক সচরাচর ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। কোন কোন চিকিৎসক ২২ এবং ৩০ ক্রমও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সাবাইনা, -সাবাইনা

(SABINA, -SABIN.)

এই গাছের কাঁচা পাতা এবং কুড়ির অগ্রভাগ যথানিয়মে ৪০° ডিগ্রী ওয়ার ফ্রফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা প্রধানতঃ জীলোকের জননেন্দ্রিয়ই অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা মুত্রযন্ত্র, পাকস্থলী এবং অন্ত্রও স্পষ্টরূপে আক্রমণ করিয়া থাকে, যাহার দক্ষণ উক্ত যন্ত্রাদি উত্তেজিত হইয়া উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া, জরারূপ হইতে রক্তশোধ এবং গর্ভশ্রাব, মুত্রকৃচ্ছ ও ভ্রূক্ষ হইয় এবং মলে রক্তমিশ্রিত থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতির লক্ষণ :

মন । সর্বদা আপন বিষয়ে মন চিন্তা করা, মনোন্মত্ততা বা মনো-রোগ (Hypochondriasis) (নাক্স-বম্) ; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং আশঙ্কা (একন্, আন্) ; বাদ্য অত্যন্ত অসহ্য হয় ।

মস্তক । দাঁড়াইয়া থাকা কালীন মাথাঘোরা, বাহার দক্ষণ রোগী মনে করে যেন সে টলিয়া পড়িবে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে অন্ধকার দেখা ; চাপিয়া ধরার স্থায় মাথা বেদনা বাহ্য কণের পশ্চাৎ ভাগেই অধিক অনুভূত হয় এবং বাহ্য হঠাৎ আরম্ভ হয় ও আন্তে আন্তে সারিয়া যায় ; কপালে চাপিয়া ধরার স্থায় ঘৃণ-ঘৃণে বেদনা ।

নাসিকা । সর্দি এবং নাক দিয়া শুষ্ক স্লেয়া নির্গমন ।

মুখগহ্বর । মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে শুষ্কবোধ (এপিস্, নাক্স-মক্) ; সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে দাঁতে দপ্-দপিয়া বেদনা ।

পাকস্থলী এবং উদর । টক দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (আন্টি-টার্ট্, চায়না, হিপ্-সাল্‌ক্, ফস্, পডোফ্, বিরেট্-আব্) ; লিমোনেড্ (Limonade) খাওয়ার অত্যন্ত ইচ্ছা ; বুক জালা এবং উদগার উঠা (নাক্স-বম্, লাইকোপ্) ; উদর হইতে কুচ্কি পর্য্যন্ত কামড়াণ, মোচড়াণ বা প্রসব বেদনার স্থায় বেদনা ।

মল । রক্তমিশ্রিত স্লেয়া ভেদ, অথবা উদরাময় ।

মূত্রযন্ত্র । বারম্বার মূত্র ত্যাগের প্রবল ইচ্ছা বা বেগ এবং প্রচুর পরিমাণে মূত্র ত্যাগ (এপিস্, আপোসিনাম্, আর্জেন্ট্-মেট্) ; স্বত্রাবরোধ ; কোঁটার কোঁটার মূত্র নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রনালীতে জালা (বেল্, ক্যান্, ক্যানাবিস্-স্যাট্) ; কুদ্র সন্ধিবাতে মূত্রনালীর গোড়ায় অত্যন্ত উদ্বেজনা ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে অতিরিক্ত পরিমাণে এবং অনেক দিন ধরিয়া রক্তঃস্রাব (বেল্, ক্যান্-কার্ক্, ক্যানী-স্যাট্, নাক্স-বম্) ; পুরুষ সহবাসের অনিবার্ধ্য ইচ্ছা এবং ক্রমাগত পুরুষ সহবাসেও উক্ত ইচ্ছা পরিহৃষ্ট না হওয়া ; জরায়ু হইতে থাকিয়া থাকিয়া রক্ত-

যাব, নড়াচড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয় ; কাণচ (ক্যালী-নাইট্রিক), খানা থানা, চাপ চাপ রক্তস্রাব (ক্রাকশ) ; জরায়ুর শক্তিহীনতা বা জড়তার দরুণ রক্তস্রাব (কলোফিসাম) ; গর্ভস্রাব বা সন্তান এসবের পর রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশ হইতে গুহ্বারের ঠিক উপরিভাগ পর্যন্ত বেদনা ; গর্ভস্রাব (প্রধানতঃ তৃতীয় মাসে) (সিকেল) ; গাঢ় হরিয়াবর্ণের, দুর্গন্ধযুক্ত শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ; রক্তঃস্রোধের পর শ্বেতপ্রদর ; ঋতুর সময় রক্তস্রাব না হইয়া তৎপরিবর্তে শ্বেত প্রদর নিঃসরণ ।

স্বাসযন্ত্র । কোন প্রাণী হামা দিয়া বাইলে ঘেরুপ হয়, কণ্ঠনালীতে সেরুপ অহুত হয় বা উহাতে হুড়্‌হুড়ী, যাহার দরুণ কাশির উদ্বেগ হয় এবং গলা দিয়া চট্‌চটিয়া আঠা স্লেয়া নির্গত হয় ; শুক থুণ্‌থুণ কাশি এবং বাহু-নলের মধ্যে হুড়্‌হুড়ী ; গলা-দিয়া স্লেয়ার সঙ্গে রক্ত পড়া (একন্, চামনা, ফেরাম্, হামামেলিস্) ; বক্ষাহিতে চালিয়া ধরার জ্বর বেদনা, নিশ্বাসে প্রাশাসে যাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না ।

প্রীক এবং পৃষ্ঠদেশ । কোষের পশ্চাৎভাগ হইতে টানিয়া বা কসিয়া ধরার জ্বর বেদনা আরম্ভ হইয়া গুহ্বারের ঠিক উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে, যাহা মণিবন্ধ এবং পায়ের আঙ্গুলেই অধিক অহুত হয় ও আক্রান্ত স্থানের উজ্জ্বল লালবর্ণের ক্ষতি ; সন্ধিবাত ; খেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে ঘেরুপ হয়, উৎদেশের সমুখ ভাগে সেরুপ বেদনা ।

নিদ্রা । অস্থির এবং ভয় নিদ্রা বা ঘুম ভাল না হয় ।

ব্যবহাব । অতিরিক্ত বা প্রচুর রক্তস্রাব ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ; গর্ভস্রাব, (তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবের পক্ষে বিশেষ উপকারী) ; শ্বেতপ্রদর ; জরায়ু প্রদাহ ; মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ; হিষ্টিরিয়া ; সন্ধিবাতজনিত অস্থখ ; শরীরের স্থানে স্থানে গ্রন্থি জ্বর ক্ষতি ; ডিম্ব-কোষের উত্তেজনা ; গর্ভস্রাব হওয়ার আশঙ্কা এবং তদ্রূপ কতক তরল এবং কতক চাপ চাপ, খানা খানার রক্তস্রাব ; রক্তস্রাবের নির্দিষ্ট সময়ে রক্তস্রাব

না হইয়া তৎপরিবর্তে প্রচুর শ্বেত প্রদর নিঃসরণ; উদগ্রাময়; রক্তাশাশয় ইত্যাদি অস্থিতে সাবাইনা ব্যবহার্য্য । জীলোকের যোনিদ্বারে বা অরারুর মুখের চতুষ্পার্শ্ববর্তীস্থানে ফুলককির দ্বারা মৈথিক ফোটিকে (Condylomata) সাবাইনার বাহুপ্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দুর্বল এবং প্রান্তিবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হতাশের ভাব; সমুদয় শরীরে ভারি-বোধ এবং তন্দ্রকণ অনসবোধ ও শয়ন করিয়া থাকার ইচ্ছা; রক্তবহা-নালী সমূহে দগ্ধপানি; রক্তঃস্রাবের নির্দিষ্ট সময়ে রক্তস্রাব না হইয়া তৎপরিবর্তে শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ইত্যাদি সাবাইনার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । বেলাডোনা, ক্রোকাশ, পাল্‌সেটিল, ট্রিনিয়াম, আণিকা, ককিউলান, রান্টজ, সাল্‌ফার ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্‌ফার, পাল্‌সেটিল ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম হইতে ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া অনেক চিকিৎসক বিশেষ ফল পাইয়াছেন এরূপ চিকিৎসা বিবরণ গ্রহণ পাঠ করা যায় । অনেকে ইহার আদত গুঁড়া বা তৈল ব্যবহার করিয়াও বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন । লেখক স্বয়ং ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়াই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, তিনি ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রম ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন । সাবাইনার গুঁড়া, ৫ হইতে ২০ গ্রেটেল, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে বা ওলিভ্‌ অয়েল (Olive-oil) মিশাইয়া বাহু প্রয়োগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

সাস্কুনেরিয়া ক্যানাডেনসিস, -সাস্কুনের

(SANGUINARIA CANADENSIS, -SANG.)

এই পাছের শিকড় বা শিকড় হইতে যে র্টটার দ্বারা শিকড় বাহির হয়, (রিজোম্‌, -Rhizome), তাহা যথানিয়মে প্রক্ট্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল

আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । সাক্সনেরিণ্ যথামিয়মে স্থগার অবস্থিকের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার মিশ্র শুভ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা শ্বাসবস্তুর শৈল্পিক বিস্তারিত আক্রমণ করিয়া উহাতে উত্তেজনা এবং শ্লেষ্মা জনিত প্রদাহ উৎপাদন করে । নিউমোগ্যাস্ট্রিক্‌ ন্যায় (Pneumogastric nerve) উপর ইহার কার্য অতি প্রবল । উক্ত ন্যায় দিয়া ইহা বক্রত এবং পরিণাক সম্বন্ধীয় বস্তুর অস্থিত উৎপাদন করে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

অন্তক । বসি অবস্থা বা মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকার অবস্থা হইতে সোজা হইয়া দাঁড়াইলে মাথাখোঁরা (ব্রাই); তাড়াতাড়ি মাথা ঘুরাইলে মাথাখোঁরা (ক্যাক্-কার্ক), অথবা উপরের দিকে তাকাইলে মাথা খোঁরা (ক্যাক্-কার্ক, কুপ্রান্); মাথার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে সাঁই সাঁই শব্দ এবং নরক রক্তের উচ্ছাস্তব (একন্); কপালে চাপিয়া ধরার স্তায় খুণ্‌খুণে বেদনা (ইউফ্রেস্, মার্ক-কর); মাথাঘরা, থাকিয়া থাকিয়া বাহার আক্রমণ হয় (চারনা); মাথা বেদনা মাথার পশ্চাৎভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া (বিরেট্-বিরাইড্) উপরের দিকে বিস্তৃত হয় এবং তৎপর ডাইন চক্ৰ উপরিভাগে স্থিত হয়; শিরঃশীড়া, বাহার লক্ষণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া বাইবে (ব্রাই, ক্যাপ্, চারনা, পাল্‌স্, নেট্রাম্-বিউর); কপাল এবং কপালের হই পার্শ্বে বেদনা, ডাইন অংশে বাহা অধিক অস্থিত হয় ও বহির্ক্‌স্থে বাহার উপশম হয় (পাল্‌স্, মিলিয়া); শিরঃশীড়া, উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোবেগ এবং শীতবোধ ও তৎপর নরক উচ্ছাস্তব, বাহা মাথা হইতে পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

চক্ষু । চক্ষুরতারা বিস্তৃত (এইলাস্, বেগ্, সিকুটা, হায়োস্); চক্ষু আগার সহিত শুষ্কতা এবং তৎপর চক্ষু দিয়া প্রচুর জল পড়া (আর্স্, ইউফ্রেস্) ।

কর্ণ । কানে জ্বালাস্থতব; গাল লালবর্ণ; কর্ণশূল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানের মধ্যে জল ফুটানের স্তায় বেদনা এবং মাথাখোঁরা ।

নাসিকা । নাসি এবং তদ্রূপ নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ-

ভরল শ্বেয়া নির্গমন (একন, আস, সিপি, জেনন্, আইরিস, কমেস) বাহী ডাইন নাসার ক্ষেই অধিক হয় ।

মুখমণ্ডল । এক বা উভয় গালের স্থানে স্থানে চক্রাকারে লালবর্ণ হওয়া (ফ্রিয়াজ্); বিকারের লক্ষণাক্রান্ত ফুফুস প্রদাহে (Typhoid Pneumonia) গাল নীলবর্ণ হওয়া ; মুখমণ্ডল শিটা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন ; ওষ্ঠে শুষ্কবোধ ; উপরের মাড়িতে স্নায়ুশৃঙ্গের ভায় বেদনা, বাহী নাক, চক্ষু, কান, গ্রীবা এবং মাথার একপার্শ্ব পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় ; আক্রান্ত স্থানে ঘোঁচাবিধার ভায় বা জ্বালাযুক্ত বেদনা, বাহার দক্ষণ রোগী মেজ্যাতে হাঁটু গাড়িয়া মাথা কসিয়া বরিয়া থাকিতে বাধ্য হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখে স্বাদ শূন্যতা এবং পুড়িয়া থেলে ঘেঁষা হয়, জিহ্বার সেরূপ অমৃতত হওয়া (পাল্‌স্); মাড়ি এবং তালু-কাতে ক্ষত । গিলিবার সময় মনে হয় যেন গলা অভ্যন্ত ফুগিয়াছে এবং বাহার দক্ষণ স্বাস্রোধ হওয়ার উপক্রম হয় ; গলার মধ্যে শুষ্কবোধ, জ্বলাদি পান করিলেও বাহার উপশম হয় না ; ছাল উঠিয়া গেলে ঘেঁষা হয়, গলার মধ্যে সেরূপ জ্বালা এবং টাটানি (এরাম্, আর্জেণ্ট্-নাইট্রিক্) ; গলার মধ্যে ক্ষত সম্বলিত টাটানি (হাইড্রাট্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, ফাইটোল্); তালুকা এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ সাগুদানার ভায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটিক দ্বারা আবৃত ।

পাকস্থলী । কি খাটতে যে ইচ্ছা যায় তাহা বোগী হির করিতে পারে না ; মসলাযুক্ত দ্রব্যাদি খাওয়ার ইচ্ছা (ফন্) ; ভয়ানক বমনোদ্যেগ, থাকিয়া থাকিয়া বাহার উদ্রেক হয় (মাস্টি-টাট্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে প্রচুর লাল উঠা, মাথাধরা, শীত এবং উষ্ণামৃতত ; বমনোদ্যেগ, বমন দ্বারাও বাহার উপশম হয় না ; তিক্ত জল বমন ; টক, জ্বালা উৎপাদক, উগ্র জলবৎ টক পদার্থ বমন ; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন (ইপিকাক্, ফন্, বিরেট্-আল্); কৃমি বমন (একন); পাকস্থলীতে খালি খালিবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুচ্ছার ভাব বা অবসন্নতা ও অরুচ্য ; উদরোজ্জ্ব প্রদেশে চাপা বোধ এবং টাটানি, আহারের পর বাহার বৃদ্ধি হয় ; পাকস্থলীতে জ্বালা (আস্, ক্যাস্, আইরিস্, বিরেট-আল্‌ব্) ।

মূল । উদরাময়ের আর তবলভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদ্বার দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্) ; সন্ধির পর উদরাময় ; বৃক্কে বেদনা এবং কাশি ।

মূত্রযন্ত্র । রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে বাবদ্বার, জলের আয় পরিষ্কার মূত্রত্যাগ (নেট্রাম্-মিউর, ফস্-আস্) ।

জননেন্দ্রিয় । জ্বীলোকের শেষ বজরোরোধের সময় অস্থখ, বিশেষতঃ বারম্বার দমকা উচ্চাত্তব এবং খেত প্রদর নিঃসরণ (গ্যাক্) ; তলপেটে বেদনা, বাহার দরুণ মনে হয় যেন বজঃপ্রাণ আশ্রিত হইবে (আলোজ্, কলোফিগাম্, সিমিসিক্, পান্দ্) ; জরায়ুব মুখ ক্ষতগুক্ত ; হর্গদ্বুক্ত ক্ষতকারক খেত প্রদর নিঃসরণ ; উভয় স্তনের বোটারই স্তনী বিধানের আশ্রয় ঘটনা ; স্তনের বোটার টাটানি ।

শ্বাসযন্ত্র । গলার মধ্যের গভীরতম অংশে স্ফুটস্ফুট দরুণ শুষ্ক ধূশধূশে কাশি (হিপ্-সাল্ফ্, ফস্, কমেজ্, সিমিরা) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে শুষ্কবোধ ; বক্ষাহির পশ্চাৎভাগে কোন প্রাণী হামা দিয়া বাহিতছে একরূপ অস্থত হয় ; শুষ্ককাশি, বাহার দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এক বিছানায় সোজা হইয়া না বসিলে বা গুরুদ্বারদ্বারা ও উদগার দ্বারা দূষিত বায়ু নিঃসৃত না হইলে যাতন উপশম হয় না ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গালের স্থানে স্থানে চক্রাকারের লাগ দাগ পড়া ; বৃক্কে বেদনা, সন্ধি এবং তদ্রুপ নাক দিয়া স্লেমা নির্গমন ; অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট এবং বৃক্কে আঁটাবোধ ও তদ্রুপ দার্ষনিশ্বাস টানবার ইচ্ছা ; বৃকের উপরিভাগে অনবরত চাপা এবং ভারিবোধ ও উহা সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট ; বক্ষাহি এবং ডাইন স্তনের বোটার মধ্যবর্তী স্থানে তীক্ষ্ণ, চিন্তিনে বেদনা ; বক্ষাহির নীচে এবং বৃকের ডাইন পার্শ্বে প্রবল বেদনা ও জ্বালা ; বৃকের ডাইন পার্শ্বে, স্তনের বোটার নিকটবর্তী স্থানে স্তনীবিধানের আর অত্যন্ত ঘটনা ; বক্ষা-কাশির ভোগ কালীন গলা দিয়া রক্ত উঠা ; গলা দিয়া কঠিন এবং মরিচার রক্তবিশিষ্ট স্লেমা নির্গমন (Rusty Sputa) ; অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট ; কুক্ষ্ম প্রদাহ এবং কুক্ষ্ম যক্ষতবৎ হওয়া (Emphysema) ; বৃকের ডাইন পার্শ্ব হইতে রক্ত পর্য্যন্ত বেদনা, বাহার দরুণ স্তনী কষ্টে রোগী মাথার তালিতে হাত রাখিতে

পারে ; খাস প্রাচীনে অত্যন্ত দুৰ্গন্ধ (ক্যাম্প, ক্রোকাশ); গলাদিয়া অত্যন্ত দুৰ্গন্ধযুক্ত শ্বেদা নির্গমন ।

হুংপিণ্ড এবং নাড়ী । হুংপিণ্ড এবং নাড়ী অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে এবং উহাৰ সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শব্দে ঠাণ্ডা হয় এবং জ্ঞান থাকে না ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ষাড়, কৃষ্ণ এবং বাহ্যে বাতের বেদনা ।

জ্বর । শরীরে আলায়ুক্ত উষ্ণানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে শীত এবং কম্প ; উষ্ণতা যেন মাথা হইতে পাকস্থলীতে বিস্তৃত হয় ; গায় দমকা উষ্ণানুভব ; গা দিয়া উত্তাপ যেন বাষ্পের জ্বাৰ বাহির হয় বলিয়া অনুভূত হয় (ক্যাক্-কার্ক) ।

ব্যবহার । সন্ধি; ঘুংড়ী কাশি; হুংপি কফ বা কাশি; হাঁপানি কাশি ; ফুফুস-প্রদাহ ; বিকারের লক্ষণাক্রান্ত ফুফুস-প্রদাহ (Typhoid Pneumonia); গলাদিয়া ফুফুস হইতে রক্ত উঠা ; বক্ষশোথ (Hydrothorax) ; ফুফুস সঞ্চীয় বক্ষাকাশ (Pulmonary Consumption) ; কামল রোগ ; উদরাময় ; বাতরোগ ; বমন সম্বলিত শিরঃপীড়া (Sick-headache) ; অজীর্ণরোগ ; রক্ত, পুং ইত্যাদি নিঃসরণহেতু জ্বর বা হেক্টিক ফিবার (Hectic Fever) ইত্যাদি অস্থখে সাসুনেরিয়া ব্যবহার্য্য । ডাক্তার জুসেট্ (Dr. Jousset) বলেন যে, যে প্রকার আধ্বকপালিয়া মাথা ব্যাধা (Hemicrania) শয়ন করিয়া থাকিলে বা ঘুমাইলে উপশম হয় এবং বাহার সঙ্গে সঙ্গে পিত্ত বমন, দস্তশূল, কর্ণশূল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা, মাথায় যেন বিদ্যুতের জ্বাৰ থাকে লগ্ন এবং শীতকম্প হয়, তাহাতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী । যে প্রকার আধ্বকপালিয়া মাথাব্যাধা রক্তঃস্রাবের সময় (বিশেষতঃ বাহাদের অতিরিক্ত রক্তঃস্রাব হয়) হয়, তাহাতেই সাসুনেরিয়া অধিক উপকারী । ডাক্তার মিল্‌স্ (Dr. Mills) বলেন যে, যে প্রকার শিরঃপীড়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়া দুই প্রহরের সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায়, সেপ্রকার শিরঃপীড়ার এই ঔষধ বিশেষ উপকারী । ডাক্তার হেরিংও (Dr. Hering) উক্ত মতের পোষকতা করেন । ডাক্তার মিল্‌স্ আরো বলেন যে, উক্ত প্রকারের মাথা ব্যাধা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মুত্রের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যাওয়া এবং প্রচুর

পরিমাণে মূত্র নিঃসরণের পর মাথাব্যথা সারিয়া বাওয়া এই ঔষধ ব্যবহারের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। তাঁহার মতে স্ত্রীলোকের শেষ রক্তঃরোধের সময় উক্ত অস্থিতে ইহা বিশেষ উপকারী।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলহীন ; সমুদয় শরীরের জড়তা এবং অলসবোধ ; উষ্ণতা যেন মাথা হইতে পাকস্থলীতে বিস্তৃত হয় ; উষ্ণ জল চাওয়া দিলে বেকশ হয়, বুক বা স্তন হইতে উদরে সেকণ অস্থিত হয় ; সমুদয় শবীরে কুটু কুটানি এবং উৎসাহতব ; প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যার সময়, আলোকে, গোলমাগে ও নড়াচড়াতে অস্থির বৃদ্ধি এবং নিতকভাবে শয়ন করিয়া থাকিলে, অন্ধকার ঘরে ও বমনের পর অস্থির উপশম ইত্যাদি সাজুনেরিয়াব কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। ডাক্তার হেলের (Dr. Halo) মতে সাজু-নেব্রিয়ার কার্যের সঙ্গে ফক্ষরাসের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, সিলার (Scilla) কার্যের সঙ্গেই অস্ত্রাশ্র ঔষধ অপেক্ষা সাজুনেব্রিয়ার কার্যের অধিক সাদৃশ্য আছে। এতদ্বিধ ইহার কার্যের সঙ্গে আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্, বেলাডোনা, ব্রাইকনিয়া, চেলিডোনিয়াম্, হিপার সাল্ফিউরিস্, আইরিস্, মাক্টিউরিয়াম্, রুমেক্স্, স্পঞ্জিয়ার কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ওপিয়াম্, রাস্ রাডিকাল্ ।

ডাইলুশন বিচার। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার জুসেটের (Dr. Jousset) মতে মাথাব্যথায় ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন অধিক উপকারী।

স্যান্টোনাইন্, -স্যান্টোন্

(SANTONINE, SANTON.)

কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত স্যান্টোনাইন্ ক্রয় কবিত্তা বর্ণানিয়মে অংগাব অব্ মিকের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার মিশ্র ওঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহাৰ কাৰ্য্য অনেকটা সিনাৰ (Cina) কাৰ্য্যের
তায়। কিন্তু ইহা স্বতন্ত্ৰৰূপে ব্যবহার কৰিলে ইহাৰ কাৰ্য্য বিশেষ স্পষ্টৰূপে
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সেবনে অসাড় হৈ বা অনিচ্ছাপূৰ্ব্বক মূৰ্ছা নিৰ্গত হয়।
অতএব মূত্ৰধাৰণে অশক্তি হইলে ইহা (বিশেষতঃ শিশু বা ছোট বালক, বালি-
কাগণের অল্প কুম্মী থাকার দরুন হইলে) বিশেষ উপকাৰী। চক্ষুর উপরও
ইহাৰ কাৰ্য্য অতি প্রবল। প্রথমতঃ চক্ষু কোনও বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়
না; দ্বিতীয়তঃ রক্ত চিনিতে গোলমেলে বোধ হয়। অতএব চক্ষুর যে প্রকার
অস্থি চক্ষু রক্ত সম্বন্ধে উক্ত প্রকাৰেব গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়,
তাহাতে স্যাণ্টোনাইন্ বাহ্যিক। মস্তিষ্কৰ উপরও ইহাৰ কাৰ্য্য অতি
প্রবল। কারণ, কুম্মী বিনাশ কৰাৰ জন্ত শিশু বা ছোট বালক নালিকাদিগকে
অধিক মাত্রায় স্যাণ্টোনাইন্ সেবন কৰাইলে তাহাৰুগ্ৰণেব আক্ষেপ হইতে
দেখা যায়। ইহা চক্ষু কোৰোইডাইটিস্ (Choroiditis), রেটিনাইটিস্
(Retinitis), দুষ্টিইনতা, চক্ষু ছানি পড়া (Cataract) এবং চক্ষু
কণিয়ার অস্বচ্ছতাৰ (Opacity of the Cornea) পক্ষে বিশেষ উপকাৰী।
চক্ষুৰ আইৰিস্ প্রদাহও (Iritis) উপকাৰী। চক্ষুৰ উপৰ ইহাৰ কাৰ্য্যের
সৰ্ব্ব আটোপিয়া এবং ডিছটালিয়েব অনেক মাদ্ৰু আছে। ১ম হইতে ৩য়
দশমিক ক্রমেৰ শুঁড়াই সচরাচৰ বাদ্যত হইয়া থাকে। (৪৩১ পৃষ্ঠায় সিনা
(Cina) নামক ঔষধেব বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

সারাসেনিয়া পাপূ'রিয়া,-সারাসেন্

(SARRACENIA PURPUREA.-SARRACEN)

এই গাছের সমুদয় অংশ যথা নিম্নে উক্ত পৰিকার জলে ভিজাইয়া ইহাৰ
ইন্ফিউশন্ (Infusion) বা কাত, অথবা শুকনা গাছের সমুদয় অংশ যথা-
নিম্নে সুগাৰ অব্ নিকে দিশাইয়া ইহাৰ মিশ্ৰ শুঁড়া এং ইহাৰ শিকড় দ্বারা
মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । অল্প কএক বৎসর হইতে ইহা আমেরিকাতে
বসন্ত রোগেব চিকিৎসাৰ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বসন্ত রোগের

চিকিৎসায় ইহা এক বিশেষ উপকারী ঔষধ বলিয়া ইংলণ্ড এবং আমেরিকাতে চিকিৎসকগণ প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা সেবনে প্রথম ফুসুড়ী গুলি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায় এবং গুলিগুলিতে অতিরিক্ত পরিমাণে পুঁথ উৎপাদন নিবারিত হয়। স্ফু শরীরে সেবনে ইহা দ্বারা অরুচি এবং উদার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিতে বেদনা এবং অরু প্রত্যঙ্গে টাটানি ইত্যাদি কতকগুলি বসন্ত বোগের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব বসন্ত রোগে এই ঔষধ উপকারী। ইহার ১ম দশমিক হইতে ৩য় শততমিক ক্রমেয় গুলি বা আরোক ব্যবহার্য।

সার্সাপেরিলা, -সার্সা

(SARSAPARILLA, -SARSA.)

জেমেকাতে এই গাছ জন্মে। ইহার শুকনা শিকড় যথানিয়মে প্রস্তুত পিঁড়িতে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। রক্তের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। ইহা রক্তকে দূষিত করে এবং তদ্বর্ণ গায় দাঁদের স্থায় চক্রাকারে ও অন্তঃস্থ রক্তের ফুসুড়ী প্রকাশ পায়। মূত্র যন্ত্রের উপরও ইহার বিশেষ কার্য আছে, যাহার দরুণ মূত্রাধারাদিতে পাথরীর (Gravel) লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। অতএব উক্ত রোগে সার্সাপেরিলা এক অত্যন্ত উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। যাতনাদির সঙ্গে সঙ্গে এবং ধাতু নিঃসরণের পূর্বে মনের উদ্বেগ।

মস্তক। মাথায় ভারি বোঝা; মাথার বাম পার্শ্বে চাপিয়া ধরা বা স্থচীবিধাতনের স্থায় যাতনা; মাথায দণ্ডপিয়া বেদনা।

চক্ষু। চক্ষুর মধ্যে খোঁচাবিধার স্থায় বেদনা; চক্ষুর সম্মুখে কৃয়াশা থাকিলে বেক্রপ হয়, চক্ষে সেরূপ বাপ্পা দেখা (কেট্, ফস্, রানান্-কুলাস্, সাল্ ফ্)।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলে ফুসুড়ী ; তদনুগুণেণা শিশুগণের মুখে ফুসুড়ীর (Milk-crust) জায় ফুসুড়ী (বায়েলা ট্রিকালার) ; মাড়ির সন্ধি এবং উহার সকালনের সহায়কারী পেশীতে শক্ত এবং আঁটা বোধ ।

মুখগহ্বর । প্রাতঃকালে মুখে তিক্তস্বাদ (ত্রাট, নাক্স-বন্. পাল্‌স) ।

পাকস্থলী এবং উদর । আহারের পর তিক্ত উদগার উঠা । উদরে গড়্‌গড়্‌, কল কল শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে খালি-বোধ, উদরের বাম পার্শ্বে সূচীবিধানের জায় বাতনা ।

মল । মল অতি কষ্টে নির্গত হয়, বাহার দ্রব অত্যন্ত বাতনার উল্লেখ হয় ।

মূত্রযন্ত্র । বারম্বার প্রস্রাব করার ইচ্ছা এবং একবারে অতি কম পরিমাণে মূত্র নির্গত হওয়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র নালীতে অত্যন্ত জ্বালা বোধ (একন্, ক্যাস্) ; দিবা রাত্রি বারম্বার প্রচুব পরিমাণে ফিকা মূত্র নিঃসরণ (এপিস্, আপোসিনাম্, বার্কেকান্) ; মূত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরী (Gravel) থাকে ; মূত্র কাদার জলের জায় ঘোলাটির ; মূত্র ত্যাগ সমাপ্ত হওয়া হওয়া সময়ে অত্যন্ত বাতনা ।

স্বাসযন্ত্র । বৃক্কে আক্কেপিক রকমের বাতনা ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশ হইতে শুক্র নিঃসারক সূত্র (Spermatic Cord) পর্যন্ত বেদনা ; ধাতুনিঃসরণের পর উক্ত প্রকারের বাতনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । বাহু, হাত এবং আঙ্গুলের সন্ধিতে সূচীবিধানের জায় বাতনা ; হাতের আঙ্গুলে গভীর আব্‌ড়ু খাব্‌ড়ু ফাটা এবং উহাতে অত্যন্ত জ্বালাহুতব ; মনে হয় যেন হাতের আঙ্গুলের আগায় ক্ষত হইয়াছে । উরু, হাঁটু এবং পায় সূচী বিধানের জায় বাতনা ।

চর্ম্ম । শরীরের প্রায় সমুদয় স্থানেই দাদের জায় ফুসুড়ী ; শরীরের স্থানে স্থানে গভীর জ্বালাযুক্ত এবং বেদনাযুক্ত ফাটার জায় ক্ষত (গ্রাফ্) ; কখন কখন সমুদয় শরীরে চুলকানি ; সন্ধ্যার সময় বিছানায় এবং প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গার পর বিছামা হইতে উঠিলে শরীর চুনানি ; শরীরের স্থানে স্থানে শুক, লালবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের জায় ফুসুড়ী, উতাপ লাগিলে যাহা চুলকায় ; চামড়া কঁচকাইয়া যায় ।

জ্বর । ব্যৱহাৰ শীত কল্শ, শৰীৰেৰ নিম্নভাগ হইতে বাহ্য উপৰি-
ভাগে বিস্তৃত হয় ; সন্ধাৰ সময় বিছানায় শয়ন কৰিলে শৰীৰ উষ্ণ হয় ;
বৈকালে বা সন্ধাৰ সময় শৰীৰেৰ উত্তাপেৰ সঙ্গ সঙ্গ ঘৰ্ষ ।

ব্যবহার । বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সন্ধিবাত জনিত অম্বুধ ; ক্ষত ; দাঁদেৰ
জাৰ চক্ৰাকাৰেৰ ফুৰুড়ী ; মূত্ৰাধাৰাদিতে পাথৰী (Gravel) ; হাঁপানি
কাশি ; বাতৰোগ ; প্রমেহ রোগ ; গৰমীৰ ব্যাৰাম বা পাৰাৰ অপব্যবহাৰ
জনিত শৰীৰেৰ স্থানে স্থানে চক্ৰাকাৰেৰ কুৰুড়ী ইত্যাদি অম্বুধে সাদা
পেৰিলা ব্যবহাৰ্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । গৰমীৰ ব্যাৰাম, প্রমেহ রোগ বা
পাৰাৰ ব্যবহাৰ বা অপব্যবহাৰেৰ পৰ ইহা বিশেষ উপকাৰী ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আমোনিয়াম্ কাল্ৰোনিকাম্, বেলাডোনা,
ক্যামোমিলা, মাৰ্কিউৰিয়াম্, সিপিয়া, সাল্ফাৰ ।

প্রতিষেধক ঔষধ । বেলাডোনা, মাৰ্কিউৰিয়াম্ ।

ডাইলুশন বিচাৰ । ৬ষ্ঠ, ১২, এবং ৩০ ডাইলুশনই সচৰাচৰ
অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গৰমীৰ ব্যাৰাম, প্রমেহ রোগ এবং পাৰাৰ
অপব্যবহাৰ জনিত অম্বুধে, বিশেষতঃ গাৰ চক্ৰাকাৰেৰ কুৰুড়ীতে, মূল
আৰোক, ২১৩ ফোঁটা মাত্ৰায়, সেবনে মিশ্র আৰোক অপেক্ষা অধিক
উপকাৰ দৰ্শিতে দেখা যায় ।

সেনিসিয়ো অরিয়ান্স্, -সেনিসিয়ো

(SENECIO AUREUS, -SENECIO.)

আমেৰিকাৰ ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সেৰ খাল নাগাৰ নিকটবৰ্ত্তী যে পতা
জলাশয় থাকে, তাহাৰ ধাৰে এই গাছ জন্মে । এই গাছেৰ সমুদয় অংশ বধা
নিয়মে এক্ স্পিৰিটে ভিজাইয়া মূল আৰোক প্ৰস্তুত হইয়া থাকে ।
সেনিসিন্ বধা নিয়মে সুগাৰ অম্বুধিকৈৰ সঙ্গ মিশাইয়া ইহাৰ মিশ্র গুঁড়া
প্ৰস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । শৈল্পিক ঝিল্লীর উপবের অংশের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, বাহার দরুণ শৈল্পিক ঝিল্লী উত্তেজিত হইয়া শ্লেষ্মা নিঃসরণের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি হইয়া থাকে । জননেন্দ্রিয় ও মূত্র যন্ত্রের সঙ্গে এই ঔষধের বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং বায়ুনল ও অস্ত্রের সঙ্গেও ইহার সম্বন্ধ আছে । স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিয়া রোগ এবং জননেন্দ্রিয়ের অস্থির দরুণ স্নায়ু মণ্ডলীতে যে প্রকার উত্তেজনা এবং উহার নিস্তেজতা দেখিতে পাওয়া যায়, এই ঔষধেও স্নায়ু মণ্ডলীর সরুপ অবস্থা উৎপাদন করে । ইহাকে আমেরিকার লোকেরা সাধারণতঃ যথানিয়মে স্ত্রী পরিচালক (Female Regulator) বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অতি অল্প সময়ের জন্তও কোব বিষয়ে মন নিবিষ্ট হইয়া থাকে না ।

মস্তক । মাথায় অবসন্নকারক ঘৃণ্ ঘৃণে বেদনা ; সর্দির শ্লেষ্মা নিঃসরণ কদ্ধ হইয়া মাথাধরা ।

চক্ষু । বাম চক্ষু এবং কর্ণালের বাম পার্শ্বে ছুরিদিয়া কাটার ভায় তীব্র বেদনা ; চক্ষুর স্বাভাবিক নিঃসরণ কদ্ধ হইয়া চক্ষুর শ্লেষ্মা জনিত প্রদাহ ।

নাসিকা । হাঁচি দেওয়া এবং নাসারন্ধ্রে জ্বালা এবং পূর্ণবোধ ।

মুখগহ্বর । মুখগহ্বর এবং উহার পশ্চাত্তাগে শুষ্কবোধ ।

পাকস্থলী এবং উদর । প্রাতঃকালে দুগ্ ভাজিলে বমনোদ্যোগ (গ্রাক্, নাক্স-মক্, পাল্‌স্, সিপিয়া) । পেটকামড়াইয়া বা শূল বেদনার ভায় বেদনা, সম্মুখ পানে বাকিয়া পড়িয়া অড় সড় হইয়া থাকিলে বাহার উপশম হয় (কলোস) ।

মল । মল জলবৎ তরল, কাল্‌চে এবং কঠিন মল বা নেড় মিশ্রিত ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাধারে শূল এবং উহাতে উষ্ণাশুভব ও বারংবার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ; অত্যন্ত মূত্রের বেগ হইয়া তৎপর শীতবোধ ; মূত্র রক্তের ছিটসংযুক্ত ; বারংবার প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ ; মূত্রকোষ প্রদেশে সামান্য বেদনা ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের শুক্র নিঃসারক বায়ুসূত্র (Left Spermatio Cord) পূর্ণ ও ভারিবেধ এবং বেদনা, যাহা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; প্রোষ্টেট গ্রন্থির (Prostate gland) বিরুদ্ধি ও স্পর্শ করিলে উহা কঠিন ও ক্ষীত বলিয়া অনুভূত হয়। গ্রীলোকের ঠাণ্ডা লাগিয়া রজঃরোধ (সিম্-সিক); কঠকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র কুক্ষ বা মূত্রবস্তুর অশ্রান্ত প্রকারের পীড়া; অকালে এবং প্রচুর বা অতিরিক্ত রজঃস্রাব (ক্যাল্-কার্ক); গোণে এবং স্বল্প রজঃস্রাব (সিপিয়া); অনিয়মিতরূপে রজঃস্রাব, অর্থাৎ কখন নিয়মিত সময়ের পূর্বে, কখন বা নিয়মিত সময়ের অনেক পর, রজঃস্রাব; রজঃস্রাবের সময় বা উহার মধ্য-বর্তী সময়ে শরীরে বেদনা; রজঃস্রাব না হইয়া তৎপরিবর্তে নিয়মিত সময়ে কেবল শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ বা উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রবস্তুর অনুভব।

ঋণসম্বন্ধ । সর্দিজনিত তরল কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রজঃস্রাব লক্ষ্যীয় কোন গোগধোর থাকিলে বা অনিয়মিতরূপে রজঃস্রাব হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী; বায়ু উপনমের শৈল্পিক বিলী হইতে অধিক পরিমাণে স্লেমা নির্গমন।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরে বেদনা; কটদেশের বাহু পার্শ্বে ঘৃণ্ণে বেদনা।

ব্যবহার । স্লেমা জনিত অনুভব; মৌত্রিক বস্ত্র এবং অণ্ডকোষাধার লক্ষ্যীয় অনুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রকুক্ষ; মূত্রের সঙ্গে রক্ত নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরে বেদনা; মূত্রকোষের অনুভবজনিত শোথ; মূত্রকোষে রক্তাবরোধ এবং প্রদাহ; মূত্রকোষের গ্রীবার পুরাতন আকারের প্রদাহ; রজঃস্রাব লক্ষ্যীয় অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে কুক্ষুসের অনুভব; অনিয়-মিতরূপে রজঃস্রাব এবং কঠকর রজঃস্রাব ও বাধকের বেদনা; শ্বেতপ্রদর; মৌত্রিক বস্ত্রের অনুভব জনিত শোথ; মূত্রকোষে রক্তাবিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার প্রদাহ; মূত্রাধারের গ্রীবার পুরাতন আকারের প্রদাহ; কোন কোন প্রকারের রজঃরোধ ইত্যাদি অনুভবে সেন্সিটিভ ব্যবহার্য্য। একটা শুদ্ধ মহিলা অনেক বৎসর যাবৎ প্রচুর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা দ্বারা অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া আসিতেছিলেন। আগোপ্যাথিক মতে তাঁহার চিকিৎসা

সার কোন প্রকারে ক্রটি হয় নাই। কিন্তু উহাতে কোনও ফল হয় নাই। চিকিৎসা বিষয়ে বহুদর্শী এবং জী ও শিশুরোগ চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী সুবিজ্ঞ আলোপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ডাক্তার করুণাকুমার সেন মহাশয় একদিন আমাকে উক্ত রোগীটির রোগের বিবরণ বলেন এবং উক্ত রোগীটিকে চিকিৎসা করিতে অহরোহ করেন। আমি লক্ষণানুসারে ঔষধ মনোনীত করিয়া প্রায় ২০ মাস চিকিৎসা করিলাম; কিন্তু উহাতে বিশেষ ফল দর্শিল না। তৎপর করুণা বাবু রোগীকে ২০ মাস পুনরায় চিকিৎসা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল না দর্শিয়া ক্রমে রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ষটমাস ক্রমে আমি এক দিবস করুণা বাবুব নিকট যাই। যখন আমি তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছাইলাম তখন উক্ত রোগীর স্বামী করুণা বাবুব নিকট বসিয়া ছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন যে “আমার জ্বর রোগেরতো আপনারা কিছুই করিতে পারিলেন না, এখন উপায় কি? রোগী মারা যাইবে?” অনেক ভাবিয়া ভাবিবা এবং অল্পসম্মানের পর মেনিসিয়ো ব্লু আরোক, ২ ফেঁটা মাত্রায়, প্রতিদিন ৩ মাত্রা করিয়া ৮১০ দিবস সেবন করাইলে তাহার রোগটি সারিয়া গিয়াছে। এহলে বলা আবশ্যক যে, রক্তঃস্রাবের সময় অতিরিক্ত রক্তস্রাব, তলপেটে ভয়ানক অবসন্ন কারক বেদনা, শরীরে, বিশেষতঃ কোমবে, বেদনা, মূত্র ক্লান্ত ইত্যাদি লক্ষণগুলি উক্তরোগীর বর্তমান ছিল। প্রায় ১৩ ১৪ বৎসর গত হইল কলিকাতাহ কোন একটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধাগরের ম্যানেজারের জ্বর উক্ত প্রকারের কষ্টকর রক্তঃস্রাব ও বাধকের বেদনা এবং তজ্জনিত অসুখ মেনিসিয়ো দ্বারা ৫৬ দিবসের মধ্যে আরাম করা গিয়াছিল। এহলে বলা আবশ্যক যে, কলিকাতাহ সুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার বিহারীলাল ভাট্টা এবং ডাক্তার সালজার (Dr. Salzer) সাহেবও এই রোগীর চিকিৎসা করিয়া বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। হেলেনিয়াস্, পালমেটোলা এবং লাক্সুনেসিয়ায় কার্যের সঙ্গে মেনিসিয়োর কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্বির ইহার কার্যের সঙ্গে ক্যাকেরিয়া কার্বোনিকা, ফক্ষরাস্ এবং সিপি-রার কার্যেরও সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার। লেখক এই ঔষধের মূল আরোক ২৩ ফোঁটা মাত্রায় সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। মিশ্র আরোক ব্যবহার করিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় বিশেষ ফল না পাইয়াই লেখক মূল আরোক উক্ত মাত্রায় ব্যবহার করেন এবং তদ্রূপ ফলও পাইয়া থাকেন।

স্টাফিসেগ্রিয়া, -স্টাফিস্

(STAPHISAGRIA, -STAPH.)

দক্ষিণ ইউরোপে এই পাছ জন্মে। ইহার ফলের বিচি বথানিয়মে রে-ক্-টিকায়েড্ স্পিরিটে ভিজাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। জননেত্রির এবং মূত্র যন্ত্রের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। ইহা মূত্রনালীর প্রোষ্টেট্ গ্রন্থি (Prostate gland) নিকটবর্তী স্থানের স্নায়িক ঝিল্লীই অধিক আক্রমণ করে, যাহার দরুন উক্ত স্থান উত্তেজিত এবং পুরাতন আকারে প্রদাহযুক্ত হয় ও যদ্বারা কখন কখন শুক্র নিঃসারক নালী এবং শুক্রনিঃসরণের সহায়কারী নালীও আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহার দরুন শুক্ররূপের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। অতএব শুক্র ক্ষরণে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহা বৃহৎ মস্তিষ্ক (Cerebrum), পরিপাক সঞ্চায় যন্ত্র এবং চর্মও আক্রমণ করিয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্বদা চিড়্ চিড়্ করা; রোগী দ্রব্যাদি অত্যন্ত রাগের সহিত এদিক ওদিক ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয় (ক্যাম্, সিনা); মনের সামান্য আন্দোলনেই অস্থির হইয়া পড়া; অন্ত্রায় কোন রকমের কথা শুনিলেই রোগীর (স্ত্রীলোক) মনে যেন অত্যন্ত আঘাত লাগে (নাক্স-বম্, প্লাটিনা); অন্ত্র লোঠকের এবং রোগীর আপন কার্যে চাটয়া যাওয়া এবং কাঁধের যে কি কুফল হইবে তাহা ভাবিয়াই রোগী অত্যন্ত ক্ষোভাঘিত হয়; স্মরণশক্তির দুর্বলতা বা হ্রাস (আনাকার্ত্, ক্রিয়াজ্, ল্যাকেসিস্, মার্ক্, নাক্স-মক্), স্ত্রী বা পুরুষ সহবাস বা হস্তমৈথুনের পরই যাহা অধিক অন্তর্ভূত হয় (চারনা,

ফল্-আন্স); মাথার ভারিবোধ, হাতের উপর মাথা রাখিলে যাহার উপশম হয়।

মস্তক । মনে হয় যেন কপালে গোলাকারের গোলায় স্তম্ভ কোন পদার্থ দৃঢ়ভাবে লাগিয়া রহিয়াছে যাহা মাথা ঝাকিলেও দূরীভূত হয় না; মস্তক চতুর্দিকে দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিলে ঘেঁরুপ হয়, মাথার সেরূপ বেদনা, কপালেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; কপালের ঠিক মধ্যভাগে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে চিমাবোধ; প্রাতঃকালে কপালের বাম অর্দ্ধাংশে চাপিয়া ধরা, হিজ্র করা, বা স্থচীবিধানের স্তায় যাতনা, যাহা মধ্যদেশ হইতে বহির্দেশে বিস্তৃত হয়; মাথার ঠিক উপরিভাগের উপরে তীক্ষ্ণ স্থচী বিধানের স্তায় যাতনা; বহির্দেশ ও ভিতর হইতে চাপিয়া ধরিলে ঘেঁরুপ হয়, মাথার পশ্চাৎভাগে সেরূপ যাতনা; মাথার পশ্চাৎভাগ, মাথার পার্শ্ব এবং কর্ণের পশ্চাৎভাগে আর্দ্র, চুলকানি বিশিষ্ট হ্রস্বকণ্ডুক্ত মামড়ী বিশিষ্ট ফুলুড়ী (গ্রাফ্, লাইকোপ্, সাইলিসি, সাল্ফ.) ।

চক্ষু । চক্ষুর গোলক এবং পাতায় শুষ্ক ও চাপাবোধ; চক্ষুর পাতার প্রান্তে চুলকানি (সিপিয়া, সাল্ফ.); চক্ষুর পাতার প্রান্তের প্রদাহ এবং রক্তিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা (ক্যাঙ্ক-কার্ক্, গ্রাফ্, সিপিয়া, সাল্ফ.); চক্ষুর পাতার প্রদাহ; আঁজনী (পাল্‌স্, লাইকোপ্); চক্ষুর পাতার উপর কঠিন আবেশ স্তায় স্থিতি এবং কঠিনতা (গ্রাফ্) যাহা একটা পাতা আক্রমণের পর অপর পাতা আক্রমণ করিয়া থাকে এবং কখন কখন চক্ষুর পাতায় ক্ষতও হইয়া থাকে; গরমীর ব্যারাম জনিত চক্ষুর আইরিস্ নামক অংশের প্রদাহ (Syphilitic Iritis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর গোলক, কপালের পার্শ্ব এবং সুখমণ্ডলের পার্শ্বে ফাটিয়া যাওয়ার স্তায় বেদনা; সন্ধি-বাত জনিত চক্ষু প্রদাহ, যাহার যাতনাদি দাঁত পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; চক্ষের সারাস্ত সঞ্চালনেই চক্ষে জ্বালা উদ্ভেক হয়, যাহার দরুণ মনে হয় যেন চক্ষু শুষ্ক, অথচ চক্ষু দিয়া অনবরত প্রচুর পরিমাণে জল পড়ে; নাসিকার নিকট-বর্তী চক্ষুর কোণের মধ্যে নেত্রনালীর পূর্ববর্তী ফোড়ার স্তায় স্থিতি (Anchyllope), যাহার যাতনাদি কমিয়া গেলেও স্থিতি এবং কঠিনতা থাকিয়া যায়; চক্ষুর যোজক ঝিল্লীতে চর্কিপূর্ণ আব; চক্ষুর যোজক ঝিল্লীতে পলি-